

女
科
精
華

嚴鴻基題



南京

中醫大學

所有

南京中醫大學圖書館藏

民國十年甯波
汲經書莊印行



南京中医药大学图书馆版印所

序

吾國自軒岐以來。醫籍浩如煙海。而女科之書。亦汗牛充棟。處今日而欲研究國醫學。非擇精守約不可。東西醫籍。日見輸入學者。精神有限。既欲注意於國醫學。復欲參觀東西學。幾有日不暇給之勢。余輯女科精華。即本精約二字之義。先古聖法規。猶欲導水必先窮源也。次先哲粹言。音原失得然後溯其流也。次中外名論廣見。猶窮源溯流。然後旁證曲引。借觀自得。音原失得以三卷而女科經帶胎產之學備矣。倘世有博學者見之。以為此是糟粕。此仍少無不足。當精約二字。吾亦聽之而已。

民國九年歲次庚申春月

慈谿嚴鴻志序於退思廬

退思廬女科精華目錄

卷上

古聖法規

素問

難經

金匱婦人妊娠病脉證并治

金匱婦人產後病脉證并治

金匱婦人雜證脉證并治

內經方

金匱方

卷中

先哲粹言

論女科大意

論命門

論治婦科當悉衝任兩脉

論男女氣血運行之別

論神思間病難治

論經帶

論月經之本

論天癸崩帶各病由於奇經

論天癸為精血之源

論經行當慎將理

論調經之法

論因病致經不調

論經不調各有所因

論經水來原

論行經不常

論經水來原

論天癸至當及時婚配

論停經不可漫治

論經水變化

論經色變動由於命火衰旺

論經愆期由於陰虛多火

論經閉由於病發心脾

論經閉與血隔血枯不同

論經脈壅遏由於痰氣

論經閉則生寒熱

論治血宜治氣

論氣血陰陽升降

論帶下三十六疾

論帶下五色因風邪入於胞門

論帶下屬濕熱冤結不散

論帶下有寒熱虛實之分

論淋帶淫濁

論帶下各家所主不同

論崩漏

論崩由妄治

論崩宜止截

論治崩不宜用溫熱峻補

論治崩漏之法

論血崩用藥

論血崩因虛熱

論崩中由傷損衝任

論婦女有花無花之別

論成孕之道

論崩中五色俱下
論求嗣之法

論受孕有內外入留之分

論不孕各有所因
論逐月養胎真氣

論惡阻

論半產

論安胎之法

論胎孕治法

論胎產宜慎藥

論漏胎之因

論半產漏下

論鬼胎

論暗產

論辨胎男女法

論胎前三大病源

論妊娠腫脹

論子死腹中藥宜慎用

論胎孕忌藥並歌括

論治胎產不可執一

論產後三病

論產後治法



論產後審症

論產後頭汗

論產後血暈

論產後浮腫并治法

論產後傷寒并治法

論病血分原由

論產後宜補

論治產後宜以生化湯加減

論癥瘕

論腸覃石瘕

論治奇經之藥

論經產兼證方法

論婦女易致虛勞

論婦科診法

卷下

中外名論廣見

陰陽水火氣血論

男女異同論

奇經八脈大旨

全體功用大略

中西營衛說

熱入精室論

熱入血室廣論

中西剖解血室考

中西剖解帶脉考

中西剖解三焦考

婦人病勞似孕受孕似勞辨

診治婦科心得說

求嗣論

調經以治氣為先說

全體新論摘要

婦科精蘊摘要



北京中医药大学图书馆版权所有

退思廬女科精華卷上

慈谿嚴鴻志癡孫纂輯

男智鶴梅村校字

古聖法規

素問

上古天真論。黃帝曰。人年老而無子者。材力盡耶。將天數然也。歧伯曰。女子七歲腎氣盛。齒更髮長。二七而天癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。故有子。三七腎氣平均。故真牙生而長極。四七筋骨堅。髮長極。身體盛壯。五七陽明脈衰。面始焦。髮始墮。六七三陽脉衰於上面。皆焦。髮始白。七七任脈虛。太衝脈衰少。天癸竭。地道不通。故形壞而無子也。

評熱病論。月事不來者。胞脈閉也。胞脈者。屬心而絡於胞中。今氣上迫肺。心氣不得下通。故月事不來也。

陰陽別論。二陽之病發心脾。有不得隱曲。女子不月。其傳為風消。其傳為息貴者。死不治。

腹中論。有病胸脇支滿者。妨於食。病至則先聞腥臊臭。出清液。先唾血。四肢清。目眩。

時時前後血病名血枯。此得之年少時。有所大脫血。若醉入房中氣竭。肝傷。故月事哀少不來也。治之以四鳥鰣骨一蘆茹二物并合之丸。以雀卵大如小豆以五丸為後飯。飲以鮑魚汁。利腸中及傷肝也。

腹中論。帝曰。何以知懷子之且生也。歧伯曰。身有病而無邪脉也。平人氣象論。婦人手少陰脈動甚者。姪子也。

六元正紀大論。黃帝問曰。婦人重身。毒之何如。歧伯曰。有故無殞亦無殞也。帝曰。願聞其故。何謂也。歧伯曰。大積大聚其可犯也。哀其大半而止。過者死。

奇病論。黃帝問曰。人有重身。九月而瘡。此何為也。歧伯曰。胞之絡脈絕也。帝曰。何以言之。歧伯曰。胞絡者繫於腎。少陰之脉貫腎繫舌本。故不能言。帝曰。治之奈何。歧伯曰。無治也。當十月復。

痿論。悲哀太甚。則胞絡絕。胞絡絕。則陽氣內動。發則心下崩。數溲血也。故本病曰。大經空虛。發為肌痺。傳為脈痿。思想無窮。所願不得。意淫於外。入房太甚。宗筋弛縱。發為筋痿。及為白淫。故下經曰。筋痿者。生於肝使內也。

痿論。論言治痿者。獨取陽明何也。歧伯曰。陽明者。五藏六府之海。主潤宗筋。宗筋主

束骨而利機關也。衝脈者。經脉之海也。主瀆灌谿谷。與陽明合於宗筋。陰陽總宗筋之會。會於氣街。而陽明為之長。皆屬於帶脉。而絡於督脈。故陽明虛。則宗筋縱。帶脉不引。故足痿不用也。

離合真邪論。天地溫和。則經水安靜。天寒地凍。則經水凝滯。天暑地熱。則經水沸溢。卒風暴起。則經水波湧而隴起。

玉機真藏論。風寒客於人。由脾傳腎。病名曰疝瘕。少腹冤熱而痛。出自白。一名曰蠱。難經

十九難曰。脈有順逆。男女有恒而反者。何謂也。然男子生於寅。寅為木。陽也。女子生於申。申為金。陰也。故男脈在關上。女脈在關下。是以男子尺脈恒弱。女子尺脈恒盛。是其常也。反者男得女脈。女得男脈也。

二十八難曰。其奇經八脈者。既不拘於十二經。皆何起何經也。然督脈者。起於下極之俞。並於脊裏之上。至風府。入屬於腦。任脈者。起於中極之下。以上至毛際。循腹裏。上闕元。至咽喉間。上頤循面。入目絡舌。衝脈者。起於氣街。並足陽明之經。夾脣上行。至胸中。而散帶脈者。起於季脇。迴身一周。陽蹻脈者。起於跟中。循外踝上行。入風也。

陰蹻脉者亦起於跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脈陽維陰維者維絡於身溢蓄不能環流灌溢諸經者也故陽維起於諸陽會陰維起於諸陰交也二十九難曰奇經之為病何若然陽維維於陽陰維維於陰陰陽不能自相維則張然失志溶溶不能自收持陰蹻為病陽緩而陰急陽蹻為病陰緩而陽急衝之為病逆氣而裏急督之為病脊強而厥任之為病其內若結男子七疝女子瘕癰帶之為病腹滿腰溶溶若坐水中陽維為病苦寒熱陰維為病苦心痛此奇經八脉之為病也

金匱婦人妊娠病脉證并治

師曰婦人得平脉陰脉小弱其人渴不能食無寒熱名妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此證設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之

婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不止胎動在臍上者為癥瘕害妊娠六月動者前三月經水利時胎也下血者後斷三月衃也所以血不止者其癥不去故也當下其癥桂枝茯苓丸主之

婦人懷妊六七月脉弦發寒熱其胎愈脹腹痛惡寒者少腹如扇所以然者子藏開

故也。當以附子湯溫其藏。
師曰。婦人有漏下者。有半產後因續下血。都不絕者。有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛。為胞阻。膠艾湯主之。

婦人懷娠腹中疔痛。當歸芍藥散主之。

妊娠嘔吐不止。乾姜人參半夏丸主之。

妊娠小便難。飲食如常。當歸貝母苦參丸主之。

妊娠有水氣。身重。小便不利。灑淅惡寒。起即頭眩。葵子茯苓散主之。

婦人妊娠。宜常服當歸散主之。

妊娠養胎。白朮散主之。

婦人傷胎。懷身腹滿。不得小便。從腰以下重。如有水氣狀。懷身七月。太陰當養。不養此心氣實。當利瀉勞營及關元。小便微利則愈。

金匱婦人產後病脉證并治

問曰。新產婦人有三病。一者病瘡。二者病鬱冒。三者病大便難。何謂也。師曰。新產血虛。多汗出。喜中風。故令病瘡。亡血復汗。寒多。故令鬱冒。亡津液。胃燥。故大便難。



少林卷之三
九
產婦鬱冒。其脉微弱。不能食。大便反堅。但頭汗出。所以然者。血虛而厥。厥而必冒。冒家欲解。必大汗出。以血虛下厥。孤陽上出。故頭汗出。所以產婦喜出汗者。亡陰血虛。陽氣獨盛。故當汗出。陰陽乃復。大便堅。嘔不能食。小柴胡湯主之。病解能食七八日。更發熱者。此為胃實。大承氣湯主之。

產婦腹中疔痛。當歸生姜。羊肉湯主之。并治腹中寒疝。虛勞不足。產後腹痛。煩滿不得卧。枳實芍藥散主之。

師曰。產婦腹痛。法當以枳實芍藥散主之。假令不愈者。此為腹中有乾血。著臍下。宜下瘀血湯主之。亦主經水不利。

產後七八日。無太陽證。少腹堅痛。此惡露不盡。熱在裏。結在膀胱。不大便。煩躁發熱。切脉微實。再倍發熱。日晡時。煩躁者。不食。食則譫語。至夜即愈。宜大承氣湯主之。產後風續之。數十日不解。頭微痛。惡寒。時時有熱心下悶。乾嘔汗出。雖久。陽旦證續在者。可與陽旦湯。

產後中風。發熱面正赤。喘而頭痛。竹葉湯主之。
婦人乳中虛煩。龍嘔逆。安中益氣竹皮大丸主之。

產後下痢虛極白頭翁加甘草阿膠湯主之。

金匱婦人雜證脉證并治

婦人之病。因虛積冷積氣為諸經水斷絕。至有歷年血寒。積結胞門。寒傷經絡。凝堅在上。嘔吐涎唾。久成肺癰。形體損分。在中盤結。緣脣寒症。或兩脇疼痛。與藏相連。或結熱中。痛在關元。脈數無瘡。肌若魚鱗。時著男子。非止女身。在下未多。經候不勻。令陰掣痛。少腹惡寒。或引腰脊。下根氣街。氣衝急痛。膝腔痛。煩奄。忽眩冒。狀如厥癲。或有憂慘悲傷多嗔。非有鬼神。此皆帶下。久則羸瘦。脉虛多寒。三十六病。千變萬端。審脉陰陽。虛實緊緩。行其鍼藥。治危得安。其雖同病。脉各異源。子當辨記。勿謂不然。婦人咽中如有炙鸞半夏厚樸湯主之。

婦人藏燥。喜悲傷欲哭。象如神靈所作。數欠伸。甘麥大棗湯主之。

婦人吐涎沫。醫反下之心。下即痞。當先治其吐涎沫。小青龍湯主之。涎沫止。乃治痞瀉心湯主之。

問曰。婦人年五十。所病下血數十日不止。暮即發熱。少腹裏急。腹滿。手掌煩熱。唇口乾燥。何也。師曰。此病屬帶下。何以故。曾經半產。瘀血在少腹不去。何以知之。其證唇

口乾燥故知之當以溫經湯主之。

帶下經水不利少腹滿痛經一月再見者土瓜根散主之。

寸口脉弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此名曰革婦人則半產漏下旋覆花湯主之。

婦人陷經漏下黑不解膠蠻湯主之。

婦人少腹滿如裹狀小便微難而不渴生後者此為水與血俱結在血室也大黃甘遂湯主之。

婦人中風七八日續來寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室治之無犯胃氣及上二焦必自愈。

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脈遲身涼和胸脇滿如結胸狀讞語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之。

陽明病下血讞語者此為熱入血室但頭汗出當刺期門隨其實而瀉之濶然汗出即愈。

婦人經水不利下抵當湯主之。

婦人經水閉不利藏堅癖不止中有乾血下白物礬石丸主之。

婦人六十二種風及腹中血氣刺痛紅藍花酒主之。

婦人腹中諸疾痛當歸芍藥散主之。

婦人腹中痛小建中湯主之。

問曰婦人病飲食如故煩熱不得卧而反倚息者何也。師曰此名轉胞不得溺也。以胞系乘戾故致此病但利小便則愈宜腎氣丸主之。

婦人陰寒溫中坐藥蛇床子散主之。

少陰脉滑而數者陰中即生瘡陰中蝕瘡爛者狼牙湯洗之。

胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也長服河藜勒丸。

師曰經水前斷後病水名曰血分此病為難治先病水後斷經水名曰水分此病易治何以故去水其經自下也。