

八



何氏濟生論卷八目次

京江何鎮培元甫纂集 再姪孫鳳翹紫庭節錄

卷八目次 產後諸病類

產後將理論

產後熱病胎死腹中論

胎衣不下論

難產論

血暈論

口乾痞滿論

寒熱論

產後傷寒論

四支虛腫論

乍見鬼神論

腹痛泄瀉論

小便數論

遍身疼痛論

大便秘澀論

附

小便不通

血崩論



腹痛滿悶嘔吐論

鼻衄論

喘急論

產後中風論

產後瘕瘕論

心痛論

脚氣論

汗多變瘧論

乳少論



吹孀論

產後諸症歌

附
幼科外科集效方



南京中醫藥大學圖書館版權所有

何氏濟生論卷八

產後將理論

凡生產畢飲熱童便一盞不得便臥且宜閉目而坐
須臾上牀宜仰臥宜豎膝不可伸足高倚床頭厚鋪
茵褥密遮四壁免致賊風又以醋塗鼻或用醋炭或
燒漆器以防血暈血逆宜頻食白粥少許一月之後
方宜食羊肉猪蹄今人于產後一二日便食雞子及
葷腥之物以致眾疾交作切宜慎之爲令少言語慎
寒暑戒七情梳頭洗足以百日爲度否則患手足腰

膝痠痛等症名曰蓐勞最難療治不可獨宿恐致虛驚不可刮舌恐傷心氣不可刷牙恐致血逆須血氣平復方可治事犯時微若秋毫成病重如山嶽可不戒哉

四順理中湯

治新產血氣俱傷脾胃不調百日內宜常服

人參

乾姜炮

白朮兩

甘草炙五錢

蜜丸桐子大米飲下五十丸

地黃丸

治產後腹痛眼見黑花或發狂如見鬼狀或胎

衣不下失音不語心胸脹滿水穀不化口乾煩

渴寒熱往來口內生瘡咽喉腫毒心氣忡悸或

產後中風角弓反張面赤牙關緊閉或崩中如

猪肝臍腹疼痛煩躁恍惚四支腫滿

生地黃

取汁留查二觔

生

姜

取汁留查二觔

蒲

黃

當

歸

各四兩

于銀石器內以姜查拌地黃汁炒以地黃查拌

何氏濟生論

藏板

姜汁炒汁盡令乾四味同焙為末醋煮麵糊為丸彈子大每服一九食前當歸酒化下

四味湯

產後一切諸疾臨產一服尤妙

當

歸

心煩加五分

元胡索

氣悶加五分

血

竭

惡露不快加五分

沒

藥

心腹痛加半錢等分

為末每二錢以童便煎服

黑神散

治產後惡露不盡胞衣不下攻衝心胸或臍腹



南京中醫藥大學圖書館藏

堅脹撮痛及血暈神昏眼黑口噤及產後瘀血

諸疾

熟地黃

蒲黃

炒

當歸

乾姜

炮

桂心

芍藥

甘草

四兩

黑豆

炒去皮半升

爲細末每服二錢酒童便各半盞同煎服

琥珀散

治產後一切危急之症

琥珀

硃砂

麝香

香墨

醋炙

僵蠶

當歸

二錢五分

鯉魚鱗

炒焦

桂心

百草霜

白附子

梁上塵

炒令烟出盡
篩細各五錢

爲細末炒生薑熱酒調服二錢

千金增損澤蘭丸

治產後百病理氣血補虛勞

澤蘭

甘草

當歸

川芎

一兩七錢五分

附子

炮

乾姜

白朮

白芷

桂心



北細辛

一兩

北防風

人參

牛膝

一兩二分
錢五分

柏子仁

熟地

石斛

五錢

厚朴

藁本

蕪荑

五錢

麥冬

二兩

爲細末蜜丸梧子大每服二十丸溫酒下

黑龍丹

治產後一切危篤之疾垂死者但灌藥得下無

不全活

當歸

五靈脂

川芎

良姜

熟地一兩

細剉以沙合盛赤石脂泥縫紙內鹽泥固濟炭火十觔煨令通赤去火候冷開看成黑糟色取出細研却入後藥

百霜五兩

硫黃

乳香一錢五分

花蕊石

琥珀一錢

爲細末與前藥同研如法製和勻以米醋煮麵糊丸彈子大每服一丸炭火燒令通赤投于生姜自然汁與童便入酒漉出控乾研細只用此

酒調下

產後用血竭一錢研細無灰酒和服再熱飲一盃
永無眩暈之病

兒枕痛或小腹敗血作痛用香附童便浸炒二兩五靈脂

二兩生半炒半醋丸湯下六十丸

[illegible]

產後熱病胎死腹中論

熱病胎死腹中者因妊母染得熱病至六七日以後
臟腑熱極熏煮其胎兒死身冷不能自出當服黑神
散以煖其胎須臾胎煖卽自出矣然亦有不因熱病
以致胎死者或因顛仆或因房室驚觸或臨產驚動
太早犯觸禁忌產時未到經血先下遂致胎乾子死
腹中何以驗之但看產婦舌青黑色及舌上冷者是
其候也疑惑之際宜用佛手散二三服探之若不死
子母俱存如胎已死立便逐下的知其胎死者急進

香桂散須臾如手推下矣

香桂散

桂枝

三錢

麝香當門子

一個

太早二味同研煖酒服

一字神散

治子死胎不下胞破不生此方屢效救人無量

鬼

曰

黃色者不拘多少
去毛研爲細粉

每服二錢用無灰酒一盞煎八分通口服立效

如神