

分五
糯米

水一鍾半煎七分。食遠服。但覺有孕。三五日常用一服。四月之後。或產後。或經閉。或血氣兩弱。臟腑火多。血分受熱。而然。醫家又謂安胎。宜用艾附。附子。熟地。黃芩。白芍。甘草。等藥。墮矣。殊不知血氣清和。無火煎燥。則胎自安。而固氣虛。則提不住。血熱則溢。妄行。欲其不墮。得乎。香附雖云快氣開鬱。多用則損正氣。砂仁快脾氣。多用亦耗正氣。況香燥之品。性傷氣血。求以安胎。適又損胎。而反墮也。今惟泰山磐石散。千金保孕丸。二方能奪化工之妙。百發百效。萬無一失。故表出以為好生君子共知也。

安胎萬全神應散 治孕婦三月前後。或經惱怒。或行走失足。跌損傷胎。腹痛腰脹。一服即安。雖然見血一二日。未離宮者。加一劑自安。倘先三四五月內。已經半產過者。將及

前月分畧覺腰骨痠脹。忙服一劑即安。萬全秘傳驗多人。

當歸酒 白木土條茶 酒炒各一錢 熟地汁 再浸白芍 杜仲 鹽水炒 阿膠 蛤粉炒 茯苓 嫩黃耆 炙

酒 川芎 砂仁 五錢 連炙草 三錢

酒水各一碗。煎八分。空心服。如急痛。將銅鍋煎一鍾。即服立止。胸前作脹。如紫蘇陳皮

白帶或紅多。加蒲黃沙阿膠炒地榆各一艾葉。此見紅。加製續斷錢糯米一百粒。

鳳衣散 治三五月小產。

用頭生雞子。抱出小雞之蛋殼。陰陽瓦焙黃研末。如前次小產。在何月分。至時預先以無灰酒

衝服。可免小產。

芋根湯 治孕婦受胎數日後。胎動漏胎。及子懸證。

野芋麻根。孕一月用一寸。加金銀煎湯服之立安。膠艾安胎散。治孕婦頻撲動胎。下血不止。

人參 條苓 阿膠始粉炒成 白朮分錢五 當歸酒洗 熟地各二錢 川芎 艾葉各八錢 陳皮 紫蘇

炙草各四錢

薑一片 大棗二枚 水煎服

增損八物湯 治妊娠漏胎 氣血兩虛 胎中有熱 下元不固者

人參 白朮土炒 歸身酒洗 白芍 熟地 艾葉 條苓 黃柏 知母 阿膠蒲黃炒成 珠珀 炙草

分各等

薑棗引 水煎食遠服 兼用杜仲丸

止漏絕神丹 治胎漏下血 安胎更妙

白朮

土炒熟地兩三七根末三錢

水煎服 此方妙在三七末乃止血神品 故用之奏效

千金保孕丸

見本草安胎門附杜仲丸下

生化湯 見下卷生化湯論後

諸痛論 附孕婦

妊娠頭痛 多因血虛有火 用四物宜加減 若宿有偏正頭風 宜川芎茶調散 若外感頭痛 加味

芎歸湯

妊娠心腹痛 或宿有冷痞 痰飲結聚 或新觸風寒 邪正相擊 並於氣 隨氣上下 上衝於心 則病

心痛 下繫於腹 則病腹痛 痛不已 則胎動不安 如傷心 真心痛 則旦發夕死 夕發旦死 如傷心

支絡 則乍安乍作 醫通用正氣散 加減曾生 治心痛 用定痛延胡散 醫通文曰 胸腹膨滿 按之

而痛 乃飲食停滯 用人參養胃湯 按之不痛 乃脾胃受傷 以六君補之 腹中滿痛 又心不得飲

食 千金芩朮芍藥湯 如不時腹痛 名曰胎痛 有血虛 有氣滯 一因然 血虛居多 用熟地三錢 當

歸一錢煎湯治之。不應加參朮陳皮。丹溪用四物去川芎。倍加熟地。醫通用四物加香附為末。紫蘇湯下。若氣滯者。紫蘇飲治之。若痛而重墜。因中氣虛陷。用補中益氣湯。

如胃口痛。多因脾虛存食不消。宜養胃消食。綱目用平胃散。加枳殼山查。予謂平胃散恐致損胎。非所宜也。宜養胃湯加減。

妊娠脇痛。有因哭泣。因內傷。因惱怒。不宜破氣。宜用童便和酒服之。或紫蘇飲。去參用白芍當歸。加砂仁童便。

妊娠臍下冷痛。腹脹虛寒。小便頻數。大便虛滑。皆食生冷所致。小建中加炮薑木香。不應更加茴香良薑。

妊娠少腹痛。虛熱紫蘇飲。虛寒膠艾湯。若小腹近下處腫脹浮薄發光者。孕癰也。千金托裏散。或薏苡仁煎汁飲。若心腹急痛。煩悶面青。冷汗氣絕。血下不止。其胎上衝者。不可治也。

妊娠腰痛。有腎虛作痛。則脉大而痛不已。急服八珍加膠艾黃耆。或紫蘇飲加減。有勞力任重。致傷胞繫。欲脫。宜安胎飲。加杜續。有房事不節。致傷胞繫。用熟地當歸阿膠砂仁竹茹炙草。調

男子視當灰。一服禁房事百日。要緊。有濕熱脉緩。遇天陰。或久坐而痛。多下白物。二妙散加柴胡防風茯苓半夏。有寒濕腰重。如帶物而冷者。用紫蘇飲加減。易健脾溫燥藥。有氣血凝滯脉

澀。而日輕夜重。不得卧。遍身拘急。不舒而痛。眼生黑花。紫蘇飲加枳殼桔梗。有膀胱風邪。頸項

強直。用獨活寄生湯。有閃到脉實。膠艾歸湯。或佛手散。或熟地黑糖。衝童便酒調服。有因毒

藥者。宜阿膠散。或捷徑方。或三物解毒湯。選用。有走注痛敗血入經之證。四烏湯加薄桂杜續。有臨產腰痛如脫腎者。乃將產也。勿作尋常腰痛論。產下即平復矣。不必用藥治也。妊娠背脊

痛。氣滯也。紫蘇飲治之。

妊娠腰腹及背痛。夫腎主腰。勞損經虛。風冷乘之。則腰痛。乘虛入腹。則腹痛。故腰腹相引而痛。

痛不止恐墜胎。又有勞傷腰腹背痛。補中益氣。加杜續。然多有因病淋證而痛者。宜體察之。上用加味導赤湯。治淋淋止痛除。如勞傷元氣。八珍加杜仲。砂仁。膠艾。如脾腎不足。再加白朮。補骨脂。如傷外邪。獨活寄生湯。若氣血鬱滯。紫蘇飲加枳桔。如肝虛有火。小柴胡加白朮。枳殼。山梔。如肝脾鬱結。歸脾湯加柴胡。枳殼。

妊娠環跳穴痛。屬腎虛。宜六味地黃湯加杜續。或千金保孕丸。

妊娠目赤痛。咽喉痛。口鼻唇舌瘡痛。俱用涼膈散加減。

妊娠負重跌撲。凝血作痛。欲服活血藥。則恐傷胎。不服則所傷之血留而不去。治之者。當先辨胎之死生。如無別證。只用黑糖熬枯。入陳酒。重便調服。細嚼連皮胡桃過口。死者當下。生者其痛即止。若因怒跌撲。或手足抽搐者。紫蘇飲加鈎藤。倘去血過多。八珍湯去茯苓。加阿膠。艾

葉。黃耆。如跌撲餘傷未盡。痛未止。用四烏湯加延胡。木香。如傷去而胎氣未安。紫蘇飲加童便。砂仁。如傷重者。香殼散加熟地。當歸。以護胎。若勢劇者。下瘀血湯加芎歸。酒煎。以去血。則胎自安。此藥峻厲。必須詳慎。若昏睡語言如狂。此血迫心胞。當歸活血湯。如腹中重墜。按之冰冷。此

胎氣已傷。急用香桂散加酒。大黃生附子下之。若口中覺穢氣者。急用平胃散加芒硝下逐之。予謂下胎。莫妙佛手散。即香桂散亦能下胎。又何用大黃附子以助之。然已上四烏香殼下瘀

當歸活血。香桂平胃等方。皆不可輕用。稍可得已。只用熬枯黑糖。酒便調服。為妥。或嚼連皮胡

桃助之。諸方錄後。以備參考可耳。慎勿輕視。佛手香桂而妄用。猛峻傷生。

妊娠遍身痛。或衝心欲死。不能飲食。緣胎有水致痛也。用白朮錢五黃芩錢二白芍錢四入活鯉魚。約

重半觔。外一尾煮湯代水煎服。此即胎水證。當入本門。因有遍身痛證。故移錄於此。以備採取。

治痛也。

川芎茶調散 治久風化火頭痛。及偏正頭風。

川芎 白芷 羌活 防風 荊芥 薄荷 炙草各一兩 香附二兩 炒

為散。食後清茶調服二錢。日三服。婦人產後豆淋酒服。輕者三服。重者五七服。效。

加味芎歸湯 因虛外感頭痛服此。

川芎 當歸各一錢 條芩酒炒 白朮土炒 細芽茶二錢

水煎。食後服。

藿香正氣散 治孕婦心腹痛。多寒多食。加減用之。

白朮土炒 厚朴去皮薑汁製 陳皮去白 蒼朮 紫蘇 半夏製 茯苓 白芷 桔梗 炙草 大腹皮去

無大腹皮有蒼朮

薑朮引水煎服。寒加木香炮薑。食積發熱加苓連炮薑。氣加砂仁香附。痰加橘紅

生薑。

尊生定痛延胡散

延胡三錢 乳香五錢 歸身 炙草各一錢

水煎加鹽酒一滴。

人參養胃湯 治食滯痞滿。

人參 蒼朮米泔水浸去皮 陳皮去白 藿香 半夏製 厚朴去皮薑汁炒 茯苓 草果 炙草

薑朮油拌炒黃色 烏梅引水煎服

六君子湯 治胃虛少食。痰嗽嘔泄。

人參 白朮土炒 茯苓 橘皮 半夏製 炙草

生薑引水煎服。千金苓朮芍藥湯 治妊娠腹中滿痛。叉手不得飲食。

白朮

六錢 土炒黃芩二錢 白芍四錢

右三味水煎分三服。半日令盡。微下水則易產。日飲一劑為善。

補中益氣湯 治煩勞內傷。脉洪大而虛喘渴。陽虛自汗。懶言惡食。氣虛不能攝血。一切

清陽下陷。中氣不足之證。

人參

錢一錢五 分蜜炙 白朮土炒 陳皮

當歸 各五

升麻 柴胡 各三 炙草 分八

加薑三片。棗二枚。水煎服。

平胃散 治胃中宿食不化。藜藿之人宜之。

蒼朮

四兩 米泔水浸去厚朴去皮薑陳皮水泡炙草各三 皮香油拌炒黃色厚朴汁製

右四味為散。每服四五錢。加生薑三片。水煎溫服。

膠艾湯 治婦人漏下。或半產後。下血不絕。或妊娠下血腹痛。亦治損傷衝任。月水過多。

淋漓不斷。

乾地黄

二錢 藥一錢 五分 阿膠蒲黃炒 艾葉

當歸

各一

川芎 甘草 各八

水煎服。

千金托裏散 治氣血虛寒。潰瘍不收。

人參

黃耆 炙川芎 當歸 肉桂 白芷

防風

桔梗

白芍

天冬 味連 翹心 忍冬

炙草

生薑引。水煎服。

二妙散

治身半已下濕熱。痰重而腫。

厚黃柏 薑汁製 蒼朮 茅山者佳 去皮切 等分 為散 薑汁調 每日空心溫酒送一錢。

獨活寄生湯 治風痺腰脚痠重並治產後腹痛不得轉動及腰脚攣痛不得屈伸痺弱者宜服此湯去細辛治產後足膝腫或痛

人參

歸身

白芍

川芎

熟地

桑寄生

杜仲

牛膝

細辛

秦艽

茯苓

桂心

防風

獨活

甘草

附子

生薑煎服

古今錄驗

無寄生

有續斷

因續斷亦可代寄生

肘後無寄生

人參

甘草

當歸

有

附子

八珍湯

氣血雙補之藥

人參

白朮

茯苓

熟地

歸身

川芎

白芍

炙甘草

水煎服

膠艾芎歸湯

治妊娠二三月上至八九月頓撲跌傷胎動不安腰腹疼痛欲死已有所

下

阿膠

蛤粉或蒲黃炒珠

川芎

當歸

乾地黄

艾葉

水煎服

一方有甘草無地黄

佛手散

一名芎歸湯

治妊娠因事築磕胎動不安或子死腹中惡露不下疼痛不已用此

藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立下此方催生甚妙

當歸

三錢或五錢

川芎

錢二

先用酒一鍾煎乾再入水一鍾煎二三沸溫服

若用下胎當為末以酒調服

丹溪治胎

死不下並催生用當歸

兩川芎

錢七酒水煎服

阿膠散

治妊娠或因傾仆或因毒藥胎動不安腰腹疼痛或有所下

阿膠

蛤粉炒

艾葉

歸身

酒浸川芎

白芍

熟地

黃耆

炙甘草

水煎服

阿膠

蛤粉炒

艾葉

歸身

酒浸川芎

白芍

熟地

黃耆

炙甘草

水煎服

阿膠

蛤粉炒

艾葉

歸身

酒浸川芎

白芍

熟地

黃耆

炙甘草

水煎服

阿膠

生薑五片。棗三枚。水煎空心服。

捷徑方 又名曰扁豆散 治妊娠誤服諸般毒藥毒物。及用毒藥攻胎。藥毒衝心。外證牙關緊急。口不能言。兩手強直。握拳頭低。自汗身微熱。外證與中風相似。但其脉浮而軟。十死一生。醫多不識。若作中風治。必死無疑。

白扁豆

二兩生用去皮

為細末。新汲水調下。即效。或米飲調服。或濃煎服亦可。

三物解毒湯 治誤服毒藥動胎。

甘草 黑豆 淡竹葉

各等分

用水煎濃服。

四烏湯 治血中氣滯。小腹急痛。

熟地 當歸

酒洗各二錢

川芎 白芍

各一錢五分

烏藥 香附 製 炙草

水煎服。

加味導赤湯

治孕婦小便少。又澀痛者。謂之子淋。又治溺血。

人參 生地 條芩 木通 甘草稍 麥冬 赤芍

各一錢五分 淡竹葉

燈心四十九寸。水煎空心服。

小柴胡湯

治少陽受邪。往來寒熱。脉弦脇痛而嘔。

柴胡 黃芩 人參 炙草

各一錢五分 半夏 製

生薑五片。大棗四枚。水煎溫服。

六味地黃湯

附六味地黃丸。各一錢五分。黃丸名金匱丸。

熟地 丹皮 茯苓 山萸 澤瀉

各一錢五分 山藥 淨肉 各二錢

水煎服。如作丸用熟地兩丹皮茯苓各三兩山萸山藥各四兩澤瀉一兩古方用三兩加肉桂

兩製附子五錢名桂附八味地黃丸又名金匱腎氣丸一方桂附一兩有用各八錢再加牛膝

車前各一名加味腎氣丸一方肉桂易桂枝蓋因陰氣固結於中勢必分解於外則腎氣

得以流布周身之意耳但僅存其方而世人少有從而易之者予按醫方中又有濟生腎氣

丸治腎氣不化小便瀦數並治產後脚腫或肚腫或成鼓腫乃八味丸本方用茯苓三錢熟地

四兩山藥山萸丹皮澤瀉肉桂各一兩附子五錢加牛膝車前各一兩此本金匱腎氣方中諸藥各減

過半惟桂苓二味仍照原方為宣布五陽開發陰邪之需藥更加牛膝車前為太陽厥陰之

嚮導以肝為風木之臟凡走是經之藥性皆上升獨牛膝通津利竅下走至陰車前雖行津

液之腑而不傷犯正氣既用牛膝引入至陰又須桂附蒸動三焦不待決瀆有權膀胱亦得

以化所以倍用肉桂暗藏桂苓丸之妙用愈於五苓十倍矣但方中牛膝滑精精氣不固者

勿用產後精氣本自不固用者審之故雖證小便不通濟生腎氣丸為善也今世人所用腎

氣丸分兩多從此再考後人不分八味加味濟生分兩懸殊統以金匱腎氣名之殊覺混

人今特拈出

東垣涼膈散 孕婦有病熱如目赤口舌瘡之類各隨其證加減用之

黃芩酒炒連翹酒炒山梔仁酒炒連翹酒炒桔梗 生草各等薄荷葉少

目赤痛者本方加當歸川芎羌活防風菊花各一錢竹葉引 咽喉痛者本方加牛蒡子一錢

研 口舌生瘡者只依本方薑引

香穀散 治畜血暴起胸脇小腹作痛

香附薑汁歸尾各三錢枳殼二錢青皮炒陳皮 烏藥 赤芍 蓬朮醋炒各紅花五錢生草三錢

炙草二錢

共為散。每服四錢。童便空心溫服。以核桃黑糖酒助之。如不應。加延胡穿山甲。有外感風寒。加桂枝羌活。

下瘀血湯 治婦人產後腹痛。有乾血著臍下。

大黃一兩 桃仁二十粒 蟅蟲二十粒 桂枝足

為末。煉蜜為四丸。以酒一升煎一丸。取八合服之。血下如豚肝。

當歸活血湯 治挾瘀如見巢狀。

當歸三錢 赤芍酒洗 生地酒洗 桂心各一錢 桃仁二十粒 茯苓 枳殼 柴胡各八分 炮薑四分 紅花二分

甘草五分

右除生地水煎去渣。入地黃再煎數沸。加陳酒服之。不應加穿山甲五分。又不應。加附子三分。有實熱難用附子者。須與大黃錢許同用。

小建中湯 見下卷脫汗亡陽門。

四物湯

紫蘇飲

安胎飲

千金保孕丸 俱見本卷安胎門。

歸脾湯 見本卷胞漏小產門。

香桂飲 見本卷子死腹中門。

胎產心法卷之上

上谷閻純璽

胎逆上逼脹滿子懸論

妊娠胎逆上逼重則脹滿疼痛謂之子懸。紫蘇飲為必用之藥。蓋因紫蘇飲為治妊娠胎氣不和濁氣舉胎上湊胎熱氣逆心胃脹滿之證。且此證挾氣者居多宜疎氣舒鬱。非紫蘇腹皮川芎陳皮無以疏氣。非歸芍無以養血。氣血既利而胎自降。然邪之所湊其正必虛。故以人參甘草補之。如飲食不甘加四君子。有熱加苓梔歸芍。內熱晡熱或四君兼逍遙散。若常常多怒時覺脹滿服順氣藥不應宜用和氣安胎飲。或加味逍遙散。胎上攻而作痛宜紫蘇飲或順氣安胎散。若脾虛停滯脹滿安胎飲力薄宜用加參平胃散。有因鬱滯者亦宜紫蘇飲或加味歸脾湯。有因痰結聚者紫蘇飲加芩連貝母。有因暴怒者左關必弦洪肝火內動用小柴胡加茯苓枳殼山梔大抵胎氣上逆皆屬火旺急用芩木香附之類不可服大寒之藥反致他變。予每治孕婦心胃脹滿用尊生和氣飲甚效。子懸證有兩尺脈絕餘脈平和不可錯認死胎。且死胎有面青舌青可辨。宜紫蘇飲治之。則胎歸原位。服消脈起矣。如臨月胎上逼心嘔噦欲死急用童便灌之即下。或烏梅肉十枚研爛入生薑三片煎湯灌之即下。取酸以降斂之。兼辛以散火氣之逆也。又有因坐草太早心懷恐懼氣結不行紫蘇飲一服便產。後附針灸一方備用。

四君子湯

治胃氣虛弱飲食不思倦怠少食

人參三錢至

白朮一錢至二錢

茯苓一錢至二錢

炙甘草六分至

水煎服

逍遙散附八味逍遙散又

治血虛肝燥骨蒸勞熱往來寒熱咳嗽潮熱月經不調口乾

便澀

柴胡 當歸

酒拌

白芍

酒炒

白朮

土炒

茯苓

各一錢

炙草

五分

加煨姜薄荷引水煎服

一方無茯苓薄荷有茯神生薑為引

治肝脾血虛鬱怒傷肝血少

目暗發熱脇痛等證

加丹皮梔子各七名八味逍遙散又名加味逍遙散治小便帶血或

過勞及多食炒炙宜清膀胱之火柴胡當歸加倍白朮加五分

和氣安胎飲

治孕婦多怒胸中脹滿若用烏藥香附砂仁順氣等藥反加滿悶宜服此

飲

人參

白朮

土炒

當歸

酒洗各二錢

川芎

條芩

各八分

陳皮

紫蘇

炙草

各四分

木香

磨汁

服衝

薑引煎服

一方無木香有砂仁四名順氣安胎散治孕婦胎氣上攻心腹脹滿作痛子懸

之證有因氣惱者加木香分磨衝服

加參平胃散

治孕婦脾氣虛弱飲食停滯以致腹脹嘔吐安胎飲力緩宜用此散

人參

白朮

土炒各一錢

蒼朮

未汁製

厚朴

薑製七分

陳皮

炙草

各四分

薑一片水煎服

尊生和氣飲

治孕婦心胃脹滿

人參

蘇梗

白芍

酒炒各六分

川芎

各六分

當歸

一錢或六分酒洗

腹皮

五分

木香

二分磨

炙草

三分

水煎服

附針灸方

妊娠六七箇月飲食絕然不進胸膈脹水與藥皆不能下診脈平和又非病脈此乃隔氣不通藥不能治惟針灸可通宜灸內關穴即能進飲食矣其穴在手掌大紋後二寸兩筋間此穴可針亦可灸男左女右重則雙手同灸輕者七壯重加十數壯艾如黍大或如麥大刺取

本人同身寸以男左女右手中指屈回用草較所屈中指中節內紋兩頭進處截斷為準一寸也

紫蘇飲

見本卷
安胎門

小柴胡湯

見本卷
諸痛門

加味歸脾湯

見本卷
小產門
附歸脾湯下

諸血證論

妊娠漏極如同月水胞乾胎死母亦難保其調治之方已詳論於胎漏門中茲不重論

妊娠吐血凡七情內傷六淫外感皆足致失血之患一主火熱者以氣血擁養胎元或有所感

則氣逆而火上乘心煩滿悶血隨而溢甚者或致墮胎但火有虛實之分實火清熱養血虛火

滋陰補水則血安胎固若泛用行血清血之劑胎必墮而禍不旋踵矣如肝經怒火加味逍遙

散膏梁積熱加味清胃散鬱結傷脾加味歸脾湯肺經有火黃芩清肺飲因氣鬱滯紫蘇飲氣

不攝血補中益氣去升麻加煨葛根腎經虛火冬味地黃湯

鼻衄不止東垣涼膈散加當歸生地各一芽花一大生薑引

咳嗽咳血宜涼血地黃湯醫通云咳嗽咯衄胎前皆不宜見如面赤聲啞不治又云凡咯吐血

多致墮胎胎賴血養不宜漏溢宜紫蘇飲加條芩

尿血乃熱乘血分流滲於膀胱故令尿血自尿門而下若胎漏則自人門下血可辨宜四物加山

梔髮灰或阿膠熟地麥冬五味之類如怒動肝火小柴胡加山梔脾氣下陷及勞動脾火補中

益氣加茯苓車前若厚味積熱加味清胃散若肝脾血熱加味逍遙散

腸風臟毒下血者平胃散去蒼朮加槐角防風當歸烏梅治之

加味清胃散治胃中蘊熱班疹口舌生瘡齒齦腐爛出血

生地四錢丹皮五錢當歸川連酒連翹三錢升麻生草各一錢
為散分三服水煎去滓衝犀角磨汁三四分入藥服之

黃芩清肺飲 治渴而小便不利

梔子黑炒 黃芩

各等分煎服。予謂此方乃治雜證發渴而小便不利妙在熱服探吐以提。則肺氣立清。然胎前血證探吐之法似非所宜。若服而不吐。不特綿延不能刻應。縱或小瘥。其苦寒之性留薄於內。大傷氣血之氣。治胎前者。得不為之預慮乎。

冬味地黃湯附丸方

熟地四錢 山藥二錢

山萸一錢 古方

丹皮

茯苓

澤瀉各七

麥冬一錢 或

五味子一錢

水煎服。此方藥味十倍之。煉蜜丸。即名冬味地黃丸。又名八仙長壽丸。

涼血地黃湯

治姙娠咳嗽吐血咳血

生地三錢 麥冬去心

當歸酒洗各二錢

黃芩一錢

紫苑

知母鹽水

白朮土炒

天冬去心各

犀角分八 陳皮

甘草各四錢

水煎服。有喘加瓜蒌仁一錢

加味道還散見本卷子懸門

加味歸脾湯見本卷胎前下

紫蘇飲

四物湯俱見本卷

補中益氣湯

東垣涼膈散

小柴胡湯

平胃散俱見本卷

子腫子氣子滿論

呼子滿證即俗胎水證也

妊娠子腫與子氣相類。但子氣在下體。子腫在頭面。若子滿證。又名為胎水。則在五六月已後。比子氣子腫不同。蓋胎大則腹滿。遍身浮腫。凡子氣子腫子滿。由臟氣本弱。或因泄瀉下利。耗傷脾胃。或寒熱瘧疾。煩渴加飲。濕漬脾胃。使頭面手足浮腫也。然水漬於胞。兒未成形。則胎多損壞。故初妊即腫。急宜調治。水去脈消。仍用六君子調補。

所謂子腫者。妊娠面目虛浮多。因脾胃氣虛。或久瀉所致。宜健脾胃利水。全生白朮散主之。或用健脾利水湯。如未應用六君子湯。或加腹皮車前。又專治肢體如水氣之證。亦有用加味五皮湯。治子腫之甚者。

所謂子氣者。妊娠自三月成胎之後。兩足面漸腫至腿膝。或腰以下腫。行步艱難。以致喘悶不安。飲食不美。似水氣狀。甚至脚指間有黃水出者。蓋脾主四肢。脾氣虛弱。不能制水。而發腫。肺金少母氣滋養。而氣促滿悶。諸書名曰子氣。即水氣俗名皺脚。治此病者。先服加味天仙藤散。如不效。則服茯苓湯。再不效。服補中益氣湯。加茯苓。若飲食失節。嘔吐泄瀉。六君子湯。或加炮薑木香香附。若脾肺氣滯。加味歸脾湯。佐以加味逍遙散。或紫蘇飲。至孕婦八九箇月。脛腿俱腫。非水氣比。不可以水氣治之。反傷正氣。凡有此者。必易產。因胞臟中水血俱多。不致胎燥也。所謂子滿者。妊娠至五六箇月。胸腹急脹。腹大異常。或遍身浮腫。胸脇不分。氣逆不安。小便艱澀。名曰子滿。又為胎水不利。若不早治。生子手足軟短有疾。甚致胎死腹中。宜服千金鯉魚湯。治其水。如脾虛不運。清濁不分。佐以四君五皮。亦有用東胎飲。以治子滿證甚效。曾有妊娠腹脹。服鯉魚湯三五劑。大小便皆下惡水。腫消脹去。遂下死胎。此證每因懷孕腹大。終不知胎水之患。即水漬損胎也。

全生白木散 治妊娠面目虛浮。如水腫脹。

白木一兩 生薑皮大腹皮製淨 茯苓皮陳皮各五

共為細末。每服二錢。不拘時米飲調下。此方較澹寮五皮散稍善。中間惟白木易桑皮。而功用懸殊。誠點鐵成金手也。全書云。如未應。佐以人參甘草。

健脾利水湯 治孕婦面目虛浮。多因脾胃氣虛。或久瀉所致。

人參 茯苓 各一錢 白木土 當歸酒洗各二錢 川芎 大腹皮黑豆水製淨 紫蘇 陳皮各

薑皮一片水煎服

加味五皮湯 治孕婦面目身體四肢浮腫者。此胎水泛溢。謂之子腫。白木有陳皮治無

大腹皮後浮腫小 桑白皮炒 生薑皮 茯苓用赤 白木土 加紫蘇連梗各

藥二枚去核水煎服。服時以木香磨濃汁三匙入藥內。

加味天仙膝散 治孕婦腰脚腫。虛人多此證。

天仙膝即青木香 製香附 紫蘇各六 陳皮分四 烏藥分五 木香分四

薑皮三片 虛人加人參錢一 土炒白木錢二 酒洗當歸錢二 或兼服補中益氣湯。

茯苓湯 治孕婦六七箇月以來兩足腫大。行步艱難。脚指間有黃水出。此名子氣。人多

有之。生子之後。其腫自消。甚者此湯主之。

白茯苓 白木土 陳皮 製香附 烏藥各一 紫蘇連梗 炙草各五 木瓜片三

生薑皮引水煎空心服

千金鯉魚湯 治孕婦胸腹脹滿。或遍身浮腫。小便艱澀。名曰子滿。又為胎水不利。或胸