

一痘出不快者有數證須審其有無外感內傷而辨治其所病
○如冬月嚴寒或非時陰邪外閉寒勝而出遲者宜五物煎
加生薑麻黃細辛之類主之或五積散亦佳○如夏月火熱
薰蒸以致血熱氣虛煩渴發燥而出遲者宜人參白虎湯加
木通乾葛主之○有因時氣不正爲風寒外邪所襲以致皮
腠閉密發熱無汗而出遲者其證必頭痛鼻塞四體拘急酸
痛宜疎邪飲參蘓飲慳慳散之類主之○若本無諸邪而出
不快者此氣血內虛不能驅毒托送而畱連於內宜十宣散
或托裏消毒散○若氣分大虛而出不快者宜保元湯六氣

煎血分大虛者宜五物煎或六物煎加減主之○若內有所傷氣滯而出不快者宜勻氣散橘皮湯加減主之○頭面出不快當用川芎荊芥羌活防風天麻之類爲引使○胸腹出不快當用藁本升麻紫蘂及紫草木通湯○四肢出不快當用桂枝乾葛甘草連鬚紫草葱白各加生薑爲佐連進二服出白快矣

一痘不起發者雖證有不同然率由血氣內虛不能托送者居多此中或宜兼解散或專補元氣當辨而治之○凡出齊之後或被風寒所閉而發熱頭痛陷伏不起者宜羌活散參蘂

飲加內托等藥治之○若紅點初出暗昧乾燥不起發者凶
宜四物湯加紫草紅花丁香蟬退官桂或調無價散量兒大
小與之○若便實內熱隱隱肌肉間不起發者宜紫草飲子
○若血分微熱而毒不能達者宜托裏消毒散○若氣虛氣
陷不起者保元湯或蟬退膏加黃芪○若血虛不起者芎歸
湯四物湯○若血分虛寒不起者五物煎○若氣分虛寒不
起者保元湯六氣煎○若氣血俱虛不起者六物煎托裏散
○凡以上補助氣血等劑須加好酒人乳糯米更炒○凡發
痘之藥用本不同有以毒攻毒而發痘者如川山甲人牙蟬

酖蟬退之屬是也有解毒清毒而發痘者如紫草紅花牛旁
子犀角木通連翹金銀花之屬是也有升提氣血而發痘者
如川芎白芷荆芥升麻蔓荊子之屬是也有解散寒邪而發
痘者如麻黃桂枝柴胡乾葛防風紫蘊葱白之屬是也有行
氣行滯以通壅塞而發痘者如丁香木香陳皮厚朴山查大
黃之屬是也有益火回陽健脾止瀉而發痘者如附子肉桂
乾薑肉豆蔻之屬是也凡此者孰非托裏起痘之法然但可
以此爲佐而必以血氣爲主則在乎四君四物十全大補之
類庶乎隨手而應無不善矣

虛證見於報痘之時卽當速爲培補失此不治必不能貫漿
結痂十日後必致不救蓋痘瘡實熱者毒盛可畏虛寒者內
敗可畏但實熱證顯虛寒證隱人多誤認故爲害反甚且痘
瘡之所賴者惟飲食血氣飲食之本在脾胃血氣之本在肝
腎但使脾胃氣強則滋灌有力而無內虛陷伏之憂氣血克
暢則毒皆生化而無表虛痒瘍之患此其在氣在血或微或
甚所當早辨而治也○凡痘出灰白不紅綻或灰黑頂陷或
身無大熱皮嫩色光溶溶如淫濕之狀或口不渴飲食少腹
膨瀡泄二便清涼皆表裏虛寒證也○若氣虛者宜調元湯

四君子湯○氣虛微滯者五味異功散○氣虛宜溫者保元湯六氣煎○脾氣虛寒者養中煎溫胃飲或理中湯○血虛者四物湯○血虛宜溫者五物煎○氣血俱虛者六物煎五福飲或八珍湯○氣血俱虛而寒者十全大補湯○脾腎血氣大虛大寒者九味異功煎六味回陽飲○脾胃虛寒氣滯者陳氏十二味異功散○凡痘瘡色灰白不起發者氣虛也候出齊以保元湯和木通川芎最穩

一火證熱毒在見點之後宜速爲清解若不早治則日甚一日必致不救○凡見點太赤根下皮色通紅此血熱氣有不能

管束也後必起發太驟皮嫩易破或痒癩不可救宜急清血
分之熱用涼血養營煎或鼠粘子湯或用六味消毒飲加芍
藥治之或四味消毒飲益丸散俱佳○凡痘瘡已現毒泄則
熱當自解若瘡已出而壯熱不減此毒蘊於內其勢方張其
瘡必密宜解其毒用柴葛煎或鼠粘子湯○凡見點之後壯
熱不退或三四點相連色紅帶紫或根窠焦色紅紫成片或
口唇熱燥煩渴喜冷舌上有胎或二便燥澀此表裏皆熱毒
盛之重候急須清熱解毒如表熱甚者宜柴葛煎裏熱甚者
宜搜毒煎加柴胡或用六味消毒飲加酒芩木通梔子黃連

山查蟬退歸芍紅花之類或調退火丹加減用之○如熱毒
內甚而發驚狂譫語者宜用紫草煎湯磨犀角汁調硃砂益
元散或退火丹解之○以上凡解毒之後紅紫退二便調能
食不渴此表裏皆清也切勿再爲解毒須急以保元湯四物
湯六物煎之類調補氣血以助貫漿收靨否則恐變痒瘍而
不能善其後矣○如痘瘡內熱之甚大便鞭結不通大渴煩
燥腹脹滿脉見洪數而痘出不快者此熱毒壅伏於內須通
利之以祛其熱毒宜柴胡飲子或三黃丸甚則承氣湯或用
倍瞻導之然此惟熱毒在裏痘形未見不得已而微下之可

也若班點隱隱見於皮膚中者此已發越在表乃痘瘡正發之時切不可妄用下藥○凡痘瘡初出但見紅點稠密急用纏豆藤燒存性加製過硃砂連進二三服或用薄荷牛旁子煎湯調退火丹服之另用吳茱萸爲末以水調攤足心引下熱毒亦可解散其勢

一痘出變黑乃危證也蓋痘瘡賴血氣滋灌血足氣克則痘自紅活若熱毒薰燥則成焦黑若陽氣不克則成灰黑且黑爲水色其虧在腎以陰犯陽最爲惡候當辨而治之○若熱毒凝聚大便秘結或煩躁熱渴而爲焦紫黑陷者須通其便先

以解裏之急宜柴胡飲子或當歸丸得利後宜卽以紫草飲
或加味四聖散以化表之毒仍用胭脂汁以塗之○若大便
不結別無大熱等證而痘色黯黑者總由脾虛不能制水故
見黑色宜速用五物煎或保元湯加紫草紅花服之外點以
四聖丹胭脂汁若漸見紅活則吉若更乾黑則凶○心鑑云
凡治黑痘當用保元湯加芎桂補提其氣氣旺則諸毒自散
黑者轉黃屢試屢驗

一夾疹夾斑證本非痘中吉兆然亦有輕重之辨宜酌而治之
外有本條仍宜參閱○凡發熱二三日之間痘形未見忽然

變身發出紅點一層密如蚊蚤所咬者決非痘也此乃斑疹之屬多爲風寒所遏不能發越而斑先見也宜疎邪飲柴葛煎或敗毒散之屬微散而解之但得身涼斑必自退再越一日痘出必輕矣○凡痘夾斑疹齊出者亦宜辨其寒熱若表裏俱熱而邪不解者宜柴葛煎加減主之○若熱邪不甚而表邪甚者宜疎邪飲或柴歸飲加羌活防風乾葛之類主之或敗毒散亦可用○若痘夾紅斑如綿紋者宜涼血化毒湯加柴胡黃芩玄參犀角之屬主之○若痘出夾斑夾疹而眼紅唇裂者表熱也煩躁大渴妄言妄見者裏熱也表裏俱熱

最爲凶證若不表裏兼治何由得解宜雙解散主之○若加悶亂氣喘者必不治

一賊痘者於出齊之後其中有獨紅獨赤獨大摸之皮軟而不碍手者此賊痘也過三日之外必變成水泡甚至紫黑泡皆危證也急用保元湯或六氣煎加紫草紅花蟬退解之或用燈草木通煎湯調下益元散利去心經之熱而紅自退○如已成水泡宜用保元湯倍加四苓散利之此秘法也不然則遍身擦破臭爛而死

一病於未出之先倘有濕瘡膿水流注者用滑石末敷之以防

其漏氣或真正綠豆粉亦可

起發三朝治欵 二十六

痘瘡放標之後漸漸起張但肥胖一分是胎毒發出一分胖盡而毒出盡也有不起者或因元氣之弱不能送毒或有襍證阻滯不能升發皆痘前之失調理也此時當速治之否則後難爲矣

一痘宜漸發者吉若一齊湧出皮肉虛腫者此表虛不能收攝故奔潰而出後必痒癢或成潰爛急宜人參固肌湯或芎歸湯○若血熱者宜涼血養營煎○虛甚者宜六物煎○毒盛

者宜六味消毒飲或四味消毒飲出入用之

一痘不起發或起而不透者多由元氣內虛不能托送故毒氣
畱伏不出也毒不盡出則變證莫測凡見此者速當救裏以
托其毒然當察其氣分血分辨而治之蓋痘之壯突由乎氣
肥澤由乎血氣主响之血主濡之也若形雖壯而色見枯者
此氣至而血不榮也宜四物湯加入參麥門冬之類主之○
若痘色紅潤而形平陷者此血至而氣不充也宜保元湯或
六氣煎加川芎主之若形色俱弱而不起發者此氣血俱不
足也宜六物煎加減主之或保元湯十全大補湯調無價散

或獨聖散與之○若冬春之間爲寒氣所抑不能起發者宜麻黃甘草湯加歸芪或十宣散主之○若夏秋火盛不起而煩渴秘結內熱者宜人參白虎湯○若痘瘡起脹遲延不紅活者宜保元湯或六物煎加丁香山查糯米人乳好酒主之或用無價散量兒大小以好酒調服○凡痘瘡起發通身皆欲其透惟四肢稍遠難齊若脾胃素強能食者勿慮惟脾胃素弱食少者四肢多有不透以脾主四肢津液不能灌溉故也宜以補脾爲主用快斑越婢湯加當歸或黃芪建中湯加人參防風○若因誤服涼藥而致白癰不起者宜理中湯或

胃愛散

一痘雖起發若灰白色或頂陷者氣虛也切不可用寒涼之藥
須六氣煎加丁香川芎人乳好酒主之或保元湯倍加酒炒
黃芪當歸亦佳

一痘雖起發紅活若頂平色嫩皮薄不能堅厚者此氣虛也必
恐變爲痒癩宜六氣煎或六物煎加減主之或十全大補湯
十宣散俱可擇用

一地紅血散不附者保元湯加芍藥當歸稍以收斂歸附氣位
一根窠淡紅線暈枯燥者血虛也宜保元湯加當歸川芎酒洗

紅花再加山查以行參芪之滯少加水香以行氣而血自活也

一痘雖起發而乾枯無水或青紫黯色不久必變黑陷乃血虛之甚也宜四物湯加人參麥門冬紫草紅花或調服無價散外用水楊湯浴之兼用脂胭塗法

一痘瘡紅甚而引飲渴不止者名曰燥痘宜犀角地黃湯之屬
一痘色紅紫滿頂或掀腫者血熱毒盛也宜涼血養營煎加丹
皮木通牛旁子之屬主之然痘出六日以後有此證者多死
一痘已出齊而熱尙不退或煩躁發渴引飲或二火司氣之令