

卷陸

第三十本

新
增
全圖足本醫宗金鑑

海上

局書新啟

行發



御纂醫宗金鑑卷六

編輯外科心法要訣

舌部

紫舌脹

紫舌脹屬心經火熱盛血壅腫硬疼舌腫滿口宜鍼刺血色紫重色紅輕註此證由心經火盛血壅以致舌腫滿口堅硬疼痛宜用衣鍼紮筋頭上露鋒分許當舌刺數十刺令血出紅色者輕紫色者重隨以溫水漱口搽冰硼散內用涼膈散去朴硝大黃加牛蒡子荊芥倍用梔子服之甚效

冰硼散

見口部驚口瘡

涼膈散

見面部發毒

痰包

痰包每在舌下生結腫綿軟似胞形痛脹舌下妨食語火稽痰涎流注成〔註〕此證生於舌下結腫如胞光軟如綿塞脹舌下有妨飲食言語色黃木痛由火稽痰涎流注而成宜用利剪當包上翦破出痰涎如雞子清稠黏不斷拭淨搽冰硼散服加味二陳湯忌煎炒火酒等物

加味二陳湯

陳皮

半夏製

白茯苓

黃芩各八分

黃連

薄荷

甘草

各五分生

水二鍾薑三片煎八分食前

服

方歌

加味二陳療痰包結腫舌下形如胞二陳湯加苓連薄荷薑煎服下自然

消

冰硼散

見口部鵝口瘡

舌衄

舌衄心火血分炎舌上生孔似鐵尖或如筋頭其色紫甚黑腐爛血出泉

註

此證係舌上忽生孔小者如鍼尖大者如筋頭其孔色紫屬熱甚色黑防腐爛

血出如泉湧由心火上炎以致血熱妄行而成宜服升麻湯兼搽必勝散甚效

升麻湯

升麻

小薊根

茜根

各一兩五錢

艾葉

七錢五分

寒水石

三兩

共研每三錢水一鍾煎七分澄去渣入生地黃汁一羹匙再

煎二滾溫服或加炒側柏葉五錢亦可

方歌

升麻舌衄心火炎小薊茜根各兩半艾葉七錢五分加寒水三兩同研

爛

必勝散

螺青

另研

蒲黃

各一錢炒

共合一處研細搽於患處後



用溫鹽湯漱口

〔方歌〕必勝心熱血妄行舌生小孔湧血紅螺青研末蒲黃炒同勻搽之自歸經

重舌 痰核 重腭 舌疔

舌證發於心脾經其證皆由積熱成重舌舌下血脈脹痰核舌上一核生重舌生於口上腭時覺心煩梅子形舌疔舌上生紫皰其形如豆寒熱增〔註〕此證無論大人小兒俱可以生重舌者由心脾蘊熱循經上沖舌本遂令舌下血脈脹起如小舌狀故名重舌宜用冰硼散搽之痰核者心脾痰涎鬱熱舌上生核強硬作痛宜用衣鍼點破搽冰硼散內服加味二陳湯重腭者心脾有熱以致上腭生瘡形如梅子外無寒熱內時作煩此屬熱極禁用鍼刺宜服黃連解毒湯加桔梗不時用紫雪散噙化舌疔者心脾火毒舌生紫皰其形如豆堅硬寒熱疼痛應心初起宜用蟾酥丸含於舌下隨化隨嚥或再服三粒以解內毒甚者刺之服黃連解毒湯兼搽紫雪散及徐徐嚥之即愈

紫雪散

犀角 鎊

羚羊角 鎊

石膏

寒水石

升麻 各一兩

元參 二兩

甘草 八錢

沉香 剉

木香 各五錢

水五盞煎藥刺湯一盞將滓用絹濾去將湯再煎滾投提淨朴硝三兩六錢
文火慢煎水氣將盡欲凝結之時傾入盞內下硃砂冰片各三錢金箔一百
張各預研細和勻將藥盞安入涼水盆中候冷凝如雪為度大人每用一錢
小兒二分十歲者五分徐徐嚥之即效或用淡竹葉燈心煎湯化服亦可咽
喉腫痛等證吹之亦效

[方歌] 紫雪散醫積熱效沉木犀羚羊參草寒水升膏朴硝加硃冰箔研入內
攪

冰硼散

見口部
鵝口瘡

加味二陳湯

見痰包

黃連解毒湯

見耳部
黑疔

蟾酥丸

見疔
瘡門

舌疳

附癰
癰風

舌疳心脾毒火成如豆如菌痛爛紅漸若泛蓮難飲食綿潰久變瘰癧風〔註〕
此證由心脾毒火所致其證最惡初如豆次如菌頭大蒂小又名舌菌疼痛紅
爛魚皮朝輕暮重急用北庭丹點之自然消縮而愈若失於調治以致焮腫突
如泛蓮或有狀如雞冠舌本短縮不能伸舒妨礙飲食言語時津臭涎再因怒
氣上沖忽然崩裂血出不止久久延及項領腫如結核堅硬聾痛皮色如常頂

輒一點色暗木紅破後時津臭水腐如爛棉其證雖破堅硬腫痛仍前不退此為綿潰甚至透舌穿腮湯水漏出是以又名瘰癧風也蓋舌本屬心舌邊屬脾因心緒煩擾則生火思慮傷脾則氣鬱鬱甚而成斯疾其證外勢頗類喉風但喉風咽喉常腫湯水不能下嚥此證咽喉不腫可以下嚥湯水胃中亦思飲食因舌不能轉動迭送硬食故每食不能充足致令胃中空虛而怯證應添日漸衰敗初起宜服導赤湯加黃連虛者服歸脾湯熱甚者服清涼甘露飲合歸脾湯便溏者服歸芍異功湯領下腫核初起宜用錦地羅蘸醋磨濃敷之潰後宜水澄膏貼之自古治法雖多然此證百無一生縱施藥餌不過苟延歲月而已清溪秘傳北庭丹

番硃砂

人中白

各五錢

瓦上青苔

瓦松

塘雞矢

各一錢

用傾銀罐二個將藥裝在罐內將口封嚴外

用鹽泥封固以炭火煨紅待三炷香為度候冷開罐將藥取出入麝香冰片各一分共研細末用磁鍼刺破舌菌用丹少許點上再以蒲黃蓋之

方歌

北庭丹點舌菌生瓦松塘雞矢人中瓦上青苔番硃砂末罐封火煨入麝

冰

歸芍異功湯

人參

白朮

土炒

廣陳皮

白芍

酒炒

當歸身

錢各一

白茯苓

錢二

甘草

炙五分

燈心五十寸水煎空心服

劑

方歌 歸芍異功扶脾氣健胃又能止瀉利四君歸芍廣陳皮引加燈心是良

水澄膏

硃砂

二錢 飛

白及

白斂

五倍子

鬱金

各一 兩

雄黃

乳香

各五 錢

以上為細末米醋調濃以厚

紙攤貼之

方歌

水澄膏貼潰核驗水飛硃砂末二錢及斂鬱金雄黃乳五倍同研用醋

攤

導赤湯

見口部 口糜

歸脾湯

見乳部 結核 乳

清涼甘露飲

見唇部 齒齦

喉部

緊喉風

附風 喉

緊喉膏梁風火成咽喉腫痛難出聲聲如拽鋸痰壅塞穴刺少商吐下功

註

此證由膏梁厚味太過致肺胃積熱復受邪風風熱相搏上壅咽喉腫痛聲音難出湯水不下痰涎壅塞之聲頗似拽鋸初發暴速急刺手大指內側少商穴出紫黑血以瀉其熱痰盛者以桐油錢導吐之吐痰後隨用甘草湯漱之以解

桐油之氣內服雄黃解毒丸吐下之喉中吹白降雪散俟關開之後內宜服清咽利膈湯按法調治隨手應效者順若面青唇黑鼻流冷涕者逆若兼項外透腫即名纏喉風其治法雖與此證相同然終屬險惡難治

桐油錢

溫水半盞加桐油四匙攪勻用硬雞翎蘸油探入喉內撚之

連探四五次其痰壅出再探再吐以人醒聲高為度

方歌

桐油錢法導痰壅一切喉風用最靈半盞溫水桐油入雞翎蘸探吐喉

通

雄黃解毒丸

雄黃一兩

鬱金一錢

巴豆十四粒
去皮油

共研末醋糊

為丸如黍粒大每服五分津液送下

方歌

雄黃解毒緊喉風開關通閉火能平巴豆去油鬱金末醋糊為丸黍粒

形

白降雪散

石膏一錢
分五

硼砂一錢

煅硝

膽礬各五
分

元明粉三分

冰片二分

共研極細末以筆管吹入喉內

方歌

白降雪散喉風證腫痛聲難風火凝煅石膏與膽礬末煅硝硼片共元

明

清咽利膈湯

牛蒡子

研炒

連翹

去心

荊芥

防風

梔子

研生

桔梗

元參

黃連

金銀花

黃芩

薄荷

甘草

各一錢生

大黃

朴硝

各錢

水二鍾淡竹葉二錢煎八分食遠服

方歌

清咽利膈喉痛消疎風清熱蒡連翹荊防梔桔參連草銀花苓薄大黃

硝

慢喉風

慢喉發緩體虛生微腫咽乾色淡紅或由暴怒五辛火或因憂思過度成

註

此證有因平素體虛更兼暴怒或過食五辛而生者亦有憂思太過而成者俱屬體虛病實其發緩其色淡其腫微其咽乾舌見滑白胎大便自利六脈微細脣如鑿色若午前痛者服補中益氣湯加以清涼如麥冬黑參桔梗牛蒡子服之若午後作痛作渴身熱足冷者陰陽兩虛也忌用苦寒宜少陰甘桔湯以宣達之若面赤咽乾不渴者其脈必虛大以甘露飲服之必效俱兼用冰硼散一錢加燈草煨灰存性三分吹之立驗

甘露飲

天冬

去心

麥冬

去心

黃芩

生地

熟地

枇杷葉蜜炙

石斛

枳殼炒

茵陳蒿

甘草各等分

水二鍾煎八分食後服

〔方歌〕 甘露飲清內熱侵面赤咽乾生液津天麥冬苓生熟地枇杷斛草枳茵

補中益氣湯

見潰瘍門

少陰甘桔湯

見口部

冰硼散

見口部

喉閉

附酒毒

喉閉肝肺火盛由風寒相搏腫咽喉甚則腫痛連項外又有酒毒當細求

〔註〕

此證由肝肺火盛復受風寒相搏而成咽喉腫痛面赤腮腫甚則項外漫腫喉中有塊如拳湯水難嚥語言不出暴起身發寒熱急刺少商穴或鍼合谷穴以開咽喉初宜疎散服荊防敗毒散寒熱已退即用清咽利膈湯兼吹紫雪散隨以薑汁漱口以宣其熱或用醋漱以消積血痰壅塞者桐油錢探吐痰涎若腫發於項外膿脹痛者防透咽喉不可輕鍼急用皂角末吹鼻取嚏其腫即破或兼用皂角末醋調厚敷項腫須臾即破初腫時用生羊肉片貼之喉閉聲嘶者肺氣將絕急宜獨參湯救之若卒然如啞吞吐不利係寒氣客於會厭也宜蜜炙附子片含之勿嚥初終忌用苦寒之藥恐難消難潰又有酒毒喉閉由酒毒



蒸於心脾二經熱壅咽喉腫色黃其人面赤目睛上視以桐油餞導吐痰涎
宜服鼠黏子解毒湯亦用紫雪散吹之

鼠黏子解毒湯 鼠黏子炒研 桔梗 青皮 升麻

黃芩 花粉 甘草生 元參 梔子研生

黃連 連翹去心 葛根 白朮炒土 防風

生地各等分 水煎食後服

方歌 鼠黏解毒酒毒閉桔梗青皮能降氣升花粉草元參梔連翹葛朮防

地

荆防敗毒散見項部 清咽利膈湯 桐油餞俱見緊 紫雪散見舌部重

舌 獨參湯見潰瘍門

啞瘡喉風

啞瘡喉風腫痛咽牙關緊急不能言風痰湧塞咽膈上火盛生痰風搏源一註

此證頗類緊喉由肺胃蘊熱積久生痰外受風邪與痰熱相搏湧塞咽膈之上

而成斯疾初起咽喉腫塞疼痛湯水難嚥語言不出牙關緊急此屬險候急用

雄黃解毒丸水化用細竹管將藥水吹入鼻孔直達咽喉藥入作嘔即令患者



吐之其牙關頓鬆咽喉即稍開通先與米飲飲之次服清咽利膈湯兼吹冰硼散用藥不應者險若唇黑鼻流冷涕者逆

雄黃解毒丸

清咽利膈湯

俱見喉風緊

冰硼散

見口部瘡

弄舌喉風

弄舌喉風心脾經實火外寒凝滯成舌出攪動因脹悶咽喉作腫更兼痰涎此證由心脾實火與外寒鬱遏凝滯而成咽喉腫痛痰涎堵塞音啞言澀舌出不縮時時攪動覺舌脹悶常欲以手捫之故名弄舌急刺少商穴穴在兩手大指裏側去指甲角旁韭葉寬即是用三稜鍼刺之有血者生無血者死噙蟾酥丸徐徐嚥藥汁若痰涎上湧不能嚥藥者急用桐油餞探吐痰涎隨服清咽利膈湯吹金鎖匙若喉內如松子及魚鱗狀不堵塞者此屬虛陰上浮急用蜜灸附子片噙嚥其汁即效

金鎖匙

冰片

二分五釐

白殭蠶

錢一

雄黃

錢二

煇硝

錢一兩五錢

硼砂

五錢

各研末和勻以細筆管吹入喉內腫痛處

方歌

金鎖匙吹弄舌風心脾火鬱外寒乘消痰逐熱陳疼痛冰片殭蠶雄煇

硼

蟾酥丸

見疔瘡門

桐油錢

清咽利膈湯

俱見喉風緊

喉疳

喉疳初覺陰虛成噤乾刺痛色淡紅腎火炎上金受尅破爛失音臭腐疼
此證一名陰虛喉疳初覺咽噤乾燥如毛草常刺喉中又如硬物隘於咽下嘔
吐酸水噦出甜涎淡紅微腫微痛日久其色紫暗不鮮頗似凍榴子色由腎液
久虧相火炎上消燍肺金薰燎咽喉腫痛日增破爛腐衣疊若蝦皮聲音雌症
喘急多痰臭腐蝕延其疼倍增妨礙飲食胃氣由此漸衰而虛火益盛煩躁者
宜服知藥地黃湯若吐酸噦涎者宜服甘露飲加川黃連便燥者兼服萬氏潤
燥膏面脣俱白不寐懶食者宜歸脾湯加酒炒川黃連腫吹紫雪散腐吹八寶
珍珠散其證投方應病或者十全一二否則難救

萬氏潤燥膏

豬脂一觔切碎煉油去滓加煉過白蜂蜜一觔攪勻候凝挑

服二匙日用三五次

方歌

萬氏潤燥膏神驗降火清金滋便乾豬脂煉油加白蜜挑服失音也能

痊

八寶珍珠散

兒茶

川連末

川貝母

研去心

青黛

各一分錢

紅褐燒灰存性

官粉

黃藥末

魚腦石微煨

琥珀末各一錢

人中白二錢煨

硼砂八分

冰片六分

京牛黃

珍珠各五分

煮半炷香時取出研末

麝香三分

各研極細末共兌一處再研勻以細筆管吹

入喉內爛肉處

方歌 八寶珍珠喉疳腐冰麝兒茶連貝母紅褐官粉黛牛黃腦石中白藥硼

琥

知藥地黃湯

即六味地黃丸加知母黃藥見面部雀斑

甘露飲見慢喉風

歸脾湯見乳部乳中結核

喉癰

喉癰咽乾生苔癰初癢時增燥裂疼過飲藥酒五辛火微爛延開蟻蛀形〔註〕

此證一名天白蟻咽嗑乾燥初覺時癢次生苔癰色暗木紅燥裂疼痛時吐臭

涎妨礙飲食由過食炙博藥酒五辛等物以致熱積於胃胃火薰肺而成斯疾

宜服廣筆鼠黏湯未潰吹礬精散已潰吹清涼散患者清心寡慾戒厚味發物

或者十全一二若失治兼調理不謹致生微爛延漫開大疊起腐衣旁生小孔

若蟻蛀蝕之狀多致不救

廣筆鼠黏湯

生地黃

浙貝母各三錢去心研元參

甘草各二分生



鼠黏子

酒炒

花粉

射干

連翹

各二錢

白殭蠶

炒一錢

苦竹葉二十片水二鍾煎八分飢時服

方歌

廣筆鼠黏喉癰乾初癢生苔裂痛漆生地元參花粉貝連翹射干白殭

蠶

清溪祕傳礬精散

白礬

不拘多少研末用方磚一塊以火燒紅

覆蓋四面灰攤一日夜礬飛蠶上掃下用二錢

白霜梅

二箇核

真明雄黃

穿山甲

各一錢

共研細末以細筆管吹入喉內

方歌

礬精散用火燒磚水濕布礬上覆盤掃霜再兌雄梅甲研末吹喉癰自

痊

清涼散

硼砂

三錢

人中白

二錢

黃連末

一錢

南薄荷

六分

冰片

五分

青黛

四分

共研極細末吹入喉癰腐處

方歌

清涼散吹天白蟻胃火薰金成此疾薄黛冰硼中白連腐裂疼痛皆可

去

上腭癰

若葡萄形少陰三焦積熱成舌難伸縮鼻紅涕口難開合寒熱增

註

此證又名懸癰生於口中上腭由心腎經與三焦經積熱而成形若紫葡萄舌難伸縮口難開合鼻中時出紅涕令人寒熱大作宜黃連消毒飲加桔梗元參服之兼吹冰硼散或日久腫硬下垂不潰者以燒鹽散日點三五次兼服射干丸過時失治飲食不入煩躁神昏者逆

燒鹽散

食鹽燒火

枯白礬各等分

二味研細以筋頭蘸點患上

方歌 燒鹽散治上腭癰懸似葡萄色紫形枯礬燒鹽等分末筋頭蘸點消熱壅

射干丸

射干

川升麻

杏仁去皮尖

甘草各五錢炙

木鼈子

川大黃各二錢炒

以上研細末煉蜜和丸如小彈子大每用一

丸口中含化徐嚥

方歌 射干丸療懸癰患熱聚成形口開難大黃升草木鼈杏蜜丸彈狀口中含

黃連消毒飲

見頭部百會疽

冰硼散

見口部鵝口瘡

鎖喉毒

鎖喉毒生因積熱外感風寒耳前結外似瘰癧漸攻喉心與小腸聽會穴

註

此證由心與小腸積熱外感風寒凝結而成初生於耳前聽會穴形如瘰癧漸攻咽喉腫塞疼痛妨礙飲食證須速治宜服牛黃清心丸開關解熱兼服清咽利膈湯吹冰硼散投方應效方能成功

牛黃清心丸

九轉膽星

兩一

雄黃

黃連末

錢各二

茯神

元參

天竺黃

五倍子

末

荊芥

防風

桔梗

犀角末

當歸

錢各一

冰片

麝香

珍珠

各五分
豆腐煮

京牛黃

輕粉

各三分

各研極細末共和一處再研

勻甘草熬膏和丸如龍眼大硃砂為衣日中曬乾收入磁瓶內將瓶口堵嚴

勿令出氣臨服時一丸薄荷湯磨服

方歌

牛黃清心鎖喉毒茯輕冰麝參雄竺珍倍荊防桔膽星犀角歸連熱退

速

清咽利膈湯

見喉

冰硼散

見口

口部
瘡

乳蛾

乳蛾肺經積火成雙輕單重喉旁生狀若蠶蛾紅腫痛關前易治關後凶

〔註〕

此證由肺經積熱受風凝結而成生咽喉之旁狀如蠶蛾亦有形若棗栗者紅

