

酉 13

41642

張氏醫案



臨證經驗方目錄

咳嗽

風毒伏肺

內傷脾胃

嘔血

傷寒

呃

暑熱

血痢

晨瀉

春溫

食復

疫症

真脈

痺症

疝氣

中喝

瘰癧 消症 鼻衄 眩暈 淋濁 喉痺 勞瘵 濕溫 胃困

暴聾 黃疸 臍脹 痛經 噎膈 翻胃 崩漏 暑月着寒 勞瘵 霍亂

腹痛便秘 便秘 脹癰

溲秘 熱深厥深



臨證經驗方

胥江張仲華愛廬氏輯

桃德達直卿氏校

咳嗽

王冬月咳嗽極似着寒嗽陣急而痰湧白臍腹膨脹而便溼唐
左腕膈鳴響脉濡古白全是一派濕象何以發于冬令意者今陰
而過多水退極遲水濕之氣感而伏焉內經原有秋傷于濕冬生
咳嗽之文余幼時讀到此篇嘗疑其濕字或應燥字今見字是症
信有諸矣夫惟學然後知不足讀書雖易悟最難且揆以輕宣泄
化之法



中醫藥大學

1661

大學圖書館版權所有

生米仁通炒 乾佩蘭 枳壳 旋覆花

生杏仁 赤苓 大腹皮 蘇子 橘絡

晨瀉

張五載晨瀉起自產後納減形瘦足浮日甚一日培中分利之約

通嘗罔效詢係每在五鼓必腹中雷鳴切痛晨起一瀉之後痛除

而竟日安然脈已濡細又非挾滯其痛也始終不更其瀉也不專

責于脾矣產之時痧子雜來產五年中風痧頻發個中有奧妙焉

且方道破候全學見之一想

土炒白朮 煨肉果 炒防風 小赤豆 荊芥炭



炒霞天曲為生甘州。怪柳炭為丹皮炭。枯梗。

二五載之累一朝頓釋。蓋晨一遇症腹膨脹則有之。而雷鳴切痛者特少。是以斥帛責于脾虛而旁敲側擊。庶得窺其真諦。信哉。症之望聞問切四字不可缺一也。茲既服而見效。不必更以方藥就原方再服十劑以拔其根矣。

風毒伏肺

沈孝症數載。交秋必發。則淹延數旬。現見如膠如飴之痰。而詢其數載中起居平時所畏者熱。所喜者涼。膏肓之俞平靜之日。常冷發作之時。灼熱失肺。臟屬金。旺于秋。伏風層疊。蘊絡延為風。

毒清虛之臟性涼且潔奚肯容其盤踞于絡是以藉旺令必與之
爭衡耳風為陽邪其性易于化火化熱是以發病之際背脊熱
而目亦赤焉預撥一方候臨發時股之交夏季沐浴常以白部
煎熨其胸背務使津之有汗最佳管見若此安不候哉

生麻黃 紫苑 白部 前胡 射干

羚羊角 杏仁 炒枳壳 橘絡 土川貝

西瓜絡 冬瓜子 二味煎湯代水三四劑為妙則勿過服

春濕

畢身熱捷述解在兩候僅以不納不便為病診脈弦數舌根灰膩



胸脘痞悶汗未曾達詢係先輩曾誤服柴胡後人永不敢嘗今乃
少陽之明邪滯之阻柴胡為少陽泄邪要藥何能拘疑若不幸
泄邪通滯勢必陡然內陷之變揆表裡並疎切勿因循玩愒

柴胡 牛杏仁 連翹 枳壳 牛

豆卷 桔梗 前胡 廣皮

汗稍泄胸悶更甚痞不暢壯熱神糊病已數旬邪滯乍動躍
內陷之勢已見邪滯之久蘊可知矣病情正當猖熾何敢擅許坦
途

柴胡 枳實 連翹 丹皮 薔薇露 刀沖



葛根 芩實 炒竹茹 焦山梔 真珠粉 研細調服

三汗已暢達疹瘡大透表熱漸將解矣脈緩同除舌未化而煩
矢氣大便之下亦遲也揆輕清泄法參以潤下冀其腑分一通
無變細前此可謂養病以待其變幸而速與透達不則懊悔莫救

桑葉 杏仁 丹皮 炒枳實 炒竹茹
豆卷 麻仁 芩實 焦山梔 連翹

內傷脾胃

去年將及冠休貌未揚腹滿且硬大便澀結不常瓜菜生冷一向

性之所好童腹内伤脾胃即是疳膨食積蛔已病矣消尅大畏
損傷難復於培中疎中並進麥食生冷切宜痛戒

土炒白朮酒炒川連煨肉菓外炙鸡金川楝子卡

焦烏梅肉土炒五谷虫炒川椒土江枳壳花兵部

食復

左溫溫尔愈之时强食大牢雖曰多未病熱又復冒險之至後當
自慎於宗食復例分清

淡江豉炒只壳菜腹子陳稻柴一握洗并煎湯代水

焦山梔焦查肉廣藿梗陳皮姜梗

嘔血

馬表稟躁急酷嗜多食而勿嘗谷食者蓋有年矣夫肝用有餘
體而步為肝谷致使剛臟大失和平血嘔盈盈純是紫血凝塊
後火升肝陽有升無降但肝為藏血之臟將軍之性不剛則已
則猖獗若不向靜思順再多惱怒難料其不復蓋氣又為血
也於若降直折之法

龍胆竹下小川連下以東子子下生地炭下青鉛下

真蘆薈下炒烏梅下炙石決明下藕節炭下

疫疔

左吳壯熱神糊陡然而發脈數大而混糊失序舌垢膩而齒齲布
失氣頻轉小波自遺腕腹按硬氣粗痰鳴既非尋常六氣所感病
非真中類中之症觀其氣自汗熱而不粘指轉側自如如
無強直之態古能伸縮斷不近中設使外感何致一發即劇而
能自來倘宗傷寒法先表後裏下不嫌遲之論待其覺矢當讀吳
不可先裏後表急下存陰之論不蓋是症也一見藍癰胃已爛而
胞絡已陷凡速昇常蓋早議下尚可僥倖於萬一諸同學為然否

生軍紋今次卷今

摩沖松壳今換郎今

製川朴今肥知以今煨枳實今陳皮今

發神志時清表熱自汗腹猶拒按矢氣頻下便下粘膩極穢者未
暢小波滴点必由脉數累有次序舌苔層有垢濁胃中泛濫者未
之勢尚是勇凶必得再下須俟裡滯漸楚然後退就于表裏又
治疫之論蓋亦闡發前人所未備甚至三下退而走表者若
尋常發熱症治之豈不謬乎

炒川連 下製川朴 炒知母 生軍 收年

炒枳壳 炒銀花 丹 皮 元明粉 滑石

診大腑暢通悉是如醬如飴極穢之屎腹已軟而神已爽表熱壯
而汗反艰舌苔半化脉數較緩渴喜飲熱小波稍多此滌腑分之

蒸變乍平病邪退出表分當以疎達先裏表之論信不誣也

柴胡半炒枳實半連翹半赤苓之法半夏半

霍梗半製川朴半廣皮半通朴半大腹皮半

四表熱隨汗就和舌苔又化一層脈轉細矣神亦倦矣病去正虛

之際當以和養中氣佐輕泄以滌餘熱守靡粥以俟胃醒隨分以

虛而早投補劑補之則反復立至也

双叶半川石斛半炒薏豆半炒半夏由半生甘竹半

豆卷半炒橘白半炒米仁半炒丹皮半

傷寒



初診

發熱惡寒頭項強痛無汗胸痞脈浮緊細症屬正傷寒南方所罕
見詢係連轉營墓辛勤屆在嚴寒曠野深受大寒大陽表症悉
宗仲全不汗出而煩燥者大青龍湯主之

生麻黃 芍 杏仁 生薑 芍 大棗 救 防風 芍

細桂枝 芍 生薑 芍 甘草 芍 羌活 芍

病甫兩日太陽症未罷而陽明少陽症已悉具可知南人稟賦柔
弱其傳經之迅速若此汗既未暢撥三陽並泄

生麻黃 芍 柴胡 芍 白芷 芍 連翹 芍 姜渣 芍

葛 根 芍 羌活 芍 杏仁 芍 山梔 芍 大棗 芍



汗暢熱解煩躁已除脈轉細小形疲體疲嗜臥而思納谷矣其發
也凶悍其傳也迅速其退矣亦易究屬虛弱易感易達不若此易
之凡氣剛勁稟賦厚而腠理實必至傳變六經乃已
是亦若宗
時大氣治之勢必淹滯幾候耳撥和營衛法

桂枝下炒秦芫
少雲衣
冬黑棗
戕防風
下炒橘白

●姜渣下酒炒桑梗

賁豚

胡少腹塊磊上攻腹脫其力猛而痛勢劇轉瞬之間腹中鳴響則
塊磊一漣而下即平疝名賁豚者因其性情踪跡行止類以江猪



耳然考其症有二肥肺之責脉属心火犯心之責脉属腎寒腎下
悸致作責脉者属水邪今係腎水寒邪所發顯属陽虛所致以
真武湯參責脉湯意

生麻子生附子 酒炒橘核 雲苓 干炒歸尾
椿根白皮煎湯代水 炒白芍 炒小茴香 以芎芎製半夏

呃

朱身熱未止驟來呃逆之勢震動卧床呃声傳聞客座今已六日
熱虽解矣呃猶極甚詢其由來係半夜口乾思飲健者嗜卧懶為
烹茗答曰茶已冷矣未幾又睡着欲飲者料為烹熱茶應者仍在

