

肩部

胸部

氣痛

哮喘

食積

手肩

肋胸

咳氣

脾哮喘

噎食

部部

部部

痛血

吼消

積吐

乳部

肺部

吐血

三消

反胃
嘔吐

驗方新編

卷二 卷三 卷四

陳時航

驗方新編卷二目錄

肩部

擔肩癰節

肩甲縫中積痛

手部

指頭惡毒

生各指頭又足趾頭生者亦是

脫骨疽

甲疽

又名嵌甲

灌甲初起

油灰指甲

指頭麻木痛癢

指頭畏冷

手足指頭羅紋生瘡

指頭生瘡

指甲下生瘡

十指節斷壞筋骨連虫出長數尺遍身緣毛

虎口並各手指縫生瘡或腫或爛痛不可忍

手了枝痛不可忍

手指觸着衣物痛癢破爛

手指斷落

手皮咬傷

手指及掌生黃白膿泡痛癢無時纏綿不已

手指手掌皮厚如鉄

掌中紅絲斷之血流不止

手口心中忽然腫起或痛或不痛或爛或不爛

鵝掌風

手腕生物如豆紅紫疼痛

手臂生瘡腫大如拳

熱毒攻手腫痛欲脫

四肢節脫但有皮連不能舉動

手足作痛

手足生瘡久不收口

小兒手軟

腋部肩下即是

腋下腫硬形如鴨蛋

腋下疙瘩音隔答

腋下癭瘤

腋下狐臭

乳部

乳頭破裂

乳上溼瘡

乳頭生瘡痛不可忍

乳癰

乳癰多至二三百頭者

乳癰腫及頭面

乳癰日久腫痛不愈

乳癰久不收口

乳岩

男子乳忽壅腫如婦人乳

婦人乳忽縮入

婦人產後兩乳長細垂下

婦人乳內吹氣有聲

婦人乳孔塞痛

婦人乳汁不通

乳汁自流不止

乳多發脹

無子食乳腫痛難消

胸部

胸膈閉結不通

胸滿腹脹

乳前生孔

胸旁生瘡

肬胸

肋部

肋下生瘡久則有聲如嬰兒啼哭

驗方新編卷之二

局部

擔肩癰癤

此惟擔天有之

五倍子燒存性為細末加黃丹

用水飛過

醋調敷之其效

又方照癰毒各方治之

肩甲縫中積痛

查中風筋骨各方治之

手部

蛇頭惡毒

生各指頭又足趾頭生者亦是

此症初起痛甚急用頭髮紫住指根取癩蝦蟆一個

目赤腹無八破字文者忌用

去賜雞

不可破胆

瘡頭套住用繩紮好並將蝦蟆心肝焙枯研

末沖酒服以免毒氣攻心約一對時破口出膿而愈套住之後瘡頭

猶如針刺痛更難忍甚至心中難過遍身發熱或嘔吐惡心不必驚

慌急服護心散

見瘟毒諸方

或服麻油一盞

菜子油亦可

心中自安蝦蟆能拔

極重惡毒切不可輕易揭去忍耐片時自能破口出膿而愈倘誤將

蝦蟆搗去別藥難醫為害不小去膿後如發昏暈亦不必驚慌用高

麗參三四錢以砂礮煮濃汁服之自然無事參不宜蒸一時蒸不出

濃其色只如淡黃煮則其色濃厚易見功效無力者用好黨參一二

兩煎服亦可愈後若再腫痛此痛氣未盡之故再用蝦蟆套上少頃

膿盡此不再發此瘡最為陰惡即方極屬神效不可輕視

又方 鳳仙花下半截連根和甜酒糟搗融敷有人指頭生瘡腫大

如李痛不可忍用此敷之半日腫消痛止較蝦蟆方尤為神速

又方 用磁片將瘡刺破查照疔瘡方內蜘蛛拔毒治之見癰毒諸疾疔瘡則

止痛消腫最為神效○又方 蜈蚣焙枯為末調搽神效

又方 雞蛋一個穿一小孔入信石一分套指頭上熱則再換立刻

止痛如神真仙方也較前各方功效更大

又方 雄黃 枯礬 各等分研末用麻油或醋敷亦極效驗

又方 白蘿蔔榨孔入雄黃三分蒸半熟套指上或用真烏梅仁嚼

爛敷之均極神效

又方 如色白者照脫骨疽陽和湯各方治之

脫骨疽

此病生手足各指

或云只生手足第曰指者是

或生指頭或生指節指縫初生或

白色痛極或如粟米起一黃泡其皮或如煮熟紅棗黑色不退久則

潰爛節節脫落延至手足背窩爛黑陷痛不可忍古方有截去指頭

一法斷不可用宜用頂大甘草研極細末用香麻油調敷要敷極

厚一日一換不可間斷忌食發物不出十日必愈真神方也再用

金銀花

元參各三兩

當歸二兩甘草一兩水煎服一連十劑永無後

患藥味不可減少減則不效並忌抓擦為要

又方大人用陽和湯小兒用小金湯重則用犀黃丸

均見陰色紅疽諸方

者照上蛇頭惡毒方治之此林屋山人百發百中之方也

又方 甘草嚼融厚敷乾則隨換日夜不斷數日必愈神效

甲疽

又名嵌甲

凡指甲邊生一赤肉突出時常舉發者甲疽也用狼毒一兩黃芪二兩醋浸一宿入猪油五兩微火上煎取二兩絞去渣退火氣敷之日換三次神效此林屋山人方也

又方 乳香 胆礬 研細時時敷之此病須剔去甲不藥亦愈若已成瘡久不愈者此方甚效

又方 皂礬

五錢火煨候冷研末

先以鹽湯洗瘡拭乾以礬末敷之舊紬裹定

一日一換神效或用枯礬亦可惟敷之微覺疼痛

又方 陳皮濃煎湯浸良久甲肉自相離開輕手剪去肉中爪甲外

用蛇退燒灰雄黃一錢為末乾摻或香油調敷

又方 輕粉 乳香 沒藥 各一錢 黃丹二錢 赤石脂五錢 寒水石

三錢

共為末濕則乾摻乾則油調最妙

又方 甘草嚼融厚敷乾則隨換數日全愈神效

又方 見頭部頭角太陽生瘡方

灌甲初起

用磁鋒於甲上刮去一層並用枯礬末敷之甚效如神

油灰指甲

每日取鳳仙花

又名指甲花

連根蒂葉搗敷指甲上用布包好一日一換

月餘乃愈此林屋山人方也

指頭麻木痛癢

取蜒蚰

查藥物備要便知

和銀硃共搗擦之若遲延不治必生蛇頭蛙節等

疔痛苦難受初起多擦幾遍決不生矣

指頭畏冷

天氣不寒指尖作冷名曰螺瘡用醋和鹽調勻將指頭泡入自愈

手足指頭羅紋生瘡

生橄欖核

有鹽者煮去鹽味用

切兩段醋磨雞毛蘸搽二十日後漸消

指節生瘡

名曰蛙節生黃豆嚼融敷須先漱口再嚼即愈

指甲下生瘡

名曰蛙甲治與上蛙節同

十指節斷壞惟有筋連虫出長數尺遍身綠毛

此名血餘症用 赤茯苓 白茯苓 胡黃連各錢半煎服

虎口並各手指縫生瘡或腫或爛痛不可忍若不早治即爛入

手大指二指間為虎口又名又指

生蒲公英搗融敷之數日即愈○又用生黃豆嚼融敷將口漱盡再敷甚效

又方 通草為末用雞蛋清調敷其腫即消

又方 白芨三錢研末蟾酥一錢共和雞蛋清搽神效

又方 白芷 滑石 黃丹 各等分研極細末敷之神效

手了枝痛不可忍

通草研末調生雞蛋白敷即愈

手指縫觸着紙角衣角痛癢破爛

雖癢極難受斷斷不可抓擦務必忍住並忌沾水數日自好倘一經
抓擦則纏綿難愈用 白芷 黃丹 滑石 各等分研極細末敷
之神效或用玉真散見跌打損傷門敷之亦極效也

手指斷落

方見卷十三跌打損傷門

手被咬傷

方見卷十三人畜蛇虫咬傷門

手指及掌生黃白膿泡痛癢無時纏綿不已內必有虫

猪肝切片和桃葉槌融敷之神效或用白油膏

見腿

貼之更妙

手指手掌皮厚如鉄

苦參酒煎服外用苦參末酒敷極效如神

掌中紅絲斷之血流不止

用燈火燒之自能漸收平愈

手足心中忽然腫起或痛或不痛或爛或不爛

此名穿掌又曰擎疽又曰托盤用生附子切片貼之或用生附子煎水泡之更妙數日後不痛者必然作痛作癢切不可用手抓仍用附子水泡之或附子切片加輕粉一分貼之必愈

又方 白鹽 花椒末等分醋和敷之未破者極效已破者勿用