

卷三 傷寒 百合 感冒 寒熱 霍亂 轉筋

瘧 癰 痢 淋 卷四 涇 喝 痰 瘡 痢

癰 狂 痢 痰 飲 咳 嗽 肺 脹 疝

蘭 臺 軌 範

卷三湯方目

桂枝湯

麻黃湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝

加葛根湯

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

桂

枝加芍藥湯

大青龍湯

桂枝加桂湯

小

柴胡湯

大柴胡湯

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

桃核承氣湯

抵當湯

抵當丸

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

白虎湯

麻黃附子細辛湯

四逆散

四逆湯

四逆加人參湯

通脈四逆湯

通

脉四逆加猪胆汁湯

當歸四逆湯

理中丸及

湯

附子瀉心湯

梔子豉湯

真武湯

大黃黃連瀉心湯

白通湯

白通加猪胆汁方

猪膚湯

甘草湯

甘桔湯

瓜蒂散

麻黃升麻湯

旋復代赭湯

苦酒湯

枳

實梔子豉湯

竹葉石膏湯

燒裨散

猪胆

導法

蜜煎導法

治男子新病起房內復者方

治交接勞復陰卵腫縮入腹絞痛便欲死方

竹皮湯

療食勞方

治結胸灸法

鵲石散

驚甲散

升麻驚甲湯

升麻驚甲去雄黃

蜀椒方

梔子仁湯

還陽湯

萎蕤湯

白虎加蒼朮湯

黑膏

以上傷寒

百合知母湯

滑石

代赭湯

百合雞子湯

百合地黄湯

百合

洗方

栝蘘牡蠣散

百合滑石散

以上百合

九味羌

活湯

敗毒散

參蘘飲

以上感冒

四時加減柴胡方

天行熱病方

苦參湯

凝雪湯

大黃

湯

薰身法

以上寒熱

霍亂轉筋入腹

又方

又

方

廣濟高良薑湯

霍亂轉筋入腹方

茱

萸湯

炙法

以上霍亂

栝萸桂枝湯

麻黃加獨活防

風湯

以上瘧

栝萸瞿麥圓

滑石白魚散

茯苓戎

鹽湯

猪苓湯

治諸種淋方

石葦散

胞轉方

療小便難方

石葦散

蘓蜜煎

治石淋方

治熱淋方

四汁飲

牛膝膏

八正散

家韭子丸

治小便失禁方

夜多小便方

猪肚丸

縮泉丸

治尿床

以上

癰閉利淋

蘭臺軌範卷三

吳江徐靈胎洄溪著

孫男 埏濱陶校

傷寒

素問

素熱論篇帝曰今夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日之間其愈皆以十日以上者何也岐伯對曰巨陽者諸陽之屬也其脉連於風府故爲諸陽主氣也人之傷於寒也則爲病熱熱雖盛不死其兩感於寒而病者必不免於死帝曰願聞其故岐伯曰傷寒一日巨陽受

之故頭項痛腰脊強二日陽明受之陽明主肉其脉俠鼻
絡於目故身熱目疼而鼻乾不得臥也三日少陽受之少
陽主胆其脉循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾三陽經絡皆
受其病而未入於臟者故可汗而已四日太陰受之太陰
脉布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受之少陰脉
貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受之厥
陰脉循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮三陰三陽五臟六
腑皆受病榮衛不行五臟不通則死矣

陰脉皆連五臟故
曰入臟非風寒直

入臟
中也

其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽

明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病
衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不消舌乾
已而噦十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日
已矣帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其臟脉病日衰已
矣其未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已水
熱穴論帝曰人傷於寒而傳爲熱何也岐伯曰夫寒甚則
生熱也

兩感 素熱論帝曰其病兩感於寒者其脉應與其病形
何如岐伯曰兩感於寒者病一日則巨陽與少陰俱病則

頭痛口乾而煩滿二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫言三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人六日死帝曰五臟已傷六腑不通榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脉之長也其血氣盛故不知人三日其氣盡故死

兩感則表裏同病

溫病暑病

素熱論凡病傷寒而成溫者先夏至日者爲

病溫後夏至日者爲病暑暑當與汗皆出勿止

陰陽交

素評熱病論帝問曰有病溫者汗出輒復熱而

脉躁疾不爲汗衰狂言不能食病爲何岐伯曰病名陰陽

交○交○者○死○也○帝○曰○願○聞○其○說○岐○伯○曰○人○所○以○汗○出○者○皆○生○
於○穀○穀○生○於○精○今○邪○氣○交○爭○於○骨○肉○而○得○汗○者○是○邪○却○而○
精○勝○也○精○勝○則○當○能○食○而○不○復○熱○復○熱○者○邪○氣○也○汗○出○者○
精○氣○也○今○汗○出○而○輒○復○熱○者○是○邪○勝○也○不○能○食○者○精○無○俾○
也○病○而○留○者○其○壽○可○立○而○傾○也○且○夫○熱○論○曰○汗○出○而○脉○尚○
躁○盛○者○死○今○脉○不○與○汗○相○應○此○不○勝○其○病○也○其○死○明○矣○狂○
言○者○是○失○志○失○志○者○死○今○見○三○死○不○見○一○生○雖○愈○必○死○也○
遺○證○ 素○熱○論○帝○曰○熱○病○已○愈○時○有○所○遺○者○何○也○岐○伯○曰○
諸○遺○者○熱○盛○而○強○食○之○故○有○所○遺○也○若○此○者○皆○病○已○衰○而○

熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺也帝曰善
治遺奈何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已矣帝曰
病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此
其禁也

難經

傷寒有幾其脉有變不然傷寒有五有中風有傷寒有濕
溫有熱病有溫病其所苦各不同中風之脉陽浮而滑陰
濡而弱濕溫之脉陽濡而弱陰小而急傷寒之脉陰陽俱
盛而緊瀋熱病之脉陰陽俱浮浮之而滑沉之散瀋溫病

之脉行在諸經不知何經之動也各隨其經所在而取之
傷寒有汗出而愈下之而死者有汗出而死下之而愈者
何也然陽虛陰盛汗出而愈下之即死陽盛陰虛汗出而
死下之而愈陽虛陰盛者風傷衛而汗自洩寒氣在內而
未出也陽盛陰虛者身熱汗閉燥火內結津
液乾枯陰氣欲竭也此以
有邪處為虛無邪處為盛

傷寒論六經脉症

太陽病脉浮頭項強痛而惡寒 尺寸俱浮者太陽受病
也其脉上連風府故頭項痛腰脊強 發熱汗出惡風脉
緩者名曰中風 惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷

寒發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發於

陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮而緊惡寒未離

太陽陽明病若能食名中風不能食名中寒尺寸俱長者

陽明受病也其脉俠鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不能臥

陽明外証身熱汗自出不惡寒反惡熱也邪氣已離太陽故不惡寒

陽明脉大以上皆陽明之經病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽

明此三條皆傳臍之症太陽陽明者脾約是也少陽陽明者發汗

利小便已胃中燥煩實大便難是也陽明之爲病胃家

實也

此正陽

陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡

寒二日自止此為陽明病也

少陽之為病口苦舌乾目眩也 尺寸俱弦者少陽受病

也其脉循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾 少陽中風兩耳

無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚

傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽

頭痛發熱與太陽同而脉之弦細獨異

三

陽合病脉浮大上關上但欲眠睡目合則汗已內極傷寒六

七日無大熱

外熱輕則內熱重

其人躁煩者此為陽去入陰也

若

輕而不煩躁則病欲退矣

傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能

食而不嘔此爲三陰不受邪也

太陰之爲病腹滿而嘔食不下自利益甚時腹自痛 尺

寸俱沉細者太陰受病也其脉布胃中絡於噎故腹滿而

噎乾 傷寒脉浮而緩手足自溫者繫在太陰 同一太陰病而有沉

細浮緩之殊蓋沉細乃太陰病脉浮緩乃太陰本脉也 自利不渴者屬太陰以臟有

寒故也當溫之宜服四逆輩 此少陰自利而渴熱入中焦也

少陰之爲病脉微細但欲寐也 衛氣行於陽則寐行於陰則寐 少陰病欲

吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也 尺

寸俱沉者少陰受病也以其脉貫腎絡於肺繫舌本故口

燥舌乾而渴。

厥陰之爲病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食食則吐衄下之利不止。尺寸俱微緩者厥陰受病也以其脉循陰器絡於肝故煩滿而囊縮。厥陰中風脉微浮爲欲愈不浮爲未愈。

傷寒傳足不傳手經脉

此本陶節庵最爲明晰

足太陽脉起於目內眥從頸下後項連風府行身之後終於足其外症頭疼項強腰脊痛骨節痛惡心發熱惡寒標病宜發汗但太多則亡陽筋惕肉瞤小便不利者當利。

自利者不可利。利之引熱入膀胱。其人如狂。不可下下之。爲結胸。

足陽明脉起於鼻頰。絡於目。循面下人迎。入缺盆。下膈。屬胃。行身之前。終於足之厲兌。穴故其症目痛鼻乾不得眠。頭頰痛。身熱微惡寒。無汗者。屬標病。宜解肌。身熱發渴。汗出。屬本病。宜清熱解肌。若惡熱自汗發渴。去衣被發斑發黃。發狂大便秘腹滿。此正陽明胃腑病也。宜下之。

足少陽脉起於目銳眥。上抵頭循角。絡耳中。循胸脇行身之側。終於足。故頭角痛目眩耳聾脇疼心下痞寒熱往來。