

胎產新書



女科祕旨卷七目

產後類中風

產後汗

產後虛汗不止

產後盜汗

產後口渴或兼小便不利

產後遺尿

產後類瘧

產後泄瀉

產後完穀不化

產後痢

產後積滯

滋榮活絡湯

天麻丸

麻黃根湯

止汗散

又方

生津止渴益水散

薛氏補脬飲

加減生化湯

芎歸活風湯

丹溪回生方

健脾利水生化湯

加減生化湯

加味生化湯

香連丸

參芪生化湯

補血消滯方



女科祕旨卷七

輪應禪師纂

仁和吳煜茶垞校訂

產後類中風

產後血氣暴虛百骸少血濡養率爾口噤牙緊手足筋脈攣搐症類中風類瘕癰脈雖虛大虛火泛上有痰皆當以末治之母執偏門而用治風消痰之方以重虛產婦治法先當服生化湯以生旺新血如見危症三帖後加參益氣以救血脫也如有痰有火少佐橘紅炒黃芩之劑竹瀝薑汁亦可切忌黃連黃柏並用

產後血少口噤項強筋搐類中風

滋榮活絡湯

川芎

一錢五分

當歸

三錢

熟地

人參

各二錢

甘草

陳皮

羌活

各四分

黃芪

茯神

天麻

麥冬

各一錢

荆芥

防風

各四分

黃連

薑汁炒八分

有痰

加半夏 粬竹 瀝薑汁 渴加麥冬 葛根

產後中風恍惚語澁四肢不利

天麻丸

天麻

防風

各五錢

扶神

棗仁

人參

遠志

山藥

柏子仁

門冬

各一兩

川芎

羌活

各七錢

細辛

四錢

南星

半夏

石

菖蒲

各八錢

當歸

二兩

共為末蜜丸硃砂為衣清湯

每服六七十丸

產後汗

凡分娩時汗出由勞傷脾驚傷心恐傷肝也內經云搖體勞苦汗出於脾驚而奪精汗出於心有所恐懼汗出於肝產婦多兼此三者而汗出不須即加歛汗之劑能甯神而汗自止若血塊作痛茺朮未可遽加宜服生化

湯二三帖以消痛隨服加參生化湯以止虛汗若分娩後倦甚澌澌然汗出形色又脫此亡陽脫汗也又當從權速灌加參生化湯倍用人參以救危急毋拘塊痛夫汗乃心之液榮於內爲血發於外爲汗值產婦亡血之後又多汗由勞驚恐懼所傷神虛而不能鎮守其液也治當健脾而斂水液之精歸脾益榮衛以噓血歸源灌漑四肢不使其妄行而爲外汗在雜症雖有自汗盜汗之分其當歸六黃湯不可以治產後之自汗並宜服加參生化湯又加味補中益氣湯若服參芪而汗不止及

頭出汗而不至腰足乃危惡之症必難療

產後虛汗不止

麻黃根湯

人參

當歸

各二錢

黃芪

一錢五分

白朮

麻黃根

牡蠣

各一錢

桂枝

炙甘草

各五分

浮小麥

一撮

如

虛脫汗多手足冷加熟附子

一片

薑棗

四分

渴加

麥冬五味子

各六分

肥白人產後多汗加竹瀝薑汁

以清痰火若惡風寒加防風

五分

血塊不痛加熟

地三錢

暮服八味丸

六味加五味子炙黃芪

凡產後汗不止由產亡陰血而陽氣偏盛故也內經云陽加於陰則發汗因而遇風變爲痙瘓者有之矣其治尤難是以產後多汗之家更宜謹避風寒也

產後盜汗

產後睡夢中汗多醒來卽止猶盜瞰人睡而出盜謂之盜汗此非自汗之比在襍症論云自汗陽虧盜汗陰虧然當歸六黃湯又非產後盜汗方也治當兼血分藥品調理之乃稱善耳

止汗散

人參 二錢

當歸 三錢

熟地 一錢五分

麻黃根

黃連

酒炒各五分

浮小麥 一大撮

又方

牡礪

煨研五分

小麥麵

炒黃研

產後口渴或兼小便不利

凡產後口燥咽乾而渴或兼小便不利由產時失血或汗多所致是無水也夫水穀入胃脾肺散精清氣為津液其氣通心受火色變為血下行膀胱為小便值產亡血而又汗多且勞倦傷脾不能為胃行其津液生化之

氣不運滲泄之令不行是以上無津液而有噎乾燥渴之症下氣不升而有胃腎閉關之候治法必當助脾益肺升舉氣血則氣化流行陽升陰降水入經而爲血爲液穀入胃而氣長脈行自然津液充而便利調矣若認咽乾口燥爲火而用芩連梔柏以降之認小便閉澀爲水滯而用五苓散以通之皆非也必因其勞損而溫之益之因其渴燥而濡之行之量度病情而施治無失也

生津止渴益水散

人參

麥冬

生地

當歸

各三錢

五味

十粒

曾有接生者
以手入內探
扶小兒損傷
尿胞以致終
身滲漏可不
慎哉

黃芪

一錢五分

茯苓

八分

甘草

升麻

各四分

葛根

各一錢

汗多加浮麥麻黃根棗仁

各一錢

如渴甚加生脈散

代茶不可疑而不用

產後遺尿

凡產後遺尿由氣血大虛不能約束宜用八珍湯加升
麻柴胡甚者加熟附子一片

又有生理不順誤損尿胞膀胱者用參芪爲君歸芎爲
臣桃仁茯苓陳皮爲佐以猪羊尿胞煎湯煎藥須百服
漸安

薛氏補脬飲

黃絲絹

一尺碎剪

白牡丹根皮

爲末

白芨末

各一錢

水煎

至絹爛如飴服之靜卧不可作聲如作聲則不效

產後類症

產後汗出多而變痙症口噤不開背強而直身反氣息如絕宜速服下方

加減生化湯

川芎

麻黃根

各一錢

當歸

四錢

桂枝

防風

甘草

羌活

各五分

人參

二錢

附子

一片

羚羊角

天麻

各八分

產後中風無汗類瘕

芎歸活風湯

川芎

當歸

各三錢

防風

羌活

各五分

棗仁

錢一

產後泄瀉

產後泄瀉非雜症有食泄洞泄濡泄溼泄各如註下之
論大率屬氣虛食積與溼也氣虛宜補食積宜消溼則
宜燥然惡露未淨遽難驟補驟消驟燥當先服生化湯
二三帖以化舊生新內加茯苓以利水道俟血化生然

後補氣消食燥溼以分水道始無澁滯虛虛之失若產
經旬日外方論襍症猶量人虛實而施治也如痛下清
水腹鳴米飲不化者以寒泄治如糞黃色赤色肛門
痛以熱泄治有因飲食過多傷脾成瀉噫氣臭如敗
者以食積泄治又有脾氣久虛少食食下腸鳴腹急
下所食之物方寬快者以虛寒泄治治法寒則溫之熱
則清之脾傷食積分利健脾兼消補虛方謂善於調治
而可無失也

產後虛泄眼昏不識人弱甚形脫必用下方

丹溪回生方 卽附子理中湯

白朮

茯苓

各二錢

人參

三錢

附子

一錢

產後血塊未消患瀉

健脾利水生化湯

川芎

茯苓

各二錢

當歸

四錢

薑炭

炙甘草

各五分

桃仁

十粒

蓮子

八粒

產後血塊已消患瀉

加減生化湯

川芎

一錢

當歸

白朮

各二錢

薑炭

炙甘草