

癲狂

三錫曰癲者作事顛倒言語錯亂一云失心風
多因抑鬱不遂侘傺無聊而成有狂之意不如
狂之甚狂爲暴病癲爲久疾狂則登高而歌棄
衣而走踰垣上屋詈罵不避親疎俗謂之風子
是也癲者忽然僵仆直視厥不知人或作牛羊
聲如小兒驚風之狀俗謂之羊兒風是也三者
輕重之分雖因痰火鬱挹未必不由心神耗散
氣虛不能勝敵痰火猖狂犯土之所致正內經

所謂主不明則十二官危使道閉塞而不通形
乃大傷是也

內經曰巨陽之厥則首腫頭重足不能行發爲
暈仆是蓋陽氣逆亂故令人卒然暴仆而不知
人氣復則甦此則癰之類也天曰陽明之厥則
癰疾欲走呼腹滿不得臥面赤而熱妄見妄語
又曰甚則登高而歌棄衣而走踰垣上屋罵詈
不避親疎蓋得之于陽氣太甚胃與大腸實結
火鬱于中而爲之耳此則癰狂之候也難經曰

重陽者狂、重陰者癲。素問曰：喜爲癲、多怒爲狂。然則喜屬心而怒屬肝，乃二相二火亢極而然。難經陰陽之說未見善解，自大抵狂爲痰火實盛、癲爲心血不足，多爲求室高遠，所願不得志者有之。癲病獨主乎痰，因火動之所作也。治法癲宜乎吐，狂宜乎下。癲則女神養血、兼清痰火。雖然，此病若神脫目眩、如痴者，縱倉扁復生，亦未如之何已矣。

難經曰：狂之始發，少臥而不寐，自高賢也。自辨

智也。自貴倨也。妄咲好歡樂。行不休是也。

素問曰。有病怒狂者。其病安生。岐伯曰。生于陽也。陽氣者。暴折而難決。故善怒。病名曰陽厥。治之奪其食。卽已。夫食入于陰。長氣于陽。故奪其食。卽已。

陽明病。甚則棄衣而走。登高而歌。或至不食。數踰垣上屋。所上之處。皆非其素所能也。病者反能者。何也。岐伯曰。四肢者。諸陽之末也。陽盛則四肢實。實則能登高也。熱盛于身。故棄衣也。陽

盛則妄言詈罵不避親疎而不欲食故妄走也

五癰

袖珍論五癰屬五臟馬癰作馬嘶者應乎心牛
癰作牛吼者應乎脾雞癰作雞鳴者應乎肝猪
癰作猪叫者應乎腎羊癰作羊聲者應乎肺然
此論似鑿大抵涎潮則吐沫眩暈家風熱盛則搐
搦皆痰生熱熱生風也審虛實以治之

癰發于平旦足少陽晨朝發者足厥陰日中發
者足太陽黃昏發者足太陰夜半發者足少陰

藥中各加引經藥不必分陰陽均屬痰熱但有
虛實之分爾

胎癰

胎元之始七節之傍命門穴在其後臍在其前
胎在其中是故子臍係以胞帶隨母呼吸母呼
亦呼母吸亦吸通母生氣食母穀氣以化育肉
外之形者皆是腎動氣所致也當母受驚之邪
子在母腹隨呼吸得之與腎動氣混在其中
雖生出腹後一二歲始發或九歲發蓋小兒

生之陽如日方升邪不易入故癰未發必待
後感之邪入深與所感母腹之邪相搏而後作
夫如是大人與小兒病此縱得稟質強壯終因
邪害其生命之原難得中壽若發頻而志愚者
僅至四十陰氣衰半而已小兒質弱目瞠者不
過歲月還亦難出成人之年蓋腎間生命之氣
虛而不復故不得壽也

癰與卒中瘧病相類但癰病什時口中作聲將
醒時吐涎沫醒後又復發連日發者有一日

三五發者中風中寒中暑之類則仆時無聲醒時無涎沫醒不復再發瘡病雖亦時發時止然身強直天張如弓不如癇之身軟及猪犬牛羊之鳴也

癇病發則昏不知人眩仆倒地不省高下甚而瘳癡抽搐日上視或口眼喎邪或口作六畜之聲巢氏以大癲作犬吠應肝雞癲作鷄叫驚跳反折應肺羊癲目瞪吐舌作羊叫應心牛癲直視腹滿作牛叫慮脾猪癲吐沫作猪叫應腎而

三因方復有馬癰作馬嘶騰踴多因挾熱與驚
心動膽攝鬱涎入于心之所致卅溪獨斷爲痰
火大抵癰癩之發由腎中陰火上逆而肝從之
故作搐搦搐搦則徧身之脂液促迫而上逆氣
吐出于口也然腎間動氣乃生氣之原腎傷則
志不足故神躁擾火逆上攻動其痰而厥也或
經脉引入外邪內傷深入于根傷其生氣之原
邪正混亂天樞不發衛氣固留于陰而不行不
行則陰氣畜滿鬱極乃發發則命門之相火自

下逆上填塞其竅、惟迫出、其如羊鳴者、一二聲而已、徧身之脂液、脾之涎沫、皆迫而上、胸臆流出于口、五臟六腑十二經脉、皆不勝其衝逆、故卒倒而不知也、食頃火氣退散、乃醒、若生氣未復、則餘邪漸熾、而復作也、然所謂生氣之原者、乃有生之初、先生此而外、通于臍、而係胞、隨母呼吸、若母受驚、氣混于其中、久之、乃是也、命門即臍下腎間一點真陽是也、復被外邪、則發作也、如此、則生命之原、爲邪所害、自小目瞪質弱

必不長壽

痙病

身如角弓、強直而不柔、是也、亦作痙、陽痙、卽剛痙、陰痙、卽柔痙、無汗爲剛、有汗爲柔、痙

仲景曰、病身熱足寒、頸項_反惡寒、時頭熱面赤、目脉赤、頭面搖卒、口禁_反者、痙也。

千金方曰、太陽中風、重感寒濕、則成痙、身熱足寒者、寒濕在下也、時頭熱面赤者、風傷于上也、風主動、故頭搖、寒濕傷筋、則病反張、

太陽病發熱無汗惡寒者名曰剛瘧。○太陽病發熱汗出不惡寒者名曰柔瘧。以上皆謂傷寒重感濕氣有餘暴病若久病產後瘡疥老弱人有此悉屬氣血兩虛。仲景又曰太陽病發熱多汗多致瘧。古方用附子益陽藥竊以爲既汗多大損氣血筋失所養而強直不柔。法當大補氣血少佐附子行經可也。

俞子木曰人之筋皆各隨經絡結束于身。血氣內虛外爲風寒濕熱所侵則瘧原其所因多于

亡血筋無所營故邪得以襲之所以傷寒汗下
過多與夫病瘡人及產後多變此疸者理可見
矣

許溪曰大率因血氣大虛有火有痰須人參竹
之類

黃疸

三錫曰黃疸屬濕熱是固然矣其原必起于脾
虛不能運化轉輸不及滯氣拂鬱而然乃脾是
爲本而濕熱是標也治必緩急

內經曰中央黃色入通于脾又曰諸濕腫滿皆屬脾土夫黃疸之病肌肉必虛腫而色黃蓋濕熱鬱積于脾胃之中久而不散故其土色形于面與肌膚也蓋脾主肌肉肺主皮毛毋能令子病毋病子亦病矣是故有諸中者必形諸外爾其瘡有五一日黃汗二曰黃疸三曰穀疸四曰酒疸五曰女勞疸黃汗者病身體俱腫汗出染衣黃如柏汁此由脾胃熱汗出爲風所閉熱結其汗黃也黃疸之病

然已卽機遍身俱黃

時身體帶青帶赤增寒壯熱此飲酒過度臟腑
熱極水穀相併積于脾胃復爲風熱所搏結滯
不散熱氣薰蒸所致發于陰部其人必嘔發于
陽部其人必振寒而後熱穀疸之症食畢卽頭
眩心中拂鬱不安而遍身發黃此由脾胃有熱
大饑過食傷胃之所致也酒疸之症身日發黃
心中懊懣足脛滿小便黃面發赤斑此由饑中
飲酒大醉當風入水所致女勞疸者其症身目
皆黃發熱惡寒小腹滿急小便不利此由過于

勞傷又于極熱之中、房事之後、當風入水所致、如多渴而腹脹者、難治、丹溪曰、不必分五、同是濕熱、如盒麴相似、正所謂知其要者、一言而終是也、外有傷寒熱極、陽明內實、當下不下、當汗不汗、當分利而不分利、故使濕熱拂鬱內甚、皆能令人發黃、大槩疸病渴者難治、不渴者易治、疸毒入腹、喘滿者危、便利而渴者死、脉微小、小便利而不瀉者生、寸口無脉、鼻氣冷者不治、又有口淡、怔忡、耳鳴、腳弱、或微寒、微熱、小便赤白、

濁又當作癰疽治之不可妄投涼藥愈傷脾胃
仲景曰酒疸下之久久變爲黑疸目青面黑心
中如噉蒜齏狀大便正黑皮膚爪之不仁其脉
微弱雖黑微黃黃家日晡時發熱而反惡寒此
爲女勞得之膀胱急少腹滿一身盡黃額上黑
足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便黑或時
溼此女勞之病非水也腹滿者難治

痺

三錫曰四肢肌肉不爲我用似徧枯而多痛着