

瀉火
消導
除疾

醫方集解
伍

勞集解卷下

休盤注 昂初菴雙有

男注 端翼兩

弟注 桓殿武訂

姪注 惟篚字錫 全校

瀉火之劑

火者氣和經脈

之不得其平者也五藏六府各得其平則榮衛冲

矣或丹侯口氣有

餘便是火也有本經自病者如忿怒生肝火勞倦

生脾火之類是也

也有五行相剋者如心火太盛必剋肺金肺火太盛

必地脾土之類是也

也有藏府相移者如肝移熱于脾則口苦心移熱

于小腸則淋秘之

類是也又有他經相移者有數經合病者相火起

守肝腎虛火由于

勞損實火生于亢害燥火本乎血虛濕火因于濕

熱鬱火出于遏抑

又有無名之火無經絡可尋無脈證可辨致有暴

病暴死者諸病之

中大病為多不可以不加察也○有以瀉為瀉者

三焦實火

黃連解毒湯

相傳此方

為太倉公火劑而崔

治一切火熱表裏俱盛

躁煩心口燥咽乾太

熱乾嘔錯語不眠吐血

衄血熱甚發狂也邪入于

陽則狂心爲熱所擾則煩燥則煩之甚也口燥咽乾火盛津枯也苔嘔
熱毒上逆也錯語熱者其神也不眠眩未得復也傷寒吐衄血者當汗
不汗蘊熱過血上行也發斑熱毒入胃也○崔尚書曰胃有燥糞令人
錯語邪熱盛亦令人錯語若秘而錯語者宜承氣湯通而錯語者宜黃

連解

母湯

黃連 黃芩 黃柏 梔子 等分

此手足陽明手少陽藥也三焦積熱邪火妄行故用黃芩瀉肺火土

焦黃連瀉脾火于中焦也上海藏曰黃連瀉火實瀉脾也子能令母實實則瀉其子黃柏瀉腎火于下

焦梔子通瀉三焦之火從膀胱出蓋陽盛則陰衰火盛則水衰故用吳

苦大寒之藥抑陽而扶陰瀉其亢甚之火而救其欲絕之水也然非實

熱不可輕投劉河間口傷寒表熱極甚身痛頭疼不可忍或眩或嘔或

惡不能退其熱勢之甚或大下後再三下後熱勢尚甚本氣損虛而脉

滿大便秘澀煩併少而急痛者必欲作痢也並宜黃連解毒湯

本方去梔子名栢皮治三焦實熱用粥丸名三補丸治三焦有火盛

燥喉乾二便閉結及痰夜壯火宜降今以黃芩瀉上黃連瀉中黃

栢瀉下則壯火降而少火升氣皆受益矣本方去麥連加甘草名梔子栢皮湯仲

治傷寒發黃身熱黃胃有痰熱宜下之發熱為熱未作實證

利小便用梔子清肌發難于得熱熱則勢外出而不內入矣故不必發汗

膀胱者與陽明痰熱仕胃者不同故仲景亦有不可下當于畏濕中求

之說若痰熱在裏亦有用麻黃連翅赤本方去黃栢梔子加酒浸大

小豆湯發汗利水之劑者方見傷寒論

黃名三黃瀉心湯金惡心下痞熱心氣不足吐血衄鼻黃芩用酒蒸晒

九名蜜丸名三黃丸至三焦積熱頭項腫痛目赤口瘡心膈煩躁大便秘

秘結小便赤澀及消瀉消渴虛瘦由于火災水乾或問心氣不足

陰不足亢陽無輔致喉血妄行故用大黃瀉其亢害之火又心本不足

肺肝各受火邪而病作故用黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心

之母血之舍也肺肝火退則血歸經而自安矣寇宗奭曰以苦泄其熱

就以苦補其心益一舉而兩得之張鶴臯曰治病必求其本陽毒上攻

出血則熱為本血為標能去其熱則血不治而自歸經矣李士材曰古
人用大黃治虛勞吐血意甚深微蓋濁陰不降則清陽不化瘀血不去
則新血不生也昂按此乃傷寒外感移熱而吐衄故用三黃寒瀉之劑
若虛寒內傷吐衄而俱服此則殺人矣楊仁齋曰血遇熱則宜流故止
血多用涼藥然亦有氣虛挾寒營氣虛散血亦錯行所謂陽虛陰必越
是已法當溫中使血自歸經宜理中湯加木香七氣湯加川芎或甘草
乾薑湯

水方加石膏淡豉麻黃各三黃芩湯別見表裏門 本方水丸名三
黃金花丸治中外諸熱驚汗咬牙夢驚驚悸吐衄淋秘勞嗽骨蒸本方

加大黃名梔子金花丸去梔子加大黃名大金花丸治畧同

傷寒 附子湯 治傷寒心下痞而復惡寒汗出者 傷寒心下滿鞭而痛

而不痛者為痞為虛經曰心下痞按之濡關脉浮者大黃黃連瀉心湯
心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯大抵諸痞皆熱故攻之多寒劑
此劑附子恐三黃重損其陽非補虛也或下後復汗或下後陽虛故惡
寒汗出此諸瀉心湯皆治傷寒痞滿滿在心膈不在胃也若雜病痞滿
有熱熱虛實之不同保命集云脾不能行氣于四藏結而不散則為
痞因寒之痞從外之內故宜苦泄雜病之痞從內之外故宜辛散

大黃黃連黃芩附子 一散炮去皮 破開者取汁

此是太陽手少陰藥也。以鶴草曰心下痞，故用三黃以瀉痞。惡寒汗出

故用附子以固陽。非三黃不能去痞熱。無附子恐三黃益損其陽。寒熱

並用斯為有制之兵矣。喻嘉言曰：此邪熱既甚，真陽復虛之症。故于三黃湯內加附子，汗其成，領痞之功。金匱有大黃

附子湯亦同此意。大黃細辛各二兩，附子一枚，炮治脇下偏痛，發熱脉弦緊，此寒也。以溫藥下之，陽中有陰，當以溫藥下其寒。後人李識其指

○有用寒藥而治熱痞者，大黃黃連之類也。有陰盛陽虛而痞，用辛熱多而寒藥少者，

牛夏生薑甘草瀉心之類也。經又曰：傷寒大下後復發汗，心下痞惡寒者，表未解也。當先解表，乃可攻痞。解表桂枝湯，攻裏大黃黃連瀉心湯。

經又曰：本以下之，故心下痞與瀉心湯痞不解，口渴而煩躁，小便不利者，五苓散主之。此有停飲故也。○李東垣曰：酒積雜痞下之人，過亦作

痞，傷益下多亡陰。陰者脾胃水穀之陰也。胸中之氣因虛下陷于心之分野，故致心下痞。宜升胃氣，以血藥兼之，若全用氣藥導之，則痞益甚。

甚而復下之，氣愈下降，必變為中滿膨脹，非其治也。按脾無積血，心下不痞，故須兼血藥。

本方去附子名三黃瀉心湯。見前再去黃芩名大黃黃連瀉心湯。仲治傷

寒心下痞，按之濡。音關上脈浮。沉為實，濡浮為虛。熱經口按之自濡，但氣痞耳。周揚俊曰：以非痰飲結聚，故無

傷寒
虛痞

半夏瀉心湯

治傷寒之早胸滿而不痛者為痞身寒而嘔飲食不

取半夏生薑也活人云結胸與痞閉脈須皆沉若閉脈浮而結者三黃以瀉明李時珍曰仲景治心氣不足吐衄而者用瀉心湯實瀉心包肝脾胃四經血中之伏火也又治心下痞滿按之軟者用瀉心湯亦瀉脾胃之濕熱非瀉心也病發於陰而反下之則痞滿乃寒傷營而邪結上焦胃之土脫在心故口瀉心經曰太陰所至為痞滿又曰濁氣在上則生脹脹是已病發於陽而反下之則結胸乃邪熱陷入血分亦在上脫故大陷胸湯凡皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而散其熱也若結胸在氣分只用小陷胸湯痞滿在氣分只用半夏瀉心湯按發陽發陰諸解不同終成疑案李氏則以寒傷為陰病熱陷為陽病然仲景所見皆寒藥未嘗有所分也周揚俊則謂總屬下早致然似為近理

非柴胡症

經曰傷寒五六日嘔血發熱柴胡症具而以他藥下之柴

振却發熱汗出而解若心下滿而硬痛者此為結胸也大陷胸湯主之若滿而不痛者此為痞柴胡不中與也宜半夏瀉心湯凡用瀉心者皆屬誤下之症非傳經熱邪也

黃連一黃芩廿二
乾薑三
大棗十二

此手少陰是太陰藥也成氏曰否而不泰為痞是人心瀉心者必以

苦故以黃連為君黃芩為臣以降陽而升陰也辛走氣散痞者必以辛

故以半夏乾薑為佐以分陰而行陽也欲通上下交陽陽者必和其中

故以人參甘草大棗為使以補脾而和中已下之後脾氣必虛則痞熱消而大汗

以解矣舊註云此方藥味蓋本理中人參黃芩湯方王海藏曰外症全

湯脈無力者半夏瀉心湯論嘉言曰諸瀉心湯原以滌飲此症因嘔該

推半夏為君程郊倩曰痞雖虛邪然表氣入裏拂鬱于心陽之分寒亦

成熱矣寒已成熱則不能外出而熱非實積又不能下行唯用苦寒從

其部而瀉之仍慮下焦之陰邪土入兼辛熱以溫之陰陽兩解不攻痞

而痞自散所以寒熱五用若陰痞不開陽鬱即鬱而未成熱祇是上下

陰陽部分拒格而成瀉心之法堅不可用也又曰人皆曰汗多亡陽不

知下多亦亡陽以亡陰中之陽故曰亡陰耳下焦之陽驟虛氣必上逆

則上焦之陽反因下而成實以火氣不下行故也治多瀉上補下心君

得告寒而安則反能從陽引之入陰故芩連厄子瀉亦成補

若汗下相因有虛無實溫補猶恐不足前法一無所用矣

本方除人參再加甘草兩合名甘草瀉心湯傳治傷寒中風謬反下

之不利穀不化腹中雷鳴心下痞更而滿乾嘔心煩醫復下之其痞益

甚此非結熱但以胃虛氣上逆故使便也為下後裏虛胃弱內損陰氣故加甘草以和中益胃

復真陰退虛熱大要痞滿下利者為虛便閉者為實按甘草甘今人滿

故中滿症忌之而別錄甄權並云甘草能除滿以脾健運則滿除也觀

仲景用以消痞豈非取其散滿哉又按此乃傷寒之下利腸鳴也雜症

腸鳴亦多屬脾胃虛經云脾胃虛則腸鳴腹滿又云中氣不足腸為之

苦鳴宜參朮補劑加甘草等連枳實乾薑等丹溪又曰腹中水鳴乃火

發動其水也宜二陳湯加苓連卮子李樾曰自利舊分陰症陽症又分

協熱協寒而治法相同陽症下利亦必裏虛而表熱乘之雖太陽初症

下利亦然與表邪傳裏協熱下利無異至于陰邪協寒其症尤顯所以

去陽症下利誤溫則發黃出痼本方加生薑兩名生薑瀉心湯景仲治

而死此等支離處尤當詳辨

汗解後胃中不和心中痞更乾噦同食臭不化脇下有水氣腹中

雷鳴利客氣上逆微飲搏脇故痞腹中氣不和故乾噦胃虛火盛邪

雷鳴下利謂之協熱利為汗後胃虛外損陽氣故加生薑以散和滌飲

益胃復陽劉河間曰瀉而水穀變色者為熱不變色而登徹清冷者為

寒若肛門燥滿小便黃赤水穀雖不變猶為熱也此山

火性急速食下即化無客尅化所謂邪熱不殺穀也

本方除黃芩大

東加枳實厚朴麥芽白朮茯苓蘇斷丸名枳實消痞丸東垣別見消導門

肺胃

白虎湯

治傷寒脉浮滑表有熱裏有寒指傷寒即病熱之本因也

三陽合病脉浮大腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗

則譫語下之則頭上生汗手足逆冷白汗出者陽明症也面垢少陽症

也遺尿太陽症也三症之中陽明為多屬表證有邪發表則燥熱益甚

故譫語攻裏則陰氣下竭而虛陽上脫必額汗出而手足逆冷若自汗

出者三陽熱甚也與此湯以解內外之熱通治陽明病脉洪大而長不惡寒反惡熱頭痛自

汗口渴舌胎目痛鼻乾不得卧心煩躁亂日晡潮熱或陽毒發斑胃熱

諸病邪熱盛故脉洪大熱在表而淺邪惡正故惡寒熱入裏而深邪甚

之熱越故陽明病法多汗裏熱故作渴陽明主肌肉故肌熱脉交額中

故目痛脉俠鼻金燥故鼻乾胃不和故卧不安人之陽氣晝日行陽二

十五度平旦屬少陽日中屬太陽日晡屬陽明傷寒

一症中日晡潮熱為胃實無虛症胃熱失下則發斑

石膏一斤知母兩甘草二兩粳米六合先煮石膏數十沸味淡再投藥米

熟湯成溫服

此足陽明手太陽藥也熱淫於內以苦發之故以知母苦寒為君熱則

傷氣必以甘寒為助故以石膏為臣石膏滑石味皆甘寒凡藥帶甘者皆瀉中有補津液內燥

故以甘草粳米甘平益氣緩之為使不致傷胃也又煩出于肺躁出于

腎石膏清肺而瀉胃火知母清肺而瀉腎火甘草和中而瀉心脾之火

或瀉其子肺或瀉其母心不啻治陽明氣分熱也石膏甘草不恒清裏兼能發表然必實熱

方可用或有血虛身熱脾虛發熱及陰盛格陽面赤煩躁類亡虎湯症

誤投之不可救也按白虎症脈洪大有力類曰虎症脈大而虛以此為

辨又按陰盛格陽陽盛格陰三症至為難辨蓋陰盛極而格陽于外外

熱而內寒陽盛極而格陰于外外冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必

陰重寒則熱重熱則寒是也當于小便分之便清者外雖燥熱而中必

寒便赤者外雖厥冷而內實熱再看口中燥潤及舌胎淺深蓋舌為心苗應南方火邪在表則未生胎邪入裏津液搏結則生胎而滑胎白者

丹田有熱胸中有寒邪在半表半裏也熱入漸深則燥而澀熱聚于胃則黃宜承氣及白虎若熱病口乾舌黑乃腎水刑于心火熱益深而病

篤矣然亦有胎黑屬寒者舌無芒刺口有津液也又當用溫補之劑尤

宜細辨李東垣曰邪在陽明肺受火剋故用辛寒以清肺所以有白虎

之名白虎西方金神也其觀厚曰如秋金之令行則夏火之炎退成氏

曰立秋後不可服為大寒之劑易老曰有是病則投是藥苟拘于時何以措手若以白虎為大寒承氣又何以行于冬令乎太陽發熱無汗而渴忌白虎表未解也陽明汗多而渴忌五苓猪苓津液大耗也

本方加人參三兩名人參白虎湯
仲景治傷寒渴欲飲水無表症者
白虎

人參生津凡身發熱為熱在表渴欲飲水為熱在裏身熱飲水表裏俱有熱身涼不渴表裏俱無熱欲飲水者不可不與不可過與恣飲則有水結胸心下悸喘咳噦噎
亦治傷寒無大熱口燥渴心煩皆微惡寒者
腫服瘕秘下利諸變症

昔為陽背惡寒口中和者少陰病也宜附子湯今熱未退而微惡寒為表未全罷尚屬太陽然燥渴心煩為裏熱已熾與白虎湯解表邪清裏熱加人參補氣生津○太陽病在表故惡寒少陽在半表半裏亦微惡寒陽明在裏故不惡寒反惡熱間有惡寒者與太陽合病也許叔微曰仲景云傷寒吐下後七八日不解表裏俱熱大渴燥煩者白虎加人參湯主之又云脈浮滑此表有熱裏有寒白虎加人參湯主之又云傷寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎林億校正謂于此表裏差矣予謂不然大抵白虎能除傷寒中渴表裏發熱前後二症或云表裏俱熱或云表熱裏寒皆可服之一種發熱無汗其表不解全是麻黃與葛根症安可行白虎也
亦治太陽中暍
音謁身熱
汗出惡寒足冷脈微而渴
身熱惡寒為在表足冷脈微又不可表
亦治火傷肺胃傳為膈

消喻嘉言曰肺消以地黃丸治其血分腎消以白虎湯治其氣分病不能除醫之罪也本方加蒼朮名白虎加蒼

朮湯治濕溫脉沉細者沉細屬濕先受暑後受濕暑濕相搏名濕溫其症脛冷腹滿頭痛身痛多汗渴而譫語李東垣

白動而傷暑火熱傷氣幸暑之人多得之宜人參白虎湯靜而傷暑濕勝身重安樂之人多得之宜白虎蒼朮湯本方加桂枝

名桂枝白虎湯治溫瘧但熱無寒骨節疼痛時嘔本方加柴胡黃芩

半夏名柴胡石膏湯治暑嗽喘渴本方除粳米加人參名化斑湯治胃

熱發斑脉虛者

竹葉石膏湯仲景治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐傷寒解後除熱未盡津液不足故虛羸少

肺胃虛熱氣虛熱上逆故欲吐亦治傷暑發渴脉虛

竹葉石膏湯二升人參二兩甘草二兩炙工麥冬一升半夏半升粳米半升加薑煎

此手太陰足陽明藥也竹葉石膏之辛寒以散餘熱竹葉能止喘人參

甘草麥粳米之甘平以益肺安胃補虛生津半夏之辛溫以豁痰止

嘔故其熱而不損其真導逆而能益其氣也

又方竹葉石膏木通薄荷梗甘草亦名竹葉石膏湯治胃火盛而

作渴李士材曰陽明外實則用此膏以解肌陽明內實則用承氣以攻下此云胃實非有停滯但陽勝耳火旺則金困故以竹葉湯火

以桔梗救金薄荷升火于上木通泄火于下甘草石膏直入戊土而清其中三焦火平則炎蒸退而津液生矣

升陽散火湯治肌熱表熱四肢發熱骨髓中熱熱如火燎捫之烙手

此病多因血虛得之及胃虛過食冷物抑遏陽氣于脾土並宜服此脾

四肢四肢熱即五心煩燥也火性上行苦鬱而不達則反以銷糜真陰而肌膚筋骨皆為之熱也苦飲食填塞真陰則清陽不得土行故不能

傳化也經曰火鬱發之

柴胡八錢防風二錢葛根五分升麻羌活獨活人參白芍五錢炙甘

草三錢生甘草三錢每服五錢加薑棗煎

此手足少陽藥也柴胡以發少陽之火為君升葛以發陽明之火羌防

降謂
瀉也

以發太陽之火獨活以發少陰之火為臣此皆味薄氣輕上行之藥所

以升舉其陽使三焦暢達而火邪皆散矣人參甘草益脾土而瀉熱

藥瀉脾火而斂陰且酸軟甘緩散中有收不致有損陰氣為佐使也

吳鶴

臯曰經曰少火生氣天非此火不能生物人非此火不能有生揚之則
光過之則滅今為飲食抑遏則生道幾乎息矣使清陽出于上竅則濁
陰自歸下竅而飲食傳化無抑遏之患矣東垣聖于脾胃治之必主升
陽俗醫知降而不知升是撲其少火也安望其衛生耶又曰古人用辛
散者必用酸收故桂枝湯中
亦用芍藥猶兵家之節制也

木方除人參獨活加葱白名火鬱湯治同

火鬱者內熱外寒脉沉而數
火鬱無散故外寒沉為在裏

沉而數知
為內熱也

陶節菴升陽散火湯人參白朮茯苓甘草陳皮麥冬當歸芍藥柴胡黃

芩加薑棗金器煎治傷寒又手胃心脾表裏床語昏沉不省人事

節菴

日俗醫不識誤認風症不知此乃肝執藥肺元氣虛衰不能主持名撮
空症小便利者可治有痰加薑炒牛夏大便秘實語語發渴加大黃泄

利則肺氣猶降膀胱猶能化氣而腎水未枯故可治請按此病非升散之症方中僅柴胡一味難盡升散之名而節蓄以此名方何歟

涼膈散方

治心火上盛中焦燥實煩躁口渴自赤頭眩口瘡唇裂吐血

血大小便秘諸風癰瘡胃熱發斑發狂及小兒驚急痘瘡黑陷上症

中二焦之火為之患也

連翹四兩大黃酒浸芒硝

甘草二兩梔子炒黃芩酒炒薄荷一兩

為末每服三

錢加竹葉生蜜煎

此上中二焦瀉火藥也熱淫于內治以鹹寒佐以苦甘故以連翹黃芩

竹葉薄荷升散于上而以大黃芒硝之猛利推蕩其中使上升下行而

膈自清矣用甘草生蜜者病在膈甘以緩之也李東垣曰易老法減大黃芒硝加桂枝梗竹葉治

胸膈與六經之熱以手足少陽俱下胸膈同相火游行一身之表乃至

高之分故用舟楫之劑浮而上之以去胸膈六經之熱也病用前方

桔梗

中

相

肝

肺

脾

胃

大

小

心

腎

膽

膀胱

三焦

命門

子宮

陰道

前

變者用此方喻嘉言曰按中風症大勢風木合君相二火至病古方用
厚膠散居多如轉舌當用涼膈散如舊清遠志鎮命金丹用涼膈散加
古登蘇根熬火土炎膈膈正燎原之地所以清心寧神轉舌活命涼
膈之功居多不可以宜通陽胃輕營之也按轉舌音散心經之蘊熱活
命清散肝經之移火也活思敬曰仲景調胃承氣湯後人一變加連翹
梔子黃芩薄荷謂之涼膈散至河間又變加川芎歸芍白朮防風荆芥
麻黃散是也古之複方也

治一切肝胆之火神志不寧驚悸搐搦躁擾狂越頭運

目眩耳鳴耳聾胸痞痞塞咽隘不利腸胃躁澀兩脇痛引少腹肝移熱

于肺而咳嗽肝風木主筋主怒主驚故搐搦驚狂皆屬肝火目為肝

脉貫膈循喉嚨水裏火盛故膈咽不利兩脇少腹皆肝胆經所循故
相引而痛五藏六府皆有欬然必傳以與肺肝之移邪則為肝欬

治盜汗益汗屬熱此與當歸大黃湯同意

當歸酒洗龍胆草酒洗梔子炒黃連炒黃柏炒黃芩雨大黃酒青黛水蘆

薤五木香二錢麝香五分蜜丸當湯下