

要药分剂 甲

(共兩冊)



南京中医药大学图书馆版权所有

自叙

按徐之才曰藥有宣通補瀉輕重滑澀燥濕十種是藥之大體而本經不言後人未述凡用藥者審而詳之則靡所遺失誠哉是言也內經發揮宣通等義亦甚詳而十劑之說誠足盡藥之用以為依據矣隱居陶氏續入寒熱二條仲醇繆氏以寒有時不可治熱有時不可治寒其說良是但卽升降二義釋之十劑中如宣輕則兼有升義瀉滑則兼有降義且諸藥性非升卽降或可升可降或升多降少或升少降多別無不升不降專為宣通等性者則升降二字可以槩羣藥不得另立二門次於十劑後宜之才以十劑為藥之大體靡所遺失也自神農著本經歷代藥性書悉以草木金石等依類相次讀者幾忘十字之義并忘藥有此十種之性宜其製方用藥相反相戾錯雜以出之也余輯是書爰據十劑以分門類非敢好異欲聞者曉然於藥之各有其性因各有其用庶臨症時可無背云爾沈金鰲自叙

凡例

沈氏本草全書

凡例

一要藥者尋常日用必需之藥所以別乎險僻之味也古人云良藥治病十全八九毒藥治病治不一也。可見用藥之當慎矣茲編所錄止四百餘品稍涉險僻者槩屏去之。一是編照十劑分類欲人曉然於藥之各有其性而宣通補瀉輕重滑潤燥濕一覽易知不致引用錯誤也。

一每藥首明主治見藥之功用不一也次詳歸經見藥與經各有所入不相襲也次列前人議論見藥之味性運用有至當也次標禁忌見藥之於症宜詳審也次及炮製見藥之味性有偏其相救相制不可略也。

一前人云用藥依本經所治總無大錯故是編所錄之藥凡有本經者無不首列至名醫別錄所以補本經未備者亦無不錄其歷代諸賢發明諸藥功用又足備別錄之缺悉皆採入。一上自本經下至綱目備要等所言治法或不與是藥相合即刪削之或又彼此所言相同則存前而刪後。

一引前人議論必於是藥功用及與是藥所治病發揮精切其旨畫一者方始錄之非徒徵引繁博為也。一主治及前論俱真書前人之語不敢改竄以其語皆至當莫易也隨各注其名或字不敢沒人善也。或有前人識所未及而鄙見偶及者則用鰲按字附其說於後。

一歸某經下必著為如何之品句此數字或括是藥全性或耑及是藥最重之用其故不一當意會之。一仲醇經疏為自來本草第一精細之書其著簡誤尤為審量極至故是編禁忌一宗之。

一編中有不列炮製者或以是藥無甚製法或製法衆共皆知便不復贅。

要藥分劑目錄

卷一 宣劑上 共四十一種

桔梗

天麻

秦艽

柴胡

前胡

防風

羌活

獨活

延胡索

貝母

細辛

茅根

川芎

蛇床子

藁本

白芷

木香

高良薑

白豆蔻

縮砂仁

鬱金

香附

藿香

蘭草

荆芥

薄荷

紫蘇

蘇梗

蘇子

菊花

豨莶草

款冬花

常山

蜀漆

百部

威靈仙

茜草

剪草

鈎藤

絡石

馬勃

卷二 宣劑下

共五十五種

辛夷

檀香

烏藥

乳香

沒藥

龍腥香

茯神木

海桐皮

皂莢

檉榔

蕪荑

五加皮

蔓荆子

紫荊皮

密蒙花

川椒

椒目

穀芽

豉

葱莖白

白芥子

萊菔

菜菔子

生薑

乾薑

炮薑

胡荽

橘核

枇杷葉

荔枝核殼

橄欖

甜瓜蒂

銅青

硼砂

露水

生熟湯

白鵠

五靈脂

虎骨

麝香

穿山甲

蛇脫

白花蛇

烏賊骨

淡菜

露蜂房

白僵蠶

蝎

蜈蚣



卷三 通劑全 共三十三種

木通 通草

澤蘭 香茹

澤鴻

菖蒲

茵陳蒿 益母草

茺蔚子

紅花

大薊

小薊

地虜子 瞿麥

王不留行

車前子

刺蒺藜

海金沙

甘遂 茯苓白朮

琥珀

赤小豆

故仁

豬苓

流水 白魚

麋蠅

大豆黃卷

蕷菜

葛根

卷四 補劑上 共三十七種

甘草 黃耆

人參

沙參

丹參

葳蕤

白朮 金毛狗脊

遠志

巴戟

淫羊藿

當歸

石斛 骨碎補

續斷

生地

熟地

鮮生地

牛膝 麥冬

旱蓮草

沙蓆藜

兔絲子

使君子

天冬 何首烏

側柏葉

柏子仁

血竭

茯神

桑寄生 杜仲

棗仁

山萸肉

女真實

杞子苗葉

卷五 補劑下 共四十六種

小麥 稽豆

白扁豆子

蕷子

山藥

百合

大棗 陳皮

橘紅

胡桃

龍眼

甘蔗

藕 蓼子

蓮鬚

黃土

髮鬚

亂髮

秋石 人乳

紫河車

鴨

野鴨

烏雞



雞肫皮

雞屎白

鹿茸

鹿角

鹿角膠

麋茸

麋角

羊肉

羊肝

羊腎

牛乳

牛髓

牛角肥

阿膠

膾肺膚

魚膘

龜甲

鱉甲

蜂蜜

蠟

桑螵蛸

原蠶蛾

龜甲

卷六 滅劑上

共六十七種

大黃

知母

元參

白頭翁

三七

黃連

胡黃連

黃芩

苦參

龍膽草

白微

白前

丹皮

薑黃

蓬莪术

京三棱

海藻

海帶

昆布

蒲公英

青蒿子

夏枯草

劉寄奴

旋覆花

青葙子

漏蘆

蘭根

牛蒡子

大青

青黛

藍澱汁

青布

蘆根花

紫苑

決明子

葶藶

忍冬藤

射干

馬兜鈴

瓜萎實仁

花粉

山豆根

厚朴

金銀花

降真香

阿魏

蘆薈

黃柏

桑皮

桑葉

槐花

槐角子

蘇木

巴豆

郁李仁

大腹皮

竹葉

枳實

枳殼

山梔子

雷丸

竹茹

竹瀝

天竺黃

卷七 滅劑下

共三十四種

菜豆

冬瓜子

桃仁

梨

青皮

檳榔

西瓜

食鹽

山楂

青鹽

卷八

寒水石 人中黃 薑清

人中白

人溺

夜明沙

夜明沙

犀角 羚羊角

熊膽

刺猬皮

龍齒

真珠

石決明 海蛤粉

瓦楞子

水蛭

蟻蛆

蟲蟲

蟾蜍 蟾酥

白頸蚯蚓

蚯蚓泥

蟻蛆

卷八  
輕劑全 重劑全 共三十二種

升麻 蒼耳子

葛花

木賊草

燈草

連翹

穀精草 葛根

葛粉

百草霜

墨

蟬退  
以上輕劑

沉香 紫檀

金箔

銀箔

自然銅

鐵砂

鉛黑錫 鉛粉

黃丹

密院僧

硃砂

雄黃

雌黃 石膏

陽起石

磁石

青礞石

代赭石

伏龍肝  
以上重劑

卷九  
滑劑全 滾劑全 共四十一種

肉蓯蓉 鎋陽

紫草

蒲黃

冬葵子

榆白皮

胡麻 麻油

大麻仁

薤白

柿子

榧子

海松子 滑石

以上滑劑

赤石脂

白石脂

地榆 白芨

芍藥赤

五味子

覆盆子

椿榔皮

秦皮 詞子

棕櫚皮

金櫻子

南燭子

醋

豐稟殼木  
禹餘糧

烏梅 木爪

芡實

赤石脂

烏爹泥

明礬 皂礬

膽礬

龍骨



北京中医药大学图书馆版印所有

牡蠣

五倍子

百藥煎以上瀝制

卷十 燥劑全 濕劑全 共三十四種

蒼朮

仙茅

草豆蔻 草蔻

益智仁

補骨脂

葫蘆巴

附子

川烏

草烏

白附子

天南星 脣星

半夏

肉桂

桂枝

柳桂

官桂

丁香

胡椒

畢澄茄

吳萸

茴香

小茴

鑪甘石

硫黃以上燥劑

飴糖

白石英

紫石英

朴硝

芒硝

馬牙硝

風花硝

硝石

元明粉以上溼劑

KEJING LIBRARY

北京中醫大學圖書館版權所有

要藥分劑

宣劑上

沈金鰲撰

徐之才曰。宣可去壅。生薑、橘皮之屬是也。李杲曰。外感六淫之邪。欲傳入裏。三陰實而不受。逆於胸中。窒塞不通。而或噦或嘔。所謂壅也。三陰者脾也。故必破氣藥如生薑、橘皮、藿香、半夏之類。

瀉其壅塞

王好古曰。

木鬱達之。火鬱發之。土鬱奪之。金鬱泄之。水鬱折之。皆宣也。

桔梗

味苦辛性微溫。有小毒。感熱陽中陰也。畏白芷、龍胆草。忌猪肉。內伏砒石。

升

火陽中陰也。畏白芷、龍膽草。忌猪肉。內伏砒石。

利五藏

腸胃除寒熱風癆。療咽喉痛下蟲毒。別

治下痢

破血積氣。消聚痰涎。去肺熱。氣促嗽逆。除腹

中冷痛

主中惡。小兒驚癇。下一切氣。止霍亂。轉筋。心腹脹滿。除邪辟溫。

破癰瘍。肺癰養血。排膿補

內漏及喉痺。狀

利竅。治肺部風熱。清利頭目咽喉。胸膈帶氣及痛。除鼻塞。

寒。塞。元。

主口舌

生瘡。赤目腫痛。

時。經。入肺心二經。兼入胃經。為開發和解之品。

兼瀉劑。肺

論。張元素曰。

桔梗清

肺氣

利咽喉。其色白。故為肺部引經同甘草為舟楫之劑。如大黃苦洩峻下之藥。欲引至胸中至高之

分。須用辛甘升之。

譬如鐵石入江。非舟楫不載。所以諸藥有此一味。不能下沉也。

朱震亨曰。

乾欬嗽

乃痰火之邪。鬱在肺中。宜桔梗開之。

痢疾。腹痛。乃肺金之氣。鬱在大腸。亦宜桔梗開之。

後用利藥。此藥

能開提氣血。故氣藥宜用。

論。經疏曰。

凡攻補下焦藥中。勿入氣逆上升。不得下降。及邪在下焦。均忌。

雷公曰。

凡用須去頭上尖硬二三分。并去浮皮。泔浸微炒。

天麻

味辛性平。無毒。得土之辛味。兼感天之陽氣以生。升也。陽也。一名定風草。苗名赤箭根。即天麻。

強筋力。

開。治冷氣癭。癲癇。緩不隨語。多恍惚。善驚失志。

論。治風虛眩暈頭痛。

元。

入肝經為祛

風之品。

肝經氣

論。東垣曰。肝虛不足者。天麻川芎以補之。

羅天益曰。眼黑頭旋。風虛內作。非天麻

不能治。天麻為定風草。故為治風之神藥。久服則遍身發紅丹。是驅風之驗也。

寇宗奭曰。天麻須別

分藥。

論。東垣曰。肝虛不足者。天麻川芎以補之。

羅天益曰。眼黑頭旋。風虛內作。非天麻

藥相佐使然後見其功仍須加而用之。圖經曰天麻用根有由內達外之理亦箭用莖有自表入裏之功。

經疏曰風藥多燥風能勝濕故也。凡病人覺津液少口乾舌燥咽乾痛大便澀及火炎頭暈

血虛頭痛南方似中風證均忌。

備要曰凡用以明亮堅實者佳濕紙包煨熟切片酒浸一宿焙

秦艽味苦辛性平無毒感秋金之氣而性平微陽也葛蒲故氣類而性辟。

經主寒熱邪氣寒濕風痹肢節痛下水利小便癃瘻風

無問久新通身攀急鉗

傳尸骨蒸治療疾及時氣暎

療酒疸黃疸解酒毒去頭風

濕及手足不遂口噤牙痛口瘡腸風濕血能養血榮筋元

治胃熱虛勞發熱

鑄入胃大腸二經

兼入小膽

二經為洩散疎利之品

胃大腸去風濕藥

痘瘡感受風寒發熱遍身疼痛必以秦艽治之以其能散結除邪也并能養胎

疏曰下部虛寒人及小便不禁者均忌。

用時珍曰形作羅文相交長而黃白左紋者良。

柴胡味苦性平一云微寒無毒稟仲冬之氣兼得地之辛

主傷寒邪熱痰熱結實虛勞肌熱嘔吐心

煩諸瘧寒熱頭眩目赤胸痞脇氣口苦耳聾女人熱入血室胎前產後諸熱小兒痘疹五疳羸熱散十

二經瘡疽血凝氣聚功同連翹

要腸胃心腹中結氣五藏間遊氣胸中邪氣大腸停積水脹及濕痹

拘挛肩背疼痛脾陽氣下陷平肝胆心包三焦相火及頭痛眩暎

本草論

入肝胆心包三焦四經

為表散之品

四經引經藥

其功散表和裏退熱升陽

東垣曰柴胡能引清氣行陽道傷寒外諸有熱病則加之無熱不必加之能引胃氣上行升騰而行春令

時珍曰癆有五癆在肝胆心心包有熱則柴胡乃

此四經必用之藥癆在脾胃有熱或陽氣下陷柴胡為升清退熱必用之藥惟癆在肺腎當斟酌用

之然亦非必禁用也

孫琳曰凡瘡熱從體出若加剛劑血氣愈虧熱有在皮膚在藏府在骨髓在

骨髓者非柴胡不可若得真銀柴胡一服可愈南方者力減必三服乃可愈

汪鼎曰凡腸痛多是肝

木有餘宜小柴胡湯加青皮川芎白芍又左脇痛宜活血行氣右脇痛宜消食行痰又熱入血室男女皆有之柴胡在藏主血在經主氣

鰲按今人治瘧必用柴胡若非柴胡卽不足以爲治者故致輒轉淹滯變生不測竟能殞命則知瘧本非死證惟槩以柴胡治瘧者殺之也夫柴胡爲少陽表藥若其瘧果發於少陽而以柴胡治之無不立愈若係他經用之則必令他經之邪輒轉而入少陽遷延日久正氣已虛邪氣仍盛而且彌漫諸經又或調養失調以至斃命所必然矣乃既至於死而醫家猶曰柴胡爲治瘧要藥吾開手卽用之不知其何以死病家亦曰以柴胡治瘧而竟不效此其命之當死也彼此昏迷不得一悟良可浩歎古人云凡瘧誤服柴胡令人淹縕不已是在古人未嘗不提醒此言而醫者總不能讀書或讀而未明其理故至此也今人又以柴胡爲治瘧要藥不知柴胡專於升散並不能治瘧熱其始皆由日華子補五勞七傷藥性能治勞之羸瘦之語誤之以致後人妄用殺人行義又有種真藏虛損復受邪熱邪因虛而致勞當須斟酌用之此亦推究其極而言惟其因虛復受邪熱以致成勞故猶可斟酌而用若但真元虛損其不可再用表散之藥明矣余非好異實以人命攸關故爲辨論於此也

註經疏曰凡虛人氣升嘔吐及陰虛火熾灸上法所忌瘧非少陽經者勿入

備要曰產銀州者色白黃而大北產者色微黑而細並良南產者强硬不堪用外感生用有汗欬者蜜水炒內傷升氣酒炒下降用梢

前胡味苦一云甘辛性微寒無毒得土金之氣而感於冬

注主痰滿胸膈中痞心腹結氣風頭痛去痰

下氣治傷寒寒熱經能去熱實及時氣內外俱熱

治一切氣破癥結開胃下食通五藏主霍亂

轉筋骨節煩悶嘔吐反胃氣喘欬嗽安胎小兒一切疳氣

啾啾清肺熱化痰熱散風邪

焦二經兼入脾胃大腸肝膀胱五經爲解散之品

兼瀉下氣要藥

時珍曰前胡性降與柴胡純陽上

升不同故其功長於下氣氣下則火降痰亦降爲痰氣要藥

汪訥菴曰辛以暢肺解風寒甘以悅脾

理胸腹苦洩厥陰肝家之熱寒散大腸膀胱之邪又肝膽經風邪非前胡不治

繆仲嶠曰前胡能散

有餘之邪熱實痰不可施之氣虛血少之病

虛而不歸元以致胸脇逆滿頭痛不因於痰而由陰血虛內熱心煩外現寒熱而非外感者均忌

防風味甘辛性微溫無毒稟天地之陽氣以生

節疼痛經 煙草葉惡藜蘆白斂乾薑芫花

眼止冷淚及癰瘍通利五臟關脉五勞七傷羸損盜汗心煩能安神定志勻氣脈狀

肺竇散頭目中滯氣經絡中留濕主上部見血

胃二經兼治瘡瘍備 約入肝大腸三焦三經為表發疎散之品

皆能勝濕

東垣曰卒伍卑賤之職隨所引而下乃風藥中潤劑若補脾胃非此引用不能行又防風

本制黃耆黃耆得防風而功最大取其相畏而相使也徐之才曰得葱白能行周身得澤瀉藁本

風得歸芍陽起石禹餘糧治婦人子藏風元素曰防風治風通用身半已上風邪用身半已下風

邪用梢治風去濕之仙藥也能治胃竇誤服濁人上焦元氣

驥經疏曰似中風產後血虛發瘡諸病

血虛瘡急頭痛不因風寒塘泄不因寒濕二便祕澀小兒脾虛發搐慢驚慢脾風氣升作嘔火升發

陰虛盜汗陽虛自汗均忌

獨活味辛苦性溫無毒稟天地之氣以生升也陽也

主風寒所擊金瘡止痛資豚癰瘍

女子疝瘕療諸賊風百節痛風無

久新者一名羌活

主入少陰氣分以理伏風治本經傷風頭痛頭暉目眩風熱齒痛瘻瘍溼瘍奔

豚癰瘍

入腎經為搜風去濕之品少陰引經氣分藥

所用獨活必緊實者東垣治太陽所用羌活必輕虛者正如黃芩取飄枯者名片芩治太陰取條實者

名子芩治陽明其義同也蘇恭曰療風宜獨活兼羌活王好古曰羌活乃足太陽厥陰少陰藥與

獨活不分二種後人因羌活氣雄獨活氣細故雄者治足太陽風濕相搏頭痛百節痛一身盡痛者非此不除乃撥亂反正之主君也細者治足少陰伏風頭痛兩足濕痺不能動止者非此不治而不治太

醫經疏曰凡陰虛火熾煎熬真陰凝結為痰而嗽真氣

息經疏曰陰虛火熾煎熬真陰凝結為痰而嗽真氣

陽之症

時珍曰凡使去皮或焙用二活同

羌活味性同

獨活

一名獨搖草得風不搖無風自動

一物二種或云

獨活是羌活

則能引氣上升通

竇脈

大王

治與獨活同本

主入足太陽以理遊風兼入足少陰厥陰氣分濁肝氣搜肝風小無不入大無不通

治風濕相搏本經頭痛剛痙柔痙中風不語頭旋主目赤要藥

認

羌活

小腸經為發表搜風勝濕之品

專治膀胱

小腸行經風藥

足太陽風濕諸病

肝腎氣分藥

氣雄善散

人膀胱經兼入肝腎二經又入

經

汪昂曰中風大法有四一偏

枯半身不遂二風痱四肢不收三風瘡忽不知人四風瘡諸風類瘡風證盡矣何嘗有真中精中之說乎此證皆由氣血虧虛醫者不知養血益氣以固本徒用烏附羌獨以除風命曰虛虛誤人多矣且真中定重於類中焉有類中既屬內傷真中單屬外感者乎

經疏曰凡血虛發瘡血虛頭痛及遍身

疼痛骨痛因而帶寒熱者俱屬內證均忌誤用必反劇

延胡索味辛苦性溫無毒稟初頭之氣而兼得金之辛味以生可升可降陰中陽也

主破血產後諸病因血所為者婦人月經不調腹中

結塊崩中淋露產後血暈暴血冲上因損下血或酒磨及煮服

經

主暴腰痛

緩腰膝破癩癬

撲損瘀

血落胎啾

治心氣小腹痛有神

好散氣

治腎氣通經絡李

活血利氣止痛通小便

論

汪昂曰

主手足太陰厥陰能行血

經兼入肺脾腎心包四經為利氣活血以止痛之品

繼治氣血

論

時珍曰

入手足

太陰

厥陰

能行血

中氣滯氣中血滯故專治一身上下諸痛用之中的妙不可言凡胃脘當心痛下痢腹痛氣凝血滯遍身作痛肢節拘掣服之皆有奇效

經疏曰

此藥性溫味辛能走而不能守故經事先期及一切血

熱為病凡崩中淋瀝皆應補氣血涼血清熱則愈此均忌

制

備要曰

凡使

取根如半夏內黃小而堅

者更酒拌行血醋炒止血生用破血炒用調血

貝母味辛苦性平無毒在地則得土金之氣在天則稟清肅之令

主

傷寒煩熱

淋瀝邪氣疵瘕喉痹

乳難金瘡風瘻經

欬嗽上氣

止煩熱渴出汗

別

消痰潤心肺

末和砂糖丸含

止嗽亦飲瘡口

咽

主胸膈逆滿時疾黃疸

癰

治人面瘡

癰

經

入心肺二經為散結洩熱潤肺清火之品

肺家

氣分藥

大王

要藥分劑

宣劑上

辛散

肺鬱

論前

汪機曰

貝母肺經藥半夏脾胃經藥切不可代

蘇恭曰能散心胸鬱結之氣用以治心中

氣不快多愁鬱者有功。訥菴曰貝母寒潤主肺家燥痰半夏溫燥主脾家濕痰凡風寒濕熱諸痰負

母非所宜也宜用半夏

仲鈞曰淋瀝者小腸有熱也心小腸表裏清心家之煩熱則小腸之熱亦解

知經曰一陰一陽結為喉痹一陰者少陰君火也一陽者少陽相火也解少陰少陽之熱除胸中煩熱

則喉痹之證自愈

論疏曰寒濕痰食痰嗽濕痰在胃惡心欲吐痰飲作寒熱脾胃濕痰作眩及痰

厥頭痛中惡嘔吐胃寒作淺法宜辛溫燥熱藥如星夏苓朮之類者均忌

許大者心一顆拌糯米炒黃去米用備要曰川產開瓣者良獨顆無瓣者名象耳稍次

細辛味辛性溫無毒稟天地陽升之氣以生升也陽中陽也裏

根樹為使惡黃耆山萸茱荊毒忌生薑畏硝石滑石及藜蘆

痛死肌本經溫中下氣破瘀利水道開胸中除喉痹體鼻風癧疾下乳結汗不出血不行益肝膽通精

氣歸入心小腸二經為散風泄熱之品

心家別經腎水本

主放逐頭痛腦動百節拘掣風濕脾

元素曰以獨活為使治少陰頭痛如神亦止諸陽頭痛諸風通用之味辛而熱溫少陰之經散水氣以

去內寒成無己曰膽氣不足細辛補之又治邪氣自裏之表故仲景少陰證用麻黃附子細辛湯

張子和曰治頭痛太陽則羌活少陰則細辛陽明則白芷厥陰則川芎吳萸少陽則柴胡用之不可差

細辛香味俱細而緩故入少陰與獨活相類

論疏曰此風藥也升燥發散凡內熱及大升炎上上

盛下虛氣虛有汙血虛頭痛陰虛放喫均忌卽入風藥亦不可過五分以性過烈也

雷公曰凡使

細辛根味甘性寒無毒正稟土之冲氣可降陽也

下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中

王勞傷虛羸補中益氣除瘀血閉寒熱利小便本

噦逆肺熱喘急水腫黃疸解酒毒

時珍曰甘能

清伏熱利小便故治以上諸證良藥也世人以微而忽之惟事苦寒以傷沖和之氣烏知此之清火行

切去頭須揀去雙葉者不用

白茅根味甘性寒無毒正稟土之冲氣可降陽也

根生之氣而生可升可降

王勞傷虛羸補中益氣除瘀血閉寒熱利小便本

下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中

婦人月經不行通血脈淋瀝

止吐衄諸血傷寒

噦逆肺熱喘急水腫黃疸解酒毒

時珍曰甘能

清伏熱利小便故治以上諸證良藥也世人以微而忽之惟事苦寒以傷沖和之氣烏知此之清火行

水有甚妙哉。

醫經疏曰因寒發噦中寒嘔吐濕痰停飲發熱均忌。

川芎味辛性溫無毒禀天之溫氣地之辛味以

主中風入腦頭痛寒癲筋攣緩急金瘡女人血閉

子經

治腦中冷痛面上游風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛

風痛

鍼腰脚軟弱半身不遂胞衣不下

破癰瘍宿血

養新血吐衄漏血腦癱一切癰瘍長肉排

膿消瘀

搜肝風補肝血潤肝燥益肝虛

燥濕止渴利行氣開鬱

時經入肝經兼入心包膽

二經為補

血潤燥行氣搜風之品

陽引經藥專和血通肝

寇宗奭曰頭面風不可缺然須以他藥佐之

元素曰上行頭目下行血海能散肝經風治少陽厥陰頭痛及血虛頭痛聖藥

東垣曰頭痛必用川芎如不愈各加引經太陽羌活陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮厥陽吳萸少陰細辛

丹溪曰鬱在中焦須川芎開提其氣以升之氣升則鬱自降故川芎總解諸鬱直達三焦為通陰陽氣血之使

時珍

曰川芎血中氣藥肝苦急辛以補之故血虛者宜辛以散之故氣鬱者宜左傳言麥蘋蕪蕘禦濕子治

濕濁每加二味其應如響血痢已通而痛不止乃陰虧氣鬱也加川芎為佐氣行血調其痛立止此皆

醫法妙旨

汪機曰川芎為肝經藥若單服日久則辛喜歸肺肺氣偏勝金來賊木肝必偏絕而大

蛇床子味辛苦性溫無毒感地

巴豆決明硫黃可降陽也惡毒皮目母

海主男子陰痿濕癢女人陰中腫痛陰癢除瘻飛利闌

節癩癪惡瘡

本經去男子腰痛治男子陰去風冷大益陽事

縮小便去陰汗濕癬齒痛赤白帶煎

湯浴大風身癢

本經入命門三焦二經為疏風去濕之品

二經氣分藥腎散寒強陽益陰

論前好古曰此藥令人

陽氣盛數號曰鬼考

本經按凡右腎命門有虛寒證者宜用若腎家有火下部有熱及陽易舉者雖有

濕宜斟酌用之

雷公曰凡使百部濃汁浸一宿曬乾生地汁拌蒸半日曬乾用

大明曰按去殼

取仁微炒殺毒即不辣浴湯生用

藁本味辛苦性溫無毒感天之陽氣兼得地之

主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛本治

一百六十種惡風鬼疰流入腰脊痛冷去頭風點炮

太陽頭痛顛頂痛大寒犯腳痛連齒齶

沈氏尊生書

卷一

頭面身體皮膚風濕疎 督脈為病脊強而厥

治癰疽排膿內塞

經入膀胱經為專去風寒

濕邪之品

足太陽經

風藥

專論

元素曰此藥氣雄壯寒鬱太陽經必用之藥頭痛非此不除

同

木香治霧露之清邪中於上焦既治風亦治濕從類也

聞見錄曰風客於胃作泄飲以藁本湯可止

臍經疏曰溫病頭痛發熱口渴或骨疼及春夏傷寒陽證頭疼產後血虛火炎頭痛均忌

白芷

味甘性溫無毒得地之金氣兼感天之陽氣以生升多於降陽也當歸為使惡旋覆花制雄黃

主女人漏下赤白血閉陰腫寒頭風侵目

淚出可作面部經

風邪久渴嘔吐兩脇滿頭眩目癢

解利手陽明頭痛中風寒熱及肺經風

癰瘡排膿止痛

止心腹血刺痛女人憑血腰痛血崩

解利手陽明頭痛中風寒熱及肺經風

頭面皮膚風痺燥癢

治鼻淵鼻衄齒痛眉棱骨痛大腸風

風熱及肺經風

蛇傷刀箭金瘡

入肺胃大腸三經為散風表汗除濕通竅之品

正陽明引經本藥

東垣曰白芷

風通用芳香通九竅表汗不可缺也

河間曰正陽明頭痛熱厥頭痛加用

時珍曰頭目眉齒諸病

肺胃大腸三經風熱也漏帶癰疽諸病

三經濕熱也為陽明主藥

仲鴻曰走三經氣分亦入三經血

分

臍經疏曰嘔吐因於火漏下赤白陰虛火熾病由血熱所致者均忌

木香

味辛苦性溫無毒稟夏秋之陽氣兼得土之陽精以生降也陰中陽也

主邪氣辟毒疫溫鬼

經治心腹一切氣膀胱冷痛嘔逆

反胃霍亂泄瀉痢疾健脾消食安胎

附主九種心疫積年冷氣痃癖癥塊脹壅氣上冲煩悶羸劣女

人血氣刺心痛不可忍末酒服之

行肝經氣燠熟實大腸

潔治衝脈為病逆氣裏急主將滲小

便祕

歸入三焦經為行氣之品

三焦氣分藥

升降諸氣

氣疏肝氣相脾胃氣疏

寇宗奭曰此專泄決胸腹間滯塞

冷氣他則次之得橘皮蔻仁生薑相佐效尤速

元素曰木香除肺中滯氣若治中下二焦氣結滯及

大

不轉運須檳榔為使

丹溪曰氣鬱不達者宜之若陰火冲上者此則味辛而氣上升反助火邪宜用

知柏少以木香佐之

臍經疏曰肺虛有熱元氣虛弱及陰虛內熱諸病有熱心痛屬火均忌

高良薑

味辛性大溫無毒稟地之氣以生升也陽也

主胃中冷逆

治腹內久冷氣痛去風冷痺弱

健脾胃寬噎

膈破冷癖除瘡瘍

脾胃二經為溫中散寒之品

兼燥劑  
胃寒家要藥  
治逆

論楊士瀛曰凡噫逆冒寒

者此為要藥人參茯苓佐之為能溫胃解散胃中風邪也

經疏曰胃火作嘔暑霍亂火熱注滿心

虛作痛均忌

時珍曰宜同東壁土炒過入藥

白豆蔻味辛性大溫無毒感秋燥之令而

主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣

散胸中痰寬膈泄

食去白睛醫膜果去感寒腹痛

補肺氣益脾胃理元氣收脫氣

治噎膈除瘧疾解酒

毒

時珍曰入肺經兼入胃經為行氣之品

肺經本藥  
三焦溫運脾胃  
流行

吐 楊士瀛曰能治脾虛瘧疾嘔吐寒熱能消能磨流行三焦榮衛一轉諸證自平

時珍曰凡嘔

吐反胃不因於寒及由陽虛者與火升作嘔因熱腹痛者均忌

縮砂仁味辛性溫無毒禀天地陽和之氣以生降

主冷氣痛止休息氣痢溫煖肝腎

時

砂仁多於升陽也得詞草道白蘿蔴蜜鹽甲良

主冷氣痛止休息氣痢溫煖肝腎

一切氣霍亂轉筋

時

砂仁之辛可以潤之又屬土主醒脾胃引諸藥

三經為行氣調中之品

時論韓飛霞曰腎惡燥砂仁之辛可以潤之又屬土主醒脾胃引諸藥

歸宿丹田補腎藥用地黃蒸丸取其達下也

經疏曰芳香入脾辛能燥腎故為開脾胃之要藥和中

氣之正品若兼腎虛氣不歸元非此為向道不濟殆勝桂附熱毒之害多矣

時論經疏曰本非肺經藥

亦有欲逆用之者通指寒邪鬱肺致欬之病若肺熱欬逆及一切病由於火炎暑熱氣虛濕熱均忌

鬱金味辛苦性寒無毒禀天令清涼之氣兼得土

主血積下氣生肌止血

血淋尿血金瘡

時單用

治女人宿血氣心痛冷氣結脹

涼心素治陽毒入胃下血頻痛

產後敗血沖心欲死失心

癲狂蠭毒

治吐衄婦人倒經痘毒入心潮

入心肝二經兼入胃經為行氣解鬱涼血破瘀之

品

時仲鴻曰鬱金本入血分之氣藥其治諸血證者正謂血之上行皆屬內熱火炎此藥能降

氣氣降卽火降而其性又入血分故能降下火氣使血不妄行也丹溪不違此理乃謂上行治血誤矣