

幼
科
卷
四



民國廿八年五月二十九號

編輯幼科痘疹心法要訣

卷四



南京中醫藥大學圖書館版權所有

編輯痘科心法要訣

看痘訣曰三五相連恐不吉四六排牽定

面部吉凶圖



是凶一二上下皆吉道雙單扶處不須憂

體腫硬者凶蓋肝藏魂肺藏魄泉毒侵犯則魂魄將離安望其有生意乎頰下屬腎
 自承漿以至兩頤先見點先灌先靨者吉誠以此位雖係腎部而三陰三陽之脈皆

面部吉凶論○面為諸陽聚會之所其部
 位各有所屬欲識痘出之吉凶須按部位
 驗之則立判矣如額屬心位自印堂以上
 髮際以下至日月兩角若先見點先作漿
 先結靨者皆惡候也以心為君主義不受
 邪先見於是位者乃毒發心於故非吉兆
 也左頰屬肝右頰屬肺若兩頰先見紅點
 磊落分明者吉如相聚成塊地界不清肉



聚於此先發先灌先靨者乃陰陽和暢故不治也至若鼻屬脾藏位在中央所最忌者準頭先出先靨也蓋脾土榮養於四藏若毒發於脾是脾敗矣脾敗則四藏亦隨之而敗即纏綿時日亦不過苟延性命而已夫耳為腎竅又少陽相火之脉行耳前後故凡耳輪先見紅點者乃火毒燔灼難以撲滅非吉象也最可喜者口唇四圍先出先灌先靨也以陽明之脉俠口環唇胃與大腸主之多氣多血之處無物不受故主吉也此藏府部位之要須詳察於平時庶能權宜於臨證也

蒙頭圖



蒙頭○頭為諸陽之會偏身稀疎而頭獨稠密者名曰蒙頭此毒參陽位也若痘形稠尖圓者當以鬆肌通聖散治之設頭紅腫如瓜是為不治之證即投藥餅終靨無濟○鬆肌通聖散 荆芥 羌活 牛旁研防

風

紫草 紅花 青皮 當歸 赤芍 地丁 蜂房 山查 木通 引蘆 芫

抱髮圖



抱髮○兩鬢近於太陽出痘稀朗則吉若稠密粘連名曰抱髮乃毒狂盛也宜先用鬆肌通聖散透發其毒繼用歸宗湯攻其湯

毒熱庶可轉危為安○鬆肌通聖散方見蒙頭證治歸宗湯方見發熱證治

蒙頭圖



燕脂膏

升麻煎膿湯去滓用棉燕脂於湯內揉出紅汁再加雄黃細末調勻調患處

鬆肌通聖散

方見蒙頭證治○歸宗湯方見發熱證治

鎖眼圖



抱鼻圖



燕脂膏

方見蒙頭證治

○黃連解毒湯方見結毒瘡證治

面部俱稀兩眼週圍獨稠蜜者名曰鎖眼也乃毒熱熾甚傷於脾經外宜貼燕脂膏內服清熱解毒湯○清熱解毒湯方見見燕脂膏方見見面部俱稀獨鼻左右蜜如蠶者名曰抱鼻此乃毒聚脾肺至危之證先以燕脂膏塗於鼻上繼用黃連解毒湯治之

鎖口圖



一嘴角有痘一粒較諸痘獨大板硬無盤名曰單鎖口兩嘴角各有一粒名曰雙鎖口又口之上下四旁連串環繞者名亦曰鎖口



此毒擁於脾也初出急以銀錢挑破外以燕脂膏貼之內服瀉黃散使痘轉紅治庶可望生○燕脂膏方見蒙軌證治

瀉黃散 犀角 黃連 生地 青皮 木通 石膏 丹皮 荆芥穗

研 大黃 紅花 紫花地丁 引用燈心水煎服

鎖唇圖



若見黑色則血凝毒稠終無救矣○瀉黃散方見蒙軌證治○燕脂膏方見蒙軌證治

豬尾膏 取小雄豬尾尖血十數滴和梅花水片少許即調於前劑內服

託腮圖



滿面俱稀獨兩腮之痘攢聚成片者名曰託腮乃正氣為毒所阻難以起發也當見點之初毒勢未成即以黃連解毒湯解之如板

硬紫點以歸宗湯攻之

黃連解毒湯方見結痂落痂證治○歸宗湯方見發熱證治





鎖項者咽喉之管籥也此處痘出攢名曰鎖項若不急治迨毒攻咽喉必發為腫痛音啞聲啞湯水難下多致不救急用清金

攻毒飲庶或望生

清金攻毒飲

中旁子

甘草

枳壳 礞石 礞石 礞石 礞石

荆芥

大黃 蟬退

山豆根 引加燈心水煎服



披肩之痘粘連成攢其色赤紫滯黯名曰披肩此毒氣不鬆上下阻塞也以清熱解毒湯主之大便秘者以歸宗湯主之

清熱解毒湯

方見見點證治

歸宗湯

方見發熱證治



聚背者名曰聚背而亦當辨根脚之緊鬆根鬆者毒尚活動內粘連者名曰聚背而亦當辨根脚之緊鬆根鬆者毒尚活動內

服鬆肌通聖散外用燕脂膏貼之根緊硬者因毒蝕血凝急用必勝湯治之然亦死

中求活之一法耳

○鬆肌通聖散 方見蒙頭證治 燕脂膏 方見蒙頭證治 必勝湯 方見見點證治





胸膈乃心肺二經部位出痘稀少方吉倘攢挨於此名曰攢胸
乃毒熱所致也當以涼膈毒飲治之則梟毒不內俊矣

涼膈攻毒飲 梔子生 黃連生 石膏生 荆芥 紫地丁 枳壳炒 桔梗 元參生

地 牛旁子生 大黃 赤芍 甘草生 薄荷 木通 引加燈心竹葉水煎服



痘名斷橋者腰間絕無一點惟身之上下稠密也蓋梟毒壅於
上下稠密也氣血阻於中攻宮故致上下隔斷而成最惡之證

宜用歸宗湯攻之使無痘處透出方化為吉○歸宗湯方見發熱證治



腰為腎候痘宜疎稀若連珠環繞名曰纏腰此毒伏於腎也治
宜攻毒為主宜用歸宗湯主之○歸宗湯方見發熱證治



腹前出痘狀如囊聚名曰囊腹是梟毒衝突勢甚猖狂也此地
近於臟腑毒易內攻須先用鬆肌通聖散透發其毒再用歸宗

湯以攻其毒使地界分明根脚鬆動庶無虞矣○鬆肌通聖散方見蒙頭證治 歸宗湯方見發熱證治





鱗坐者兩臀之痘聚集如鱗也。因毒火太甚攢聚於至陰之地。若不急治變如反掌如平扁。灰滯者鬆肌通聖散主之。板硬紫

黯者歸宗湯主之。

○鬆肌通聖散育蒙頭證治 ○歸宗湯方見發熱證治



腎囊者乃腎之外候。關要處也。若痘出稠密乃毒聚於斯也。宜用散結湯主之。疎解通暢庶可愈矣。

散結湯 荆芥 羌活 牛旁子炒 升麻 川芎 丹皮 紫花地丁 赤芍 木

通 紫草 青皮 山查 引加蘆筍十株水煎服



抱膝者偏身痘出稀疎。獨兩膝攢簇如餅。此毒氣凝聚於膝。至行漿時恐難下達於足脛也。宜用鬆肌通聖散加牛膝透之功。

效甚速 ○鬆肌通聖散育蒙頭證治



足踝以下屬於脾經。若週身有痘而此地獨無痘者名曰無根。是毒滯於脾也。但足為至陰之地。非建立中州發越脾氣不能下。



達故用快癩越脾湯以發之

快癩越脾湯 黃耆黃耆 桂枝 防風 白芍藥炒 甘草生 引用生姜紅棗水煎服

圖皮蛇



痘出叢簇成片散漫無拘名曰蛇皮見點之初視其隱隱發簇細密無論乃毒火所致以歸宗湯攻其毒甚者以必勝湯攻之

猪尾膏救之○歸宗湯方見發熱證治

必勝湯方見見點證治

猪尾膏方見鎖唇證治

圖種蠶



痘出稠密如蠶佈種者名曰蠶種乃梟毒太重凶逆之甚速用歸宗湯攻之使毒鬆痘起方可望生

圖窩燕



痘出累累聯絡細密不成顆粒故謂之燕窩宜外用燕脂膏貼法內服涼血解毒湯和之○燕脂膏方見蒙眼證治 涼血解毒湯方見結痂落痂證治

圖跡鼠



痘出四五粒或六七粒粘連者名曰鼠跡見一二處者輕見週身者為重速用歸宗湯攻之令相併成泡其毒方解始可望生

歸宗湯 方見發熱證治

疊錢圖



環珠圖



浮萍圖



鬆色轉紅活庶可望生

蟹爪圖



清熱解毒湯 方見點證治

痘已見點平伏不起顆粒不分團團攢聚狀若疊錢者此

毒熱盛也外用燕脂膏貼之內以涼血攻毒飲治之

燕脂膏 方見蒙亂證治 ○涼血攻毒飲 方見點證治

痘名環珠者以出而圍繞形若環珠此毒氣壅滯所致宜早

圖治以清熱解毒湯主之使毒解漿生其患除矣 ○清熱解毒湯 見點證治

浮萍者視之有點按之無形參差不齊色紫黯狀如浮萍也

此乃血淤毒熾非急攻不可速用涼血攻毒飲攻之能使毒

○涼血攻毒飲 方見點證治

蟹爪者痘形連貫顆粒碎密上潤下細如蟹爪之狀急用清

熱解毒湯主之使連貫處起脹根鬆其毒可解矣





境 ○鬆肌通聖散 方見蒙頭證治

蘇沙者痘形扁潤歪斜不圓無頂無盤若蘇沙細小宜先用鬆肌通聖散主之若色紫黯者歸宗湯主之能頂根起鬆始為佳



須內服涼血解毒湯外用銀針刺破流出惡血方保無恙若不急治聽其自破惡汁

痘當起脹時忽有小泡夾痘而出漸漸長成如白果大其則紫毒微則亦皆為之血泡此因毒熱在肺傳於皮膚大小不一



流染痘亦因之赤爛矣治者宜詳記之○涼血解毒湯 方見結痂證治

水泡者形大皮薄內含一包清水蓋因濕淫之氣侵犯脾經故身面俱手足獨毒以四屬脾故也須服加味保元湯外用

銀針刺破以胡荽酒調宮粉塗患處若遲延不治變成癢塌難救矣

加保味元湯 人參 猪苓 澤瀉 白朮 黃耆 赤苓 炙甘草 引生薑水

胡荽酒 胡荽 黃酒 用煎 勿令洩氣候溫調宮粉搽敷破處

肉腫不瘡腫圖



治之更有通身皮膚盡赤此為毒火熾盛煎灼血分宜用歸宗湯

羌活救苦湯 蔓荊子 羌活 牛旁子炒 升麻 黃耆 川芎 連翹 桔梗

白芷 防風 人中黃 引用荷葉水煎服

參歸大補湯 人參 當歸 黃耆 甘草 白芷 川芎 防風 紫草 葯木

香 南山查 厚朴姜炒 桔梗 引用生姜水煎服 ○歸宗湯竟發熱證治

乾枯圖



乾枯○色者血之華也血和則滋潤光瑩血耗則乾燥枯竭
痘之毒火入於血分輕則嫩紅甚則焦紫治以救血為急宜

當歸活血湯主之

當歸活血湯 當歸 川芎 赤芍 生地 紅花 紫草 黃芩 黃連 大黃

水煎服

鋪紅圖



鋪紅○起脹時血盡歸附於痘根有下紅綫緊束乃正形也若元氣虛弱血不歸附毒氣散漫肌膚之上根色紫豔是氣失統攝之力多致不救若氣虛而痘色微赤者以九味神功

散主之毒根盛豔者以涼血解毒湯主之

九味神功散 人參 黃耆 紫草茸 紅花 前胡 牛旁子炒研 甘草生 白芍酒炒

生地黄 引用大棗水煎服○涼血解毒湯方見結痂落痂證治

根窠無暈圖



根窠無暈○痘至成漿時若氣血交會必有一血綫緊附根下如珍珠置於燕脂之上粒粒光彩此正形也設平日氣血

虛弱當灌漿時頂雖圓滿根下全無紅暈以芎歸保元湯主虛甚者以參歸鹿茸湯

芎歸保元湯 人參 甘草炙 黃耆炙 當歸酒洗 川芎 引龍眼肉煎○參歸鹿茸湯方見灌漿證治



皮薄漿嫩



皮薄漿嫩○痘瘡皮薄根不紅待得成膿漿淡清溶溶破爛
不完整氣血虛弱證多凶速服十全大補劑氣血充足始
生○痘瘡賴氣血以成功氣血充實則痘皮蒼老肥滿堅厚
若氣血虛縮痘必光亮軟皺溶溶如濕須用十全大補湯峻補氣血庶毒化漿行可

保安全矣

十全大補湯 大熟地 人參 白朮 當歸 茯苓 白芍 川芎 生甘草

黃耆 肉桂 引用煨姜水煎服

空壳無漿



空壳無漿○痘至行漿時頭面週身外雖脹而內寔無漿名
曰空壳當別虛實治之如根色淡白者此血虛不能化毒成

漿也宜千金內托散根緊而紫者此氣行血滯毒熱伏於血分而不能成漿也宜加

味四物湯○千金內托散有見點證治

加味四物湯 當歸 白芍 生地 川芎 連翹 紫草 水煎服

瘡頂陷塌圖



補中益氣湯

黃耆

當歸

炙甘草

白朮

人參

柴胡

升麻

陳皮

用煨姜煎服

灰陷白陷圖



入雞冠血酒日進二三服

雞冠血酒

○用大雄雞一隻先用白酒一杯炖温次刺雞冠血數點入杯中勻仍

純温調煎內服

紫陷黑陷

○痘出稠密顆粒碎小根緊昏暗頂凹下而紫者謂之紫陷甚而轉為黑

痘頂陷塌○陷頂者由中氣微弱不能振揚故灌時根雖紅

潤頂却微塌現證面白肢冷不思飲食虛煩便溏身體倦

也治宜補氣為主用補中益氣湯則氣足漿生而頂自起矣

灰陷白陷○痘至灌漿時其色淡白根無紅暈而頂陷者是

謂白陷虛極則轉灰陷由氣虛委而不振血虛漿不能充故

一陷而不可遏也治宜大補氣血為主宜參歸鹿茸湯臨服

方見灌漿證治

參歸鹿茸湯

南京中醫藥大學圖書館版權所有

1164

陷則為黑陷皆由火毒鬱閉氣不宣通故也治宜清熱解毒以歸宗湯主之

歸宗湯方見發熱證治

紫陷黑陷圖



板黃圖



清毒活血湯 當歸

板黃○板黃者謂灌膿時漿未得半忽然黃色突起乾燥堅硬蓋因氣毒肆害脾鄉故氣滯血凝難以灌漑也用清毒活血湯主之倘得痘起尚可望生若頭面頸項眼脰唇舌及週身黃者則不治也

查 連翹 人參

白芍 炒 生地黄 紫草 草 酒洗 黃芩 黃連 酒炒 牛蒡子 炒 南山

倒靨圖



載之力也宜加味保元湯主之

倒靨者○漿色清細不足根脚淡白無暈偏體形如痘壳瘡皮皺而似結非結至收靨時終不成痂此因氣血兩虛之領

加味保元湯 人參 黃耆 甘草 全當歸 白芍 木香 白朮 官桂 引

