

四十六卷

婦科式卷

義德堂記

御纂醫宗金鑑卷四十六

編輯婦科心法要訣目錄

胎前諸證門

胎前總括

惡阻總括

惡阻證治

保生湯

加味六君湯

加味溫膽湯

胞阻證治

加味平胃散

延胡四物湯

加味膠艾四物湯

蜜消湯

膠艾四物湯

加味芎歸飲

導赤散

五苓散

子腫子氣子滿脆脚皺脚證治

茯苓導水湯

于煩證治

知母飲

子懸胎上逼心證治

紫蘇飲

子癰證治

羚羊角散

釣藤湯

子嗽證治

枳桔二陳湯

桔梗湯

轉胞證治

舉胎四物湯

阿膠五苓散

子淋證治

加味五淋散

激經胎漏尿血總括

激經胎漏尿血證治

阿膠湯

黃耆湯

銀芎酒

加味四物湯

胎不安小產墮胎總括

胎不安小產墮胎證治

加味聖愈湯

加味佛手散

十聖散

加味芎藭湯

益母丸

墮胎下血不止證治

瘀血不出證治

獨參湯

回生丹

子死腹中證治

佛手散

平胃散

辨子母存亡

胎兼癥瘕

胎不長證治

子瘕證治

子啼腹內鐘鳴證治

黃連煎

藏燥證治


甘麥大棗湯

鬼胎總括

腸覃石瘕證治

香棱丸

胎前母子盛衰



御纂醫宗金鑑卷四十六

編輯婦科心法要訣

胎前諸門

胎前總括

妊娠胎前病惡阻胞阻腫滿氣煩懸痛嗽轉胞與子淋激經胎漏胎不安小產死胎胎不長子瘖臍燥鬼胎連餘病當參雜證治須知刻刻顧胎原

註

此言妊娠胎前有惡阻胞阻子腫子滿子煩子懸子痛子嗽轉胞子淋激經胎漏胎動不安小產墮胎子死腹中胎萎不長子瘖臍燥鬼胎等證皆當一一詳辨熟記其餘胎

前傷寒傷食癰痢霍亂泄瀉當於雜證門中參考治之但須時刻保護胎原不致誤犯爲要也

惡阻總括

惡心嘔吐名惡阻擇食任意過期安重者須藥主胃弱更分胎逆痰熱寒

註

婦人受孕月餘之後時時嘔吐者名曰惡阻若無他病擇食者須隨其意而興之輕者過期自然勿藥而愈重者須以藥治之當以胃弱爲主更審其或因胎氣阻逆或痰飲阻逆與夫兼熱兼寒而分治之

惡阻證治

保生湯

胎氣阻逆惟嘔吐無他兼證保生湯砂朮香附烏陳草量加參枳引生薑。

註

惡阻有因胎氣阻逆者乃受胎後胞門閉塞藏氣內阻挾胎氣上逆於胃故令惡心嘔吐也若平素胃虛所致雖無痰飲寒熱相兼而亦有惡阻證者宜用保生湯卽砂仁白朮香附烏藥陳皮甘草也引用生薑者以止其嘔也若氣弱者量加人參氣實者量加枳殼。

加味六君湯

痰飲惡阻吐痰水煩眩加味六君湯枇杷薤香旋縮枳熱秘蒼

軍寒桂薑

註

惡阻因於痰飲者。其吐必多痰水。且心煩頭目眩暈。必其人平素胃虛中停痰飲也。宜用加味六君湯。於六君湯內加枇杷葉、藿香、旋覆花、縮砂、枳殼。若胃熱便秘。加黃芩、大黃以利之。胃寒喜熱。加肉桂、乾薑以溫之。

六君湯

方見首卷

加味溫膽湯

熱阻惡食喜涼漿。心煩懊悶溫膽湯。橘半茯苓與枳竹。更加芩

連蘆麥藷

惡阻因於胃熱者。必嘔吐心中熱煩懊悶喜飲涼漿也。宜

用加味溫膽湯其方卽陳皮半夏茯苓甘草枳實竹茹名溫膽湯更加黃芩黃連蘆根麥門冬引生薑也

胞阻總括

妊娠腹痛名胞阻須審心腹少腹間傷食心胃胎腰腹少腹胞寒水尿難

註

孕婦腹痛名爲胞阻須審其痛或上在心腹之間者多屬食滯作痛或下在腰腹之間者多屬胎氣不安作痛若在少腹之間者則必因胞血受寒或停水尿難作痛也

胞阻證治

加味平胃散

延胡四物湯

胡胃痛多傷食滯蒼朴陳甘果枳麴便秘加軍倍甘草胎動延
心四物宜

註孕婦心胃作痛者多因傷食停滯宜平胃散卽陳皮厚朴
蒼朮甘草也加草果枳殼神麴以消之若更大便秘結日
久則加消黃以攻之然必倍甘草以緩其峻性庶不傷胎
若腰腹作痛胎動下血則當用四物湯君以延胡以定痛
而保胎也

四物湯方見首卷

加味膠艾四物湯

蜜消湯

腹腰痛甚防胎墮膠艾四物杜酒葱白以定痛而保胎若因外感風寒之邪
秘密消攻

註

胞帶繫於腰凡腹腰痛者須防胎墮宜用膠艾四物湯加
杜仲大豆淋酒葱白以定痛而保胎若因外感風寒之邪
則加羌活獨活以散之若內熱大小便閉者則用蜂蜜芒
消煎湯以攻之經曰有故無損是也

膠艾四物湯

方見首卷

加味芎歸飲

導赤散

五苓散

胞血受寒少腹疼參吳膠艾草歸芎尿澁熱甚導赤散木通生
地甘草靈水盛陽虛五苓效木澤肉桂茯苓

註

少腹作痛者乃胞中之血受寒也宜加味芎歸飲溫之其

方卽人參吳茱萸阿膠蘄艾炙甘草當歸川芎也若因尿

澁而痛則是膀胱水病熱甚則以導赤散清利之其方卽

生地木通甘草也若水盛陽虛不化則以五苓散滲利之

其方卽茯苓白朮澤瀉豬苓肉桂也

子腫子氣子滿脆腳臃腳總括

頭面四肢腫子腫白膝至足子氣名腫脹喘滿日子滿但脚腫