

醫理畧述

上卷

申

1<1



第十章

論血運之經

一論生理

心之功用乃在一定時刻之內逼出多少血流過血運全經當其流過小脈脘微脘之時血遇有外邊大阻力且似爲其擋回至畧大之脈脘而畧大之脈以其衣有韌性時時脹滿其壓回血力亦能相等由是心經間斷之行力其勢變而爲貫串脈血壓力賴有總脈門逼血向前長流無間血流之面獨在脈脘內爲血浪所激此浪乃由心每發新血而起是卽名爲脈者也

心之做工，賴其爲腦肌之經，由養心脈有多血供養，肌質素常

其壓回血力即各壓力皆受
壓時皮有收服即塞住不復迴
行遂區區血而前行矣

歷口低知宜遲不行
歷口高知下房不曉

收縮，乃由心內腦筋結觸之。此腦結有自行之功，其觸發之由，本於心內面之印識。此印識大都是壓力者，或阻力者，至收縮之勢，則與壓力相因，而壓力又半因於心上房之載，半因於在前之阻力也。心之行動，在腦根頭內，有心之腦根中調理之。此處乃腦筋部先受外來印識，而隨由顱長腦筋或由和筋轉發主動感動至心之所。此些腦筋之末，乃與心腦筋結相連也。有印識在顱長腦筋之末，則腦筋結少發腦力，卽禁心縮之謂。在和筋者，則催促之。至若心或脈之度數，亟須知收縮之久耐，所差極微，不論既做之工爲何，或將做之工爲何，心下房需十份四分鐘之時以收縮，心之周行，惟舒展之時，方有久促之異，有

時久則脈之度數慢約五十至有時促則脈數約一百至當心
展之時此腦肌之具歇息受養心下房由心上房并迴脰滿充
之是以脈慢則指明心經歇息充載得好且以此二效心縮之
勢并不見弱大概反爲見強凡由顱長腦筋及和筋之末如是
而感及心經度數之物有兩路而及或由養心脈血及之有如
藥材抑由腦筋中部經腦筋之身而及之也中發之動感及心
之勢者大概亦由此二路而至

腦筋頭內之心腦筋中乃可受印識物質場地之中其寬廣之
處與腦筋部自己一樣在此中所印識如流常注入內蓋由血
脰腹腑皮膚肌肉腦筋中部

主念之所亦在其內肺經其實由各經卽心

亦在內而至者也。從彼那卒成之感動，由顱長腦筋與和筋下及於心，如是則身所冒受之勢，不拘細微，心亦遵服之矣。心腦筋中，又爲血養所感，此凡血之品第，內裏壓力，俱包在內也。在乎傳入心腦筋中，諸印識之中，由心者，乃經顱長腦筋而至也。此內半爲平常知覺之印識，經腦筋頭而入腦迴，雖則素常太微，未能覺出，若猛大則胸前有痛苦，翳墜及心跳矣。

脈脰乃肌質之管，靈活而可撟激，其徑口可以種種之勢，令其更改管之肌，有該處腦機指導，腦機與腦筋中部有動脰，張脰等腦筋爲之通運，且有一中所在腦筋頭內，名爲動脰，腦筋中而兼有其他較下等之腦筋中，在腦子腦脊根內，蓋所以收聚

身上各處之印識，而由動脂腦筋或張脂腦筋看其事之爲何，反感於血脂者也。脈脂之肌衣，時常操動至極，使血脂有所謂張緊之力，是乃原辨血運者之一，卽邊外阻力也。動脂腦筋或腦筋中格外靈活，則阻力更大，血之壓力更高。若張脂者格外靈活，則壓力低矣。二者之勢，行於心處，必互相符合。有血脂特異之所，譬如皮膚小腸包膜等處，俱可以不靠他處，或展或束，至於一處張展，顯然容多血入於其處，而脈脂大總之壓力必低。一處收束，則添該處之阻力，如此統總之壓力，便高起矣。牽動動脂腦筋中諸般印識之內，有心思之情形，臟腑之位勢，及各種外面之熱度知覺也。血虧於其內，與血內之養氣及徑行

於此之藥俱皆足以提觸之此隨後便詳

傳入之印識由心而及動脬腦筋中者於醫者如是之緊要故當另爲詳說當印識因心之過脹或艱辛或頽敗而起由顱長腦筋及於心腦筋中卽轉運於脬腦筋中從該處經張脬腦筋而反感於血脬緣是血脬放鬆脈血壓力心下房須要克勝者乃跌而低心經於是乎更易於罄其所有而獲救治矣如此剋減心內壓力之佈置名爲血運抑壓之機

使血卒佈散於織質者微脬是也其珠質軟衣血水養氣及血輪所由過而入於質者本自具可剌激之性而受許多別樣勢子之指使如腦筋部者其所載之血水者兩端所連接之脈脬

肝動則心動而脈力高

迴脗者與及養育之靈者微脗又爲成邊外阻力之別質焉
迴脗運血歸心乃較不靈活之管大抵受專異腦筋勢子所使
然其體則多由經之之血股所感動也卽前則由心經之情形
後則由脈脗微脗者也如是心展促短卽心力之頻便減去迴
脗罄傾所有之時而令其內壓力高起至若脈血壓力之低血
流過微脗無滯其效亦猶是反於此心與微脗之體又爲迴脗
所迴行假若迴脗展開而滿則血遲返於心上房而心縮之勢
因充載低下亦爲之弱當其時微脗堵塞且血水及變化所發
之質彼此交流於血脗纖維之間亦有所騷擾矣

至今總血壓力一說其義可得而知矣脈脗韌性時常作爲一

壓力大小

血運多少 心行力大

四腦筋

壓力大小

血運多少 心行力大 四腦筋

血運多少 心行力大

血運多少 心行力大

血運多少 心行力大

式而脈血內之壓力無論何刻必須藉乎三者一為血運之血
 總共多少之數二為心之行力三為血流經迴脘之無滯即邊
 外阻力由於脘之收束與微脘之堵塞而致者脈血壓力藉賴
 腎之細粒由運血多少之數自為調理在此機內血之總壓力
 要行於一段無依之細脈所以壓出或洩出血內之水經脘衣
 而入於溺微脘一入一出之細脈以其衣之肌腦質則壓力之
 在腎內微脘圈者可有可無按身之所需而定其效則出水或
 多或少而血壓按之一起一跌矣出汗并其實各樣出液其行
 大概亦同出尿惟不若是之猛而已
 更有一強勢統血運而感者乃肌之活潑也蓋出力則心為之

觸動脈血壓力高起而肌力歇息則心平脈和也

二論藥力

運血之部乃身內供備生理變化及功用迴應各種勢子最觸異事蹟之一其遇事遷就之權并其易於受傷之機乃伏於此且醫者於此又得機會隨意感動心經血脂焉

一 血運內總股之血乃爲原理壓力者之一不拘或增或減其股一變則壓力必改也此固能易於做就一則以蜚吮拔確開迴脂放血一則以過血之法然此二者行於血運之效求其實在不過暫時而已放血之際脈壓固與之俱跌但血運之內由織質與腸臟又多吸入流質是亦速於再起矣過血使血壓

暫時高起，但互相補救之機，不久便復其前時適中之壓也。放血故此爲速去血運全部壓力，并令心肺輕爽，諸法中之最猛者，惟用於長久減低血壓之故，則無用矣。至於過血之速於復起血壓，其不可思擬之妙，亦同此一樣。倘若由於失血，壓力跌至可危，如是便可以免因血運倒敗而至於斃也。

二 心經 甲

內裏腦肌之具，可以或壯或抑，爲首之徑行

壯心者，乃養心脈血運之靈活，由之心有益善血內品質之應，此卽在其養氣血水，如是便反行有天氣食物，兩俱妥宜，消化肝功，并皆壯健之應，徑行壯心之類，有許多藥品亦在其列，如醇酒、毛地黃、海慈士的年、輕淡水、伊打等是也。電氣施於心之

部位其功亦同反感之提壯乃增心經靈活或當竟然停止復醒心經便而力猛之法十一章所論提壯一處腦筋諸般法子俱在此列而以輕淡之撻激第五對腦筋灑淋冷水鞭打行引病出外法於胸前等爲最妙至拔確蜚吮二者由腦筋部亦有壯心之功兼且拔血出外使其輕爽祛風劑能壯心半由徑行半由反應蓋以其印識在胃涕膜而由腦筋中部轉達也內心乃壯心經利害之器如情懷快暢善言撫勉較之多藥或更有益於病者卒之之論凡法之使心展時延耐者卽令心慢必增其力蓋令其有多些時候歇息也

裏面腦肌之具以相反一流之法便可以壓抑或平撫之斯乃

養心脈壓低跌，飲食剋減，瀉劑、表劑、利小水劑等等之效，而亦乃用平全腦、平腦外、平腦中等劑，如鴉片、煖氣，或貼膏藥於胸前，及煖水洗澡，截止一切反應之感動，與乎凡促心展時候，卽增脈之度數，諸法所能致也。終之更有許多徑行抑壓心力之藥，如鴉片、淡輕炭、淡酸、草烏頭、錒、哥羅方、綠養冰、了葛、藜蘆、衣畢格，此外更有多種，俱乃此類也。

心之傳入腦筋，乃將心質所發平常知覺之印識，傳入腦者，以鴉片、綠養冰、顛茄，并顛茄之類，可以抑壓之。卽一冷一熱亦可。乙 心內顛長腦筋之末，可用毛地黃、海慈提壯，而使心之行力，不若是之頻。若投以顛茄、鬧洋花、佛茄兒、亞咪咧、淡養，及許

多之藥服其大劑，則禁機此處爲之抑壓，心之度數便增，此種行於一處之法，其力甚猛也。

丙 心腦筋中，在腦筋頭者，易爲有種藥料所提壯，有如毛地黃、海葱、伊打與醇酒哥羅方之初功，及士的年顛茄，便是，且有好多外邊腦筋之印識，如冷與引症出外法，亦易提壯之也。反於是而論其能以抑壓者，則有施熱氣於外面，如熱水洗身，及有許多藥品，此中之藥，爲哥羅方醇酒之後功，草烏頭、錫鴉片、綠養冰、淡輕炭、淡酸衣、畢格、亞咪咧、淡養、加喇巴豆、謙落，至吾人節制顛長腦筋止禁功力兩極之處，卽節制心之頻數，其權甚爲可貴。蓋令醫者得而牽感心之養育，并心之力，此由於使

心展或久或促，卽心下房歇息之時，或長或短也。如是而論，則凡阻心力者，乃壯心者也；而速心力者，究爲抑心者而已。

關連於此，又須論肌肉之操動，并其歇息，爲或增或減。心經做工，及其養育之靈銳，諸法中之最强而極易施於行者，安臥在床，或免行動，駕乘馬車，行步平地，乃一串逐漸之法，令心安息者也。若境地須增心之活潑，則各種益身操動肌肉之法，用以加工於心，亦同爲可貴焉。

三 脈脰 脈脰內之外邊阻力，引出許多屬乎藥力之勢，但此不過數算出來，學者便當足矣。

用 動脰腦筋中固可徑然提觸，此蓋以醇酒哥羅方之初功。

及用伊打、輕淡水、士的年、毛地黃、海葱等藥，又以鵬激凡身上可及之知覺腦筋等法，如用寒冷及施芥末等等，弔炎劑於腳囊腳板，提觸三岔腦筋，其最速而又最猛之法，乃嗅輕淡水也。論其反面，則此動脬腦筋中，亦可徑行抑壓，蓋以醇酒哥羅方第二站之功，及鴉片、綠養冰、淡輕炭、淡酸、銻、衣畢格、草烏頭、顛茄、顛茄類等藥，以肌力之息，以心思之寧靜平治，以行於一處之安撫品，如止痛藥、煖氣及柔柔搓擦也。

乙 脈脬衣內，限於一處之束脬機，其徑行感壯之類，乃鉛與銀、毛地黃、海葱之初功，了葛與及用冷於一處，此冷由滴水噴伊打成霧，或酒酸及鹽水之升散而致，至酒酸、鹽等水，如火酒

此以令脈脬
不致束而為止
血則

此係合脈者之
同形之上節相合

水醋水輻淡綠水便是此法其名謂之歛血類

同由此一處之機亦可致令血脰開展蓋由於用亞味咧淡養
鎬淡養淡氣甘油醇酒顛茄由敷子熱水敷布所生一處之熱
氣由用飛散油之全隊松節油樟腦卽其式也由用辣油此內
有芥末米紫荏由用性帶鵬激之金類與似金類如鐸銅碘及
人製之炭雜質卽幾阿蘇加播泐酸並其流類是也張一處之
血脈者是亦壯一處之血運者也力不斷之電氣亦能張一處
之血脈焉

四 微脰 因爲外邊阻力之一故是以其情形乃醫者極關
切之事醫者固能開展微脰而增其經流之血蓋由於用煖氣