

醫統正脈全書

四六



儒門事親卷六

金 考城張從政著

風形

因驚風搐一

新寨馬叟年五十九因秋欠稅官杖六十得驚氣成風
搐已三年矣病大發則手足顫掉不能持物食則令人
代哺口目張睽唇舌嚙爛抖擻之狀如線引傀儡每發
市人皆聚觀夜卧發熱衣被盡去遍身燥痒中熱而反
外寒久欲自盡手不能繩傾產求醫至破其家而病益



堅叟之子邑中舊小吏也以父母病訊戴人戴人曰此病甚易治若隆暑時不過一涌再涌奪則愈矣今已秋寒可三之如未更刺膺穴必愈先以通聖散汗之繼服涌劑則痰一二升至晚又下五七行其疾小愈待五日再一涌出痰三四升如雞黃成塊狀如湯熱叟以手顫不能自探妻與代探咽嗑腫傷昏憤如醉約一二時許稍稍省又下數行立覺足輕顫減熱亦不作足亦能步手能巾櫛自持匙筯未至三涌病去如濯病後但覺極寒戴人曰當以食補之久則自退蓋大疾之去衛氣未



復故宜以散風導氣之藥切不可熱劑溫之恐反成他病也

風搐反張二

呂君玉之妻年三十餘病風搐目眩角弓反張數日不食諸醫皆作驚風暗風風癇治之以天南星雄黃天麻烏附用之殊無少効戴人曰諸風掉眩皆屬肝木曲直動搖風之用也陽主動陰主靜由火盛制金金衰不能平木肝木茂而自病先涌風痰二三升次以寒劑下十餘行又以鉋針刺百會穴出血二盃愈



飧泄三

趙明之米穀不消腹作雷鳴自五月至六月不愈諸醫以爲脾受大寒故併與聖散子豆蔻丸雖止一二日藥力盡而復作諸醫不知藥之非反責明之不忘口戴人至而笑曰春傷於風夏必飧泄飧泄者米穀不化而直過下出也又曰米穀不化熱氣在下久風入中中者脾胃也風屬甲乙脾胃屬戊己甲乙能尅戊己腸中有風故鳴經曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄診其兩手脉皆浮數爲病在表也可汗之直斷曰風隨汗



出以火二盆暗置牀之下不令病人見火恐增其熱給之入室使服涌劑以麻黃投之乃閉其戶從外鎖之汗出如洗待一時許開戶滅火一半須更汗止泄亦止

因風鼻塞四

常仲明常於炎暑時風快處披露肌膚以求爽爲風所賊三日鼻塞雖坐於暖處少通終不大解戴人使服通聖散入生薑葱根豆豉同煎三兩服大發汗鼻立通矣

風痰五

常仲明之子自四歲得風痰疾至十五歲轉甚每月發



一兩次發必頭痛痛則擊數百拳出黃綠涎一兩盞方
已比年發益頻目見黑花發作昏不知人三四日方省
諸醫皆用南星半夏化痰之藥終無一効偶遇戴人于
瀝水之南鄉戴人以雙解散發汗次以苦劑吐痰病去
八九續以分劑平調自春至秋如此數次方獲全瘥

癩六

朱葛解家病癩疾求治于戴人戴人辭之待五六月間
可治之時也今春初尙寒未可服藥我已具行裝到宛
丘待五六月製藥朱解家以爲託辭後戴人果以六月

間到朱葛乃具大蒜浮萍等藥使人召解家曰藥已成
矣可來就治解爲他藥所惑竟不至戴人曰向日我非
託也以春寒未可發汗暑月易發汗內經論治癰疾自
目眉毛再生針同發汗也但無藥者用針一汗可抵千
針故高供奉採萍歌曰不居山兮不在岸採我之時七
月半選甚癰風與瘰風些小微風都不算豆淋酒內下
三丸鐵幘頭上也出汗噫文士相輕醫氏相疾文士不
過自損醫氏至於害人其解家之謂與陽夏張主簿病
癰十餘年眉鬚皆落皮膚皴澁如樹皮戴人斷之曰是



有汗者可治之當大發汗其汗出當臭其涎當腥乃置
燠室中徧塞風隙以三聖散吐之汗出周身如卧水中
其汗果粘臭不可聞痰皆腥如魚涎兩足心微有汗次
以舟車丸濬川散大下五七行如此數次乃瘳

手足風裂七

陽夏胡家婦手足風裂其兩目昏漫戴人曰厥陰所至
爲璽又曰鳴條啟坼皆風之用風屬木木鬱者達之達
謂吐也先令涌之繼以調胃承氣湯加當歸瀉之立効

胃脘痛八



一將軍病心痛不可忍戴人曰此非心痛也乃胃脘當心痛也內經曰歲木太過風氣流行民病胃脘當心而痛乃與神祐丸一百餘粒病不減或問曰此胃脘有寒宜溫補將軍素知戴人明了復求藥於戴人戴人復與神祐丸二百餘粒作一服大下六七行立愈矣

搐搦丸

黃如村一叟兩手搐搦狀如拽鋸冬月不能覆被適戴人之舞陽道經黃如不及用藥針其兩手大指後中注穴上戴人曰自肘已上皆無病惟兩手搐搦左氏所謂



風淫末疾者此也或刺後谿手太陽穴也屈小指握紋盡處是穴也

面腫風十

南鄉陳君俞將赴秋試頭項徧腫連一目狀若半壺其脉洪大戴人出視內經面腫者風此風乘陽明經也陽明氣血俱多風腫宜汗乃與通聖散入生薑葱根豆豉同煎一大盞服之微汗次日以草莖鼻中大出血立消

驚風十一

戴人常曰小兒風熱驚搐乃常病也常搦時切戒把捉

手足握持大急必半身不遂也氣血徧勝必痺其一臂
漸成細瘦至老難治當其搐時置一竹簞鋪之涼地使
小兒寢其上待其搐風力行徧經絡茂極自止不至傷
人

風溫十二

陽夏賀義夫病傷寒當三日以裏醫者下之而成結胸
求戴人治之戴人曰本風溫證也不可下又下之太早
故發黃結胸此已有瘀血在胸中欲再下之恐已虛惟
一涌可愈但出血勿驚以茶調瓜蒂散吐之血數升而



衄且噎逆乃以巾捲小鍼而使枕其刃不數日平復

風水十三

張小一初病疥爬搔變而成腫喘不能食戴人斷爲風水水得風而暴腫故遍身皆腫先令浴之乘腠理開發就煖室中用酸苦之劑加全蝎一枚吐之節次用藥末至三錢許出痰約數升汗隨涌出腫去八九分隔一日臨卧向一更來又下神祐丸七十餘粒三次嚥之至夜半動一行又續下水煮桃紅丸六十九丸以麝香湯下又利三四行後二三日再以舟車丸通經散及白朮散以



調之愈

又

曹典吏妻產後憂恚抱氣渾身腫繞陰器皆腫大小便如常其脉浮而大此風水腫也先以蠶水撩其痰以火助之發汗次以舟車丸濬川散瀉數行後四五日方用苦劑涌訖用舟車丸通經散過十餘行又六日舟車濬川復下之末後用水煮桃紅丸四十餘丸不一月如故前後涌者二瀉凡四通約百餘行當時議者以爲倒布袋法耳病再來則必死世俗只見塵中貨藥者用銀粉



巴豆蝎腫者暫去復來必死以爲驚俗豈知此法乃內
經治鬱之立

兼此藥皆小毒其毒之

藥豈有反害者哉但愈後忌慎房室等事况風水不同
從水無復來之理

兒風水十四

鄭之營兵秋家小兒病風水諸醫用銀粉粉霜之藥小
洩反澁飲食不進頭腫如腹四肢皆滿狀若水晶家人
以爲勉強求治于戴人戴人曰此證不與壯年同壯年
病水者或因留飲及房室此小兒纔七歲乃風水證也



宜出汗乃置燠室以屏帳遍遮之不令見火若內火見
外火必昏憤也使大服胃風湯而浴之浴訖以布單重
覆之凡三五重其汗如水腫乃減五分隔一二日乃依
前治之汗出腫減七分乃二汗而全減尙未能食以檳
榔丸調之兒已喜笑如常日矣

腎風十五

桑惠民病風面黑色畏風不敢出爬搔不已眉毛脫落
作癩醫三年一日戴人到棠谿來求治于戴人戴人曰
非癩也乃出素問風論曰腎風之狀多汗惡風脊痛不



能正立其色焔面瘡然浮腫今公之病腎風也宜先刺其面大出血其血當如墨色三刺血變色矣於是下針自額上下銑針直至頤頂皆出血果如墨色徧腫處皆針之惟不針目銳眥外兩旁蓋少陽經此少血多氣也隔日又針之血色乃紫二日外又刺其血色變赤初鍼時痒再刺則額覺痛三刺其痛不可任蓋邪退而然也待二十餘日又輕刺一遍方已每刺必以冰水洗其面血十日黑色退一月面稍赤三月乃紅白但不服除根下熱之藥病再作戴人在東方無能治者

