

春溫痢症三字訣合璧序

黃炎已邈仲景又不復作醫學晦育至唐宋元明而極吾友唐君容川固已辭
而闢之矣唯所著方書淹貫中西或頗深邃以訓醫家不求便俗計唐宋以來
方藥譌謬殺人最甚者莫如春溫秋痢二症是非有淺顯歌括臨時繙檢未易
查治先是有友自蜀中來攜有成都張子培所著春溫三字訣頗愜余心已早
付諸石印獨於痢疾尚未發明諸家論說俱不足恃因懇容川續成一卷合印
濟世孟子云窮則獨善其身達則兼善天下方今時局無勞吾輩杞憂顧此
圭亦名小善竊推仁術冀拯斯民伏願醫家急圖變法病家勿更因循實余所
厚望焉是為序

光緒二十一年歲次乙未夏五月夔門鄧其章謹識

成都張子培先生道咸間名醫以時人往往悞春溫為傷寒履轍相循乃著三字訣刊行問世先生墓生宿學有年矣門人吳士先學博續刻於富順學署光緒壬辰携此書北上二月十九日抵申江適聞資州公車門人李紹西以春溫歿客邸嗟乎紹西少顏子六歲春溫烏足以困之宮午不幸未遇馬當風倘早到浹日紹西無死理亡之命矣夫然出河帶本挽袖海山房印二千卷所到散布商諸業斯術者子培以名諸生精研內經遠紹旁披數十年淵乎有心得書中方藥起死回生已更僕難數所願仁人君子無易視之蒼生幸甚
光緒壬辰上巳

祥符王宮午錢卿氏題於海上客次



春溫三字訣

成都張子培先生著

夔門鄧其章雲航校印

溫為病。雖分類。

後世有風溫濕溫暑溫瘟疫等名。方書更創出大頭疔瘡等瘟名。愈多。治愈亂。予所論者。風溫也。知此則一以貫之矣。

當顧名思其義。

既曰溫。則非寒矣。今醫之不能治此。由於不識其名耳。名且不識。從何施治。仲景書發凡例。

仲景太陽篇一節。為溫病之祖。傷寒論中。特為提出立論者。謂此症與傷寒迥異也。不出方者。謂書本為傷寒而作。論少方少。恐其掛一漏萬也。論多方多。恐其強賓壓主也。

後之醫。仍寒治。

劉河間張子和李東垣朱丹溪辨馬不精。語焉不詳。然猶不敢妄用參朮薑附也。至張景岳薛立齋輩。則妄用矣。仍是治寒法也。



方藥雜死亡繼

後人九味羌活湯。人參敗毒散。逍遙散。香蘇飲等。皆知不敢用麻桂而設。似已窺見一斑。然而仍用辛溫。百治百死。不過較用參芪朮棗者。差緩須臾耳。傷心目三字贅。

仲景本論祇九十二字。字字是溫。字字不是寒。今人以治寒法治溫。百治百死。即有身體強壯。幸而不死者。則有拖延日時。傾破家產。熱邪久留於臟腑。新邪引動於經絡。至他年重感。亦必身死。滔滔皆是。喚醒無從。予目擊心傷。此所以有三字訣之作也。

何謂溫。溫是熱。

既名曰溫。則非寒也。今醫強名此症為寒火。名不正。則言不順。事不成矣。與傷寒殊懸絕。

如此辯明。而仍以寒法治溫病。用桂枝湯。麻黃湯。葛根湯。小柴胡湯。不肯用心。甘願殺人者。吾知其報在子孫矣。行道者宜何如之。兢兢哉。初起時口渴別。

傷寒初起不渴溫病初起即渴以此分別然溫亦間有不渴者但渴者多不渴者少耳

不惡寒惟發熱

仲景云太陽病發熱而渴不惡寒者名曰溫病共十六字予另有註在後

按漢文簡質此症初起多有微惡寒者斷無不發熱者但二三日則今不惡

寒惟發熱矣此症初起間有不口渴者但二三日斷無不渴矣且傷寒多在

手脉大於右手溫病脉多右大於左溫病初起多兩寸脉大右寸尤盛

附子培註仲景原文單行為原文雙行為子註

張子培曰悟溫病者古有劉河間等今有薛生白等然亦未將太陽病溫病

五字分清夫既曰太陽病矣何得發熱云云又曰溫病今特拈出以見狂瞽

者之千慮一得

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒前有明發熱而渴不惟無必惡寒

更加發熱且太陽病初起斷無渴症今發熱而渴不惟無必惡寒

渴如此症者太陽病也吾得確而指其名曰溫冬傷於寒春必病溫之

麻杏湯有神力

用麻黃湯桂枝湯者無論矣。用人參敗毒散逍遙散者亦以五十步笑百步也。亦可無論。即薛一瓢之前胡桑皮鉤藤等。葉天士之桑葉菊花牛蒡等。吳氏祖薛葉二家用銀翹散桑菊飲。可謂此症暗室一燈。然予以謂不如仲景麻杏石甘一方為如神也。故予每用銀翹桑菊二方。皆加生麻絨七八分。或一二錢。功效倍於本方百倍。但此症初起麻黃可用。至二三日後舌變胭脂色。則風盡化熱矣。麻黃斷斷不可用。用必危殆。以麻黃大熱故也。

或銀翹或桑菊

銀翹散為辛涼平劑。桑菊飲為辛涼輕劑。白虎湯為辛涼重劑。吳鞠通法也。要甚。

以辛涼解表劑

或謂傷寒宜解表。溫病忌發汗。夫傷寒解表令出外也。然則溫病忌汗令內入乎。不通之甚。蓋傷寒以辛溫解表。溫病以辛涼解表。解表同而辛溫辛涼大異焉。昧昧者無論矣。乃高明之家亦出此語。甚矣結習之難除也。

誤辛溫變重病

辛溫辛涼乃此症之生死關頭也。時醫畧而不講久矣。

小遷延大殞命。

言誤治之害有如此者。但近日醫家不究見識之非。病家不悟醫人之誤。皆曰生死有命而已。

口大渴津液傷

此症始終以救津液為主。甘寒法也。陳修園謂四逆湯麻黃附子細辛湯等以附子而救津液。雖在傷寒終屬強解。況溫病乎。今人一見溫病。陽極似陰。妄陳氏言。竟用薑附。着眼着眼。

或白虎承氣湯

此症若先以辛涼解表。繼以苦甘化陰等法。無不愈矣。因誤治變重。非二湯力不能勝。

雖熱飲亦屬陽

間有口大渴。而飲熱湯。不肯飲冷。且畏飲冷。更有舌為沸湯起泡者。此陽極



南京中醫藥大學圖書館藏

似陰重症也。時醫一見飲熱。皆謂陰症。妄投桂附。下咽立斃。特為拈出。切忌。

治之法。急下良。

急以三承氣湯選擇用之。或白虎亦有可用者。但此法祇可用在風溫。若別症喜熱。多屬陽虛。本宜薑附。妄用承氣。立斃。慎之。

若譫語。舌紅黃。

此症全憑驗舌。初病多無苔。然舌色必紅。便宜辛涼解之。半表半裡則白。裡則黃。甚則黑色。難治矣。

在包絡。非胃腸。

傷寒譫語。承氣下之。邪在腸胃也。此症邪在包絡也。非一下可解。竟用承氣。誅伐無過也。特為拈出。

用紫雪。清宮湯。

輕症。清宮湯。及清絡湯可愈。若重症則不可恃矣。須得紫雪。

與至寶。及牛黃。



紫雪至寶丹。安宮牛黃丸。三方。芳香解穢。清輕透絡。鎮重安神。寒涼退熱。真此症起死回生神方也。

至病久。氣液損。

傷寒傷陽。故用甘溫。溫病傷陰。宜用甘寒。甘溫甘寒。又此症之生死關頭也。

切記切記。

宜甘寒補而潤。

如復脈湯。去薑桂大棗。竹葉石膏湯。去半夏。甚大入參。甘寒法也。即喻嘉言清燥救肺湯。亦可間用。若氣液傷損。兼大熱譫語。是體已虛。邪仍實之候。最為危症。予每用炙草五六錢。以大補中氣。生地麥冬各一二兩。以滋陰液。大黃芒硝各四五錢及七八錢。以蕩實邪。應手而愈多矣。但症危如此。必憑脈以驗症。脈弦者生。脈濇者死。脈弦為陰氣未盡。脈濇為陰血已竭。所謂陰症見陰脈是也。

即下利。二甲症。

傷寒下利。非白通四逆不能回陽。此症下利。只用龍牡鎮濇存陰而已。不用



溫補也。然此就久下利而言。故用堵塞法。若在病初。身熱口渴。下痢舌黃。胸痞脈數。此溫邪下注大腸之症。所謂協熱而利是也。當用黃芩、葛根、桔梗、豆卷之屬。以升泄溫邪。二症辨之不清。生死立判矣。

變紛更此大概

予所閱歷者。有用大黃七八錢。芒硝四五錢。下至二十餘日而愈者。成都府庠生百善叙州府庠生張正是也。有先用芒硝大黃三五錢。服一劑而病大增。次日衆謂藥誤。予謂病重藥輕。硝黃各加一二倍而愈者。鹽署典史林竹齋華陽監生江曉帆是也。有病已大減而為寒阻遏。下不能通。先用理中微加附子一小劑。以驅其陰。腹痛即止。更用六味湯加大黃。以養陰蕩邪。一劑而愈者。則彭雲峯之長子也。有誤汗誤下。誤用滋膩。誤用苦寒。病至十五六日壯熱不解。予自遠歸。遵喻嘉言先生法。用麻黃附子細辛湯一劑。而熱清去十之八九。後用回陽法。畧帶養陰。施治半年餘而愈者。則予子小培也。按後風溫中百難見者不可輕用凡此者不可勝數。蓋此症變遷極速。極歧。茲不過言其大概。然而會心者。處處與傷寒對看。可即始以見終矣。



北京大學圖書館藏

知寒溫能涵蓋

凡病不外陰陽。知治傷寒能治陰病矣。知治溫熱能治陽病矣。雖有陽極似陰。陰極似陽。陽七陰三。陰七陽三。陰陽錯雜之不同。而理本一貫。認的陰陽。投無不利矣。

一切病迎刃解。

此二病萬病之綱也。綱舉則目張。萬殊可歸於一本。目張由綱舉。一本可發為萬殊。即以此症而推彼。如吳又可所論之瘟疫。是天地之厲氣。刀兵饑饉之餘。人從口鼻而受者。老子所謂大兵之後。必有凶年是也。其症大寒大熱。口渴身痛。脉浮洪而數。全類傷寒風溫。惟初起滿口舌苔白而且厚。或有黃色。甚則黑矣。面如油垢。即是。的症用達原飲如神。且非此無以搗銳而攻堅。彼陳修園吳鞠通舒馳遠輩。竭力訾詆胡為哉。又如疣瘡瘟疫初起。與寒溫同。惟頭面疣瘡。如無名腫毒。然用銀翹桑菊二方。加減亦效。然不如升降散之靈妙敏捷也。又如濕溫初起。與前三症亦同。但舌上有苔而薄。胸膈痞悶。口渴不喜飲水。即飲亦不能多。受為獨異。或四肢骨節麻木酸疼。法宜辛涼淡

滲如滑石木通杏仁半夏及苡仁厚朴竹葉菊花荊芥之屬秋燥初起以肌膚燥燄神氣衰少為獨異。有外感者蘇葉荊芥薄荷玉竹石膏梨皮麥冬負母之屬。無外感者喻氏清燥救肺湯。滋液救焚湯之屬。法宜辛涼清潤。一切外症。可由此正面推。即一切內症。可由此反面推矣。但難為不肯讀書。不肯用心者望也。

〔附方〕

麻杏石甘湯

麻黃 四錢 杏仁 三錢 石膏 八錢 生甘草 二錢

〔張子培按〕分兩必須因病輕重加減。不可竟用古法。

辛涼平劑銀翹散方

連翹 一兩 金銀花 一兩 苦桔梗 六錢 薄荷 六錢 竹葉 四錢

芥穗 四錢 生甘草 五錢 淡豆豉 五錢 牛蒡子 六錢

右杵為散。每服六錢。鮮葦根湯煎。香氣大出。即取服。勿過煮。肺藥取輕清。過煮則味厚。而入中焦矣。病重者約二時一服。日三服。夜一服。輕者



三時一服日二服夜一服病不解者作再服蓋肺位最高藥過重則過病所少用又有病重藥輕之患故從普濟消毒飲時時輕揚法今亦間有平涼法者多不見效蓋病大藥輕之故一不見效遂改絃易轍轉去轉遠即不更張緩延至數日後必成中下焦矣胸膈悶者加藿香三錢鬱金三錢護膈中渴甚者加花粉項腫咽痛者加馬勃元參衄者去芥穗豆豉加白茅根三錢側柏炭三錢梔子炭三錢咳者加杏仁利肺氣二三日病猶在肺熱漸入裡加細生地麥冬保精液再不解或小便短者加知母黃芩梔子之苦寒與麥地之苦寒合化陰氣而治熱淫所勝

張子培曰按此症初起予用此方每加麻黃一二錢功效倍捷但三四日後舌變紅黃則不可用矣

桑菊飲方

杏仁 二錢

連翹 一錢

薄荷 八分

桑葉 二分

苦桔梗 二錢

黃菊花 一錢

甘草 八分

葦根 二錢

水二盃煮取一盃日二服二三日不解氣粗似喘躁在氣分者加石膏

知母。舌絳暮熱邪初入營。加元參二錢。犀角一錢。在血分者去薄荷。葦根。加麥冬。細生地。玉竹。丹皮。各二錢。肺熱甚。加黃芩。渴者加花粉。

白虎湯方

石膏 八錢

知母 三錢

生甘草 錢半

白粳米 四錢

調胃承氣湯方

大黃 四錢

炙甘草 二錢

芒硝 二錢

小承氣湯方

大黃 四錢

厚朴 二錢

枳實 一錢

大承氣湯

大黃 四錢

厚朴 三錢

枳實 三錢

芒硝 三錢

紫雪丹

張子培按局方原有黃金百兩更妙

滑石 一斤

石膏 一斤

寒水石 一斤

磁石 一斤
水煎二斤。搗煎去渣入後藥。

犀角 五兩

沉香 五兩

丁香 一兩

升麻 一斤

元參 一斤

羚羊角 五兩

木香 五兩

炙甘草 半斤

以上八味並搗剉入煎藥汁中煎去渣入後藥。

炙甘草 半斤

以上八味並搗剉入煎藥汁中煎去渣入後藥。

以上八味並搗剉入煎藥汁中煎去渣入後藥。

以上八味並搗剉入煎藥汁中煎去渣入後藥。

以上八味並搗剉入煎藥汁中煎去渣入後藥。

以上八味並搗剉入煎藥汁中煎去渣入後藥。

以上八味並搗剉入煎藥汁中煎去渣入後藥。

以上八味並搗剉入煎藥汁中煎去渣入後藥。

以上八味並搗剉入煎藥汁中煎去渣入後藥。

以上八味並搗剉入煎藥汁中煎去渣入後藥。

以上八味並搗剉入煎藥汁中煎去渣入後藥。

以上八味並搗剉入煎藥汁中煎去渣入後藥。



朴硝 硝石 各二斤提淨。入前藥汁中。微火煎。不住手將柳木攪。候汁欲凝。再加入後二味。

長砂 三兩 研細

麝香 一兩二錢 研細入煎藥拌勻

合成退火氣冷水調服二錢

清宮湯

元參心 三錢

蓮子心 五分

竹葉捲心 三錢

連心麥冬 三錢

連翹心 二錢

犀角尖 二錢 磨沖

加減法。熱痰盛加竹瀝梨汁各五匙。咯痰不清。加括蘆皮一錢五分。熱毒盛加金汁人中黃。漸欲神昏。加銀花三錢。荷葉二錢。石菖蒲一錢。

清絡湯

羚羊角 三錢

川貝母 二錢

連翹 二錢

連心麥冬 四錢

知母 二錢

石斛 二錢

青蒿 二錢

花粉 二錢

至寶丹

犀角 一兩 鎊

硃砂 一兩 飛

琥珀 一兩 研

玳瑁 一兩 鎊

牛黃 五錢

麝香 五錢

以安息重湯燉化。和諸藥為一百丸。蠟護。



安宮牛黃丸

牛黃一兩 鬱金一兩 犀角一兩 黃連一兩 硃砂一兩 梅片五分

麝香五分 真珠五錢 山梔一兩 雄黃一兩 黃芩一兩 金箔衣

右為極細末。鍊老蜜為丸。每丸一錢。金箔為衣。蠟護。虛者人參湯下。脈實者銀荷薄荷湯下。每服一九。兼治飛尸卒厥。五癰中惡。大人小兒。瘧厥之因於熱者。大人病重體實者。日再服。甚至日三服。小兒服半丸。不知。再服半丸。

復脈去姜桂湯

炙甘草六錢 乾生地六錢 生白芍六錢 麥冬五錢 阿膠三錢 大麻仁三錢

竹葉石膏去參半湯

鮮竹葉三十片 石膏八錢 麥冬五錢 炙草二錢 粳米八錢

清燥救肺湯

霜桑葉三錢 石膏二錢 甘草一錢 黑芝麻三錢 人參七分
麥冬一錢半 杏仁一錢 去真阿膠一錢 枇杷葉一錢

痰多加貝母。血枯加生地黃。熱甚加犀角二角。

二甲湯

生牡蠣八錢 生龜甲四錢

再用龜板四錢。名三甲湯。

達原飲

檳榔二錢 厚朴一錢 草薢仁五分 白芍一錢 知母一錢 黃芩一錢 生甘草五分

升降散

白殭蠶二錢 酒炒

蟬蛻一錢

薑黃三錢

生大黃四錢

細末分四服。冷黃酒一盃。蜂蜜五錢冲下。

資液救焚湯

生地黃二錢

去汁

連心麥冬二錢

取汁

生犀角三分

生薑汁二茶匙

真阿膠一錢

炙甘草一錢

麻仁五分

柏子仁七分

人參一錢五分

紫石英一錢

五味子三分

子培按五

滑石一錢

寒水石一錢

打碎不為末

子培按五

子培按新

右除生地麥冬犀角生薑四汁及阿膠共八味。用名山水及水亦可。

四茶盃。緩煎至一茶盃半。去渣入四汁及膠。再緩火畧煎至膠化。斟出。

