

祛寒
利濕

清暑
潤燥

醫方集解

和

陰症
厥逆

中氣為厥布故用理中以和裏而加桂枝以解表不名理中而名桂枝者到底先表之意也大底陽熱為邪則腹滿而咽乾陰寒為邪則腹滿而吐

利本方加黃連茯苓名連理湯治傷濕而作濕若外感盛暑內傷生冷者非此不可

本方加陳皮茯苓名補中湯治泄瀉瀉不已者加附子惡食食不化加砂仁本方加當歸白芍陳皮厚朴川芎入薑煎名溫胃湯治蠶鬱結

脾虛氣凝脹滿上衝飲食不下本方加黃耆白芍陳皮藿香名黃耆湯

海藏亦出理中例法本方加青皮陳皮名治中湯治前症腹滿痞悶兼食積者

四逆湯仲景四逆者四肢厥逆也再治三陰傷寒然三陰通用之太陽

症脉沉亦有此者身痛腹痛下利清穀惡寒不汗四肢厥冷或反不惡寒面赤

煩躁裏寒外熱或乾嘔或咽痛脉沉微細欲絕腹痛自利裏寒也三陰

順身熱脉大者逆內寒故惡寒不渴四肢者諸陽之本寒則血脉凝滯

盛格陽于外也寒留胸中故食不即吐膈有寒飲故逆而乾嘔虛火上炎故咽痛脉沉者寒即伏藏也按少陰脉有沉有緊有數而仲景統以

微細言之蓋沉必重按始得緊數亦在沉細中見不似陽症浮大而緊數也薛慎齋曰人知數為熱不知沉細中見數為寒其真陰寒症脉常有七八至者但按之無力而數耳宜深察之

附子一枝生用乾薑二兩甘草炙二兩冷服面赤者格陽于上也加葱九莖以

通陽喻嘉言曰陽虛之人雖有表症其汗仍出其手足必厥纔用表藥立至亡陽不用表藥外邪不服故用前湯加葱為治腹痛

者真陰不足也加芍藥二兩以斂陰咽痛陰氣上結也加桔梗一兩以

利咽利止脉不出加人參二兩以助陽補氣血嘔吐加生薑三兩以散

逆氣以上皆通脉四逆湯加減法也

此足少陰藥也寒淫于內治以甘熱故以薑附大熱之劑伸發陽氣表

散寒和附子生用亦能發表甘草亦補中散寒之品又以緩薑附之上僭也甘草為君

乾姜為臣附子為使必冷服者寒盛于中熱飲則格拒不納經所謂熱因寒用又

曰治寒以熱而行之是也此許制之大劑也肝腎位遠非大劑不能達仲景云傷寒醫下之續得下利清穀腹

滿身痛者急當救裏宜四逆湯清便自調身痛者急當救表宜桂枝湯
蓋身痛尚屬表症急則先救裏而後解表也厥陰篇曰大汗出熱不去
內拘急四肢痛又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之按厥陰症四肢厥
冷指甲青脉沉疾按之有力者爲陽厥當下之宜大承氣湯如脉沉遲
按之無力者則爲陰厥宜四逆湯更須速灸之凡傳經熱邪則爲陽厥
溺赤而四肢熱直中眞寒謂之陰厥陰縮而四肢冷程郊倩曰世言傳
經爲熱厥直中爲寒厥斯言甚謬三陽之厥多得手失下此爲熱厥少
陰之厥悉屬于寒厥陰之熱厥仲景書僅有傷寒一二日至四五日而
厥者必發熱一條果如傳邪之說則在四五日固得矣論中何云一二
日不知何經之邪而神速若此其曰厥應下之者下其熱非下其厥也
遇發熱則可下遇厥則萬不可下矣准原其故厥陰與少陽一府一藏
少陽在三陽爲盡陽盡則陰生故有寒熱之往來厥陰在三陰爲盡陰
盡則陽接故有寒熱之勝復凡遇此症不必論其來自三陽起自厥陰
只論熱與厥之多少熱多厥少知爲陽厥厥多熱少知爲陰厥熱在後
而不退則陽過勝而陰不能復遂有喉痺便而等症厥在後而不退則
陰過勝而陽不能復遂有除中亡陽等症仲景所以調停二治法須合
陰陽進退之機陽勝宜下小承氣湯中已去芒硝之寒而有厚朴之溫
在厥陰中破陽以行陰陰勝宜溫縱有陽邪一見厥利便宜烏梅丸聚
幸熱之品而加苦寒之佐在厥陰中破陰以行陽雖有上熱如篇首消
渴氣上衝心之症亦不慮其爲扞格也扶陽抑陰之旨微矣又曰烏梅
丸於辛酸入肝藥中微加苦寒納逆上之陽邪而順之使下也名曰安
蛻實是安胃故併主下利見陰陽不相順接而下利之症皆可以此方

陰陽經脈皆從手足指起

動按自汗者或兼風也

括之也經曰凡陰陽不相順接便為厥手足逆冷是也方中行曰三陰三陽之脈俱相接于手足陰主寒陽主熱陽氣內陷不與陰氣相順接則手足厥冷也○附喻嘉言論桂附丸曰藏為陰可勝純陽之藥府為陽必加陰藥一二味制其僭熱經絡之淺又當加和營衛并宣通之藥

本方加白朮大棗名木附湯金匱治風濕相搏身體煩疼及中寒發厥心

痛本方除甘草乾姜附子湯仲景治下後復汗晝躁夜靜不嘔不渴無

表症脈沉微無大熱者晝日煩躁虛陽擾亂外見假熱也夜安靜不嘔

虛之極陽必厥陽虛之極陰必躁姜附直從陰中面陽不當以晝日煩躁而疑之矣又治中寒厥逆眩仆無汗或

自汗淋漓中寒之症身強口噤眩暈無汗或自汗者勝理素虛而陽微也傷寒發熱中寒不發熱以此為異仲景于傷寒則詳之而

中寒未之及何也曰陽動陰靜陰寒既鬱而成熱遂從乎陽傳變不一靡有定方故極推其病不得不詳也不熱者陰邪一定而不移則不變

故不必及外熱煩躁陰盛格陽陰症姜附湯加當歸肉桂八寶和服名

姜附歸桂湯喻嘉言曰服姜附湯後繼服此湯因姜附專主回陽而卒中寒邪先傷營而故加歸桂遂營分之邪始得藥病相當

也再加入參甘草名姜附歸桂參甘湯加姜附喻氏曰服前湯後繼本

方除甘草加葱四莖名曰通湯復陽通脈再加人尿猪胆汁各白通加人尿

猪胆汁湯仲景見後本方加人參二兩名四逆加人參湯仲景治惡寒勝復

利止亡血惡寒脈微復利陽虛陰勝也利止則津液內竭再

六兩名茯苓四逆湯仲景治汗下後病不解而煩躁過汗則亡陽而表虛

陰陽表裏俱虛乃生煩躁故用茯苓人參入心以除煩附子乾姜入腎以解躁本方除乾姜加芍藥三兩名芍

藥甘草附子湯仲景治傷寒發汗不解反惡寒者虛故也汗出表不解而

為過汗陽弱可知汗出為營虛惡寒為衛虛若重補其陰則惡寒愈甚

但回其陽則陰愈切矣故用附子以回陽而加芍藥以斂陰此營衛兩

虛之救法李挺曰汗後亡陽惡寒者表虛也芍藥明于甘草湯下後惡

寒者裏虛也四逆湯具有表邪未盡者必兼發熱柴胡加桂湯又有裏

實熱伏于內陽微于外而惡寒便溏者猶須下之傷本方除附子用甘

草四兩乾姜二兩名甘草乾姜湯仲景治傷寒脈浮自汗小便數心煩微

惡寒脚腫急用桂枝湯誤攻其表得之便厥咽中乾煩躁吐逆與此湯

以復其陽脉浮自汗便數惡寒陽不足也攻表重虛其陽得湯便厥引

隨與芍藥甘草湯益其陰血復其津液若厥愈是溫者更作芍藥湯故症雖勝了少陰而不敢用四逆也

和其陰其脚即伸芍藥甘草各四兩仲景別見和門本方加吳茱萸名茱萸湯

逆湯治厥陰少陰腹痛本方加當歸木通名當歸四逆湯治感寒手足

厥冷脉細欲絕及男婦寒疝臍下冷引腰膝而痛寒傷營血故加當歸木通能通血肝仲景

當歸四逆湯見後本方加茵陳名茵陳四逆湯治陰黃本方加生脉散陳名

回陽返本湯治陰盛格陽本方加官桂良姜半夏名漿水散潔

水瀉冷汗脉微甚者嘔吐此為急病漿水者泄利漿水澄徹清冷也又曰加漿水煎之

當歸四逆湯仲景治厥陰傷寒手足厥寒脉細欲絕成氏曰手足厥寒者

脉細欲絕者陰血內弱脉行不利與此湯復陽生陰

當歸桂枝芍藥細辛三兩通草二兩大棗二十枚仲景

厥陰寒厥

又曰其人素有大寒者加吳茱萸三升酒六升和煮名四逆加吳

茱萸生薑湯

此足厥陰藥也成無已曰脉者血之府也諸血皆屬于心通脉者必先

補心益血蓋先入心當歸之苦以助心血心苦緩急食酸以收之芍藥

之酸以收心氣肝苦急食甘以緩之芍藥自當通草以緩陰血之名

多矣而有因寒因熱之不同此則因風寒中血脉而逆故以當歸細辛

血由之入藥為君通脉散逆必先去血中之邪故以桂枝散太陽血分

之細辛散少陰血分之寒為輔未有營衛不和而脉能通者故以芍

藥甘曰大藥調和營衛通草利九竅通血脉閉節諸藥藉之以破阻帶

而厥寒散矣周揚俊曰四逆湯全從四逆散起見四逆散全從和解表裏

起見當歸四逆全從養血通脉起見不欲入辛熱之味忍劫其陰也蓋

陽症厥熱

四逆散

仲景此和解之寒劑因各四逆散次于此

治傷寒陰陽邪入器逆不溫或欬

下生姜之辛散者

自內達外是矣

或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重

陽邪傳裏熱結于裏故四肢逆而不溫氣逆挾發故欬氣

虛挾飲故悸裏有結熱故小便不利腹中痛下利傷寒邪在三陽則手足必執室大陰則手足溫至少陰則熱邪漸深四肢逆而不溫至厥陰則手足逆冷經曰熱深厥亦深熱微厥亦微與此湯以散傳經之熱

柴胡

散

等分爲末水調飲欬加五味子乾姜

併主利

五味收逆氣乾姜散肺寒肺與大腸相表裏上咳下利治法頗同

悸加桂枝引導陽氣小便不利

加茯苓

甘淡滲泄腹痛加附子

以補虛散寒

泄利下重加薤白

能通大腸以泄氣滯

此是少陰藥也傷寒以陽爲主若陽邪傳裏而成四逆有陰進之象

不敢以藥下之恐傷其陽經曰諸四逆不可下也故用枳實泄瀉

甘草調逆氣柴胡散陽邪藥收元陰用辛苦酸寒之藥以和解之則

陽氣敷布于四肢矣此與少陽之用小柴胡意同有兼症者視加法爲

治陶節菴曰病在一經有用熱藥又用寒藥者如少陰症有用白虎湯四逆散寒藥者有用真武湯四逆湯熱藥者用陷胸狐疑詎能措手不

利水

真武湯

仲景
治少陰傷寒腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者

知寒藥治少陰乃傳經之熱症也熱藥治少陰乃直中之寒藥也昂按仲景傷寒論陽明症熱藥僅一茱萸湯少陽症藥主和解亦有如乾姜者其餘四經用姜附莫挂者不可勝數豈必一一皆直中之邪乎陽明少陽二經並無熱劑豈直中者獨不中此二經乎况仲景書中說傳經者有矣並無直中字面何所據而以寒熱分之故程郊倩以直中寒邪傳經熱邪二說雖古來相傳之語要未可為定論也

有水氣或咳或嘔或小便不利為寒脈沉細欲吐不吐心煩但欲寐五六

陽寐則氣行于陰然必自少陰始故少陰症但欲寐陰氣勝也一有陽

擾則反是矣周揚俊曰但欲寐非能寐也昏昏如夢耳六經中惟少陰

症誰辨少陰屬腎腎病不能制水水飲停為水氣腹痛者寒濕內甚也

四肢沉重疼痛寒濕外甚也小便不利自下利者濕勝而水穀不別也

或咳或嘔皆停飲也

又太陽病發汗汗出不解仍發熱心悸頭眩筋惕肉瞤振振

欲擗地氣虛惡寒汗出過多則心悸汗為心液汗去心虛如魚失水則

內動故頭眩汗多則液少不能榮養筋肉故筋惕惕而跳肉瞤瞤而動

也振振欲擗地者亡陽無奈欲擗地而人也程郊倩曰汗多亡陽夫人

知之然有衛外之陽為周身營衛之主此陽虛遂有汗漏不止惡寒身

痛之症有腫中之陽為上焦心肺之主此陽虛遂有又予冒心及奔豚

腫中

兩乳
中開
腎氣
凌心
則成
奔豚

之症有腎中之陽為下焦真元之主此陽虛遂有發熱眩悸顫振擗地之症有胃中之陽為中焦水穀生化之主此陽虛遂有腹脹滿胃不和而成心下痞之症救誤者須觀脈症知犯何逆以法治之。腎之真陽盛則水皆內附而與腎氣同其收藏矣腎之陽虛不能制水則汎濫為病故上凌心而成眩悸中侮土而致嘔瀉也方名真武蓋取固腎為義

附子一枚 梔三兩 白芍炒 生薑三兩 水寒相搏咳者加五味

子細辛乾 姜五兩 乾姜五兩 散水寒 小便利去茯苓茯苓 下利去芍藥加乾姜

坊藥酸寒 乾姜辛熱 嘔去附子加生姜一倍附子補氣 生薑散逆

此足少陰藥也扶苓白朮補土利水能伐腎邪而療心悸生薑附子同

陽益衛能壯真氣而逐虛寒芍藥酸收能斂陰和營而止腹痛補陽必 兼和陰

不欲偏勝經曰寒淫所勝治以辛熱濕淫所勝佐以酸平真武北方之神一龜一蛇司水火者也腎

命家之此方濟火而利水故名焉程郊倩曰水氣惟太陽與少陰有 之以二經同司火水也然太陽從

表得之膚腠不宣水氣為主府所遏故以小青龍發之少陰由下焦有寒不能制服本水客邪得深人而動其本氣緣胃陽衰而堤防不及也

主府
汗孔

此

改用膏或湯溫中鎮水收攝其陰氣按青龍主太陽表水十壅三太陽裏水真武主少陰裏水喻嘉言曰陽明少陽絕無用附子故惟太陽經有不得不不用之症蓋太陽膀胱為腎之府腎中陽虛陰盛勢必傳出于府以故參見脈微惡寒痛汗惡風心悸頭眩筋惕肉瞤躁擾等症縱有傳經熱邪不得不用姜附以消陰而回陽也昂按觀嘉言此論亦謂傳經執邪難以執泥緣仲景書中本無此說也

本方去生姜加人參二兩名附子湯仲景治少陰病身體痛手足寒骨節

痛脈沉者腎主骨寒淫則痛此一身骨節盡痛乃陽虛陰盛而生內寒所致非外感也若以外感之痛治之則殺人矣故用參附助

陽而勝腎寒加芍藥少陰病得之一二日中和背惡寒者皆為胸中欲陰以為陽之附也

諸陽受氣于胸中轉行于背背為陽腹為陰陽氣不足陰寒內盛則皆為之惡寒若風寒在表而惡寒則一身盡寒矣昂按背為太陽部分然

少陰腎脈亦貫脊與太陽相表裏又皆起比方與腎同位故寒傷少陰而皆惡寒亦其義也又有陰氣不足陽氣乘虛內陷陰中表陽新虛背

微惡寒者經所謂傷寒無太熱口渴心煩皆微惡寒是也白虎加人參湯主之一為陰寒內盛一為陽氣內陷何以明之蓋陰寒為病內無絲

熱則口中和陽氣內陷則銷燥津液口渴古乾而渴也欲辨陰陽寒熱之不同當以口中燥潤詳之一法看小便之清赤清者為寒赤者為熱

也

三平集 卷之四 直易

厥逆

白通加人尿

猪胆汁湯

仲景

治少陰病下利脉微者與白通湯利不止厥

逆無脉

乾嘔而煩服此湯後脉暴出

晷微續者生

腎者胃之關也前陰利水後陰利穀

寒邪客之則不能禁固故不利也與白通湯復陽散寒服後利不止厥

逆無脉乾嘔煩者寒氣太甚其利為格拒陽氣逆亂也服此湯後脉暴出

者正氣因發泄而脫也故死

脉微續者陽氣漸復也故生

葱白

乾姜

附子

一枚

人尿

腹痛者真陰不足也去

葱加芍藥

三兩以飲陰嘔者加生薑三兩以散逆咽痛者加桔梗三兩

以利咽利止脉不出者加人參二兩以助陽

此足少陰藥也葱白之辛以通陽氣姜附之熱以散陰寒此白通湯也

服而不應者乃陰盛格拒乎陽藥不能達乎少陰故加人尿猪胆汁為

引取其與陰同類苦人心而通脉寒補肝而中陰下咽之後冷體既消

熱性便發情且不違而致大益經曰逆而從之從而逆之正者正治反

者反在此之謂也

以熱治寒以寒治熱為正治以熱治熱以寒治寒為反治亦曰從治謂從其性而使之也按厥有陰陽二

症陰厥者身涼不渴脉遲細而微陽厥者身熱極而反厥雖厥而煩渴譫妄身復時溫而脉數也若陽厥極深至于身冷脉微欲絕為熱極而將死矣急以大承氣下之則厥俞所謂寒藥反能生脉而今身拔也若以熱藥助其陽則陰氣暴絕陽亦絕而死矣若陰已先絕而陽亦將絕于此時而後下之則陰陽俱竭而亦死矣

附慈熨灸法治陰毒手足逆冷腹痛暴絕服白通湯或四逆湯後

用慈熨一大握以繩纏束切去兩頭留白寸許以火炙熱安臍上先將臍

輦分填臍中次放慈餅用熨斗盛火熨令熱氣從臍入腹痛甚者連

熨三餅身溫有汗即瘥否則不治或用艾灸關元氣海臍下一寸五分各名氣海

寸為丹田三寸名關元各三三十壯內外協攻務令一時之內陰散陽回得汗而

罕慈能通中艾性溫熱廣能開或曰用醋醋拌麩皮炒熟袋盛熨此

前法尤捷

白通湯和入承者四十湯

卷

吐利
寒厥

吳茱萸湯

治陽明症食穀欲嘔若得湯反劇者則屬上焦

食穀欲嘔胃寒也得

湯反劇則為少陰症吐利手足厥冷煩躁欲死

可則耗陽利則損陰厥

者陰寒氣甚煩躁者

陽氣內爭

厥陰症乾嘔吐涎頭痛

厥陰之脈挾胃乾嘔吐沫裏寒內格也厥陰之脈上顛頭痛寒氣上逆也○按三陽

皆有頭痛太陰少陰二經之脈不上循頭故無頭痛惟厥陰與腎脈會

于顛亦有頭痛然風溫在少陰濕溫在太陰而頭反痛是又不可拘拘

者李東垣曰太陰頭痛必有痰也少陰頭痛足寒而氣逆也蓋太陰少

陰二經雖不上頭然痰與氣逆壅于膈中頭上氣不得暢而為痛也

吳茱萸湯

一升公參三兩大棗十二枚

生薑六兩

此足厥陰少陰陽明藥也治陽明食穀欲嘔者吳茱萸湯之辛以溫胃

散寒下氣人參大棗之甘以緩脾益氣和中喻嘉言曰此明嘔有太陽

亦若陽明若食穀而嘔者屬胃寒與太陽之惡寒嘔逆原為熱症者不

同

火熱上衝而嘔恐誤以寒藥治寒嘔也若服吳茱萸湯反劇者則仍屬太陽

熱邪而非胃寒明矣

宜葛根加半夏湯小柴胡湯黃芩湯

若少陰症吐利厥逆事

煩躁欲死腎中之陰氣上逆將成危候腎中陰盛上格故用吳茱萸散寒

下逆人參姜棗助陽補土使陰寒不得上千溫經而兼溫中也吳茱萸

為厥陰本藥故又治肝氣上逆嘔涎頭痛

本方加附子名吳茱萸加附子湯治寒疝腰痛牽引睾丸脉沉遲

中寒
腹痛

大建中湯金匱

治心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒氣上衝皮起出見

有頭足上下痛而不可觸近者

陽受氣于胸中陽虛則陰邪得以中之陰寒之氣逆而上衝橫格于中故見

高起痛嘔不可觸近之症。心為陽寒為陰寒乘于心冷熱相激故痛寒乘于脾脾冷弱不消水穀心脾為子母之藏為邪所乘故痛而嘔復

不能飲

食也

蜀椒

二合乾姜四兩人參二兩

煎去滓內飴糖一升微煎溫服

此是太陰陽明藥也蜀椒辛熱入肺散寒入脾煖胃入腎命補火乾姜

辛熱通心助陽逐冷散逆人參甘溫大補脾肺之氣飴糖甘能補土緩

可和中益人之一身以中氣為主用辛辣甘熱之藥溫健其中藏以大

棗下焦之陰而復其上焦之湯也昂按俗云諸痛無補法此症至下

糖大補之藥將以付景為信歟

陰虛損

十四味建中湯 治氣血不足虛損勞瘵短氣嗜臥欲成勞瘵及陰痿發

斑寒斑寒 氣虛或因過服涼藥遂成陰症寒伏于下逼其無根失守之

火上衝薰肺而發斑點其色淡紅隱隱見于肌表與陽症發斑色紫赤

者不同脾胃氣虛虛若服寒藥立見危殆吳鶴皋曰以參耆佳附而治

斑法之變者也醫不達權安足語此

黃耆蜜炙 人參 白朮土炒 茯苓 甘草蜜炙 半夏姜製 當歸酒洗 白芍酒炒 熟地

川芎 麥冬 肉蓯蓉 附子 肉桂 加姜棗煎

此是三陰陽明氣血藥也黃耆益衛壯氣補中首藥四君補陽所以益

氣參耆 四物補陰所以養血芍歸

陰陽調和則血氣各安其位矣半夏