

三十

第四四三册

博物彙編

藝術典  
醫部

三十一  
(卷)

上門下、瘧病、效驗、喉、目、耳、鼻、口、舌、頭、項、腰、背、四肢、

姜仲



南京中医药大学图书馆版权所有

古今圖書集成

中華書局影印



胃中之氣有餘必且久變爲熱人以爲我能食冷乃氣之有餘也我能消食乃脾之健旺也我不能不畏天此腎之有餘也誰知胃氣之有餘本之腎水之不足一遇風寒變之夏暑犯之非變爲消渴之證必成爲瘡廢之人必須平日用大劑六味地黃丸吞服自然氣餒而火息胃平而熱除也無如世人不信自號日強不肯多服又托言我不能吞丸藥下咽則吐不聽仁人之語因循不服及至大病則曰快與我用竹葉石膏湯晚矣今立一湯方用熟地五錢麥冬元參山茱萸山藥各三錢丹皮北五味各一錢天花粉八分水煎服此方乃平胃火之聖藥妙在補腎補肺補肝全不純去平胃中州安泰豈有阻滯抑鬱之理自然輒輸有路搬運無虞上不凌鑠肺金下不侵脾土旁不關害肝木一方之中衆美備臻又何患胃火之上騰哉至於胃火既旺或丸藥原有艱難之道世人不知予并發明之蓋人之胃雖是胃土主事其實必得腎水上滋則水道有路糧食搬運而無阻隔之處今胃火既盛水僅可自救於腎宮又安能上升於咽喉口舌之間丸丸藥又是硬物原非易得下咽此所以不肯服非天性不能服也如反胃之病食入反出非明驗歟無腎水之人無食以下喉猶然吐出蓋腎中無腎水以潤故耳彼無腎水之潤者無怪乎到口難嚥也

肝木之盛抑之之法必須和解然和解之中而不用肝木之法則火愈甚木愈旺矣方用白芍五錢炒梔子一錢當歸一錢白芥柴胡甘草荆芥澤瀉各一錢

水煎服此方用柴荆以散肝木之氣更妙用白芍梔子以清肝木之火火去而木衰此善於抑之者也腎中之水有火則安無火則泛倘人過於入房則水去而火亦去久之水虛而火亦虛水無可藏之地則必上泛而爲痰矣治之法欲抑水之下降必先使火之下溫法當仍以補水之中而用大熱之藥使水足以制火而火足以生水則水火有相得之美也方用熟地三兩山茱萸茯苓各一兩北五味子一錢牛膝肉桂各三錢水煎服一劑而痰即下行二劑而痰消除無跡矣蓋肉桂乃補腎中火之聖藥倘止用之以溫命門水亦可以下降然而不補其腎宮之本則腎宮匱乏水歸而房舍空虛難以存活仍然上泛故必用補水以補火也方中熟地山萸純是補水之藥而牛膝又是引下之絕品水有火之溫又有水之養又有引導之使然而無泛上之理也

火治者治火之有餘也火證甚多惟陽明一經最難治知治陽明之法則五臟之火各勝之火無難專治矣陽明本胃土也如何有火此火乃生於心包心包之火乃相火也君火失權則心包欺之以自逞其炎赫之勢是必以辛涼大寒之品大劑投之恣其快飲斯火得寒而少息熱得涼而略停然必添入健胃之藥始可奏功蓋胃火之沸騰終由於腎氣之不足去胃火必須補胃土然而徒補胃土而不去水濕之痰亦不得也方用石膏一兩或二兩或三兩看火勢之盛衰用石膏之多寡人參知母各三錢麥冬五錢甘草一錢糯米一合竹葉百片水煎服方則人參竹葉

石膏湯也胃火之盛非此湯不能平還問其人必大渴飲水見其有汗如雨者始可放膽用之否則不可輕用蓋無汗而渴亦有似此證者不可不辨也此方純是降胃火之藥所以急救先天之腎水也此證一日不治卽熬乾腎水而致不救故不得已用此霸道之藥也倘無汗而渴明是腎火有餘而腎水不足又烏可復用石膏湯以重傷其腎水平然則又當何方以治之用熟地三兩山茱萸麥冬各二兩北五味子一錢元參一兩此方乃治似白虎證而非胃火之熱者人更宜知之也其餘心火用黃連肝火用梔子肺火用黃芩前言悉之矣茲不再贅陽明之火雖起於心包實成於肝木之冠之也肝木旺則木中有火不特木來冠土而轉來助焰肝木之火半是雷火一發則震地轟天陽明得心包之火而沸騰又借肝木龍雷之火以震動如何可以止遏故輕則大渴重則發狂也予治此證往往白芍加至數兩先用石膏湯以去火隨加白芍以生木平而火無以助焰自然胃火孤立無援又加麥冬以平肺金之氣則金有水潤不必取給於胃土而胃土可以自救况又有石膏知母之降火哉此狂之所以定而熱之所以除也方用石膏麥冬各一兩知母半夏各三錢甘草一錢竹葉一百片糯米一合先煎湯四椀又加白芍二兩同煎此方之妙不在石膏知母之降胃火妙在白芍之平肝火也又妙在麥冬以清肺金使金中有水胃火難矣且去制肝無令冠土也

一方治各經之火梔子丹皮元參各三錢白芍五錢

甘草一錢水煎服心火加黃連一錢肺火加黃芩一  
錢胃火加石膏三錢腎火加知母黃藥各一錢大腸

火加地榆一錢小腸火加麥冬天冬各三錢膀胱火

加澤瀉三錢何以獨治肝經也蓋肝屬木木易生火

故治火者首治肝肝火一散而諸經之火俱散所以

加一味去火之藥即可去各經之火也

命門之火宜補不宜瀉

命門爲十二官之主內經已詳言之余再取而尚論

者蓋命門之經雖彰而命門之旨尚晦也命門既爲

十二經之主而所主者何主也人非火不能生活有

此火而後十二經始得其生化之機命門者先天之

火也此火無形而居於水之中天下有形之火水之

所尅無形之火水之所生火尅於水者有形之水也

火生於水者無形之水也然而無形之火偏能生無

形之水故火不藏於火而轉藏於水也命門之火陽

火也一陽陷於二陰之間者也人先生命門而後生

心其可專重夫心平心得命門而神明有主始可以

應物肝得命門而謀慮膽得命門而決斷胃得命門

腸得命門而傳導小腸得命門而布化腎得命門而

作強三焦得命門而決瀆膀胱得命門而收藏無不

借命門之火以溫養之也此火宜補而不宜瀉宜於

水中以補火尤宜於火中以補水使火生於水而還

以藏於水也倘日用寒涼以伐之則命門之火微又

何能生養十二經耶此內經所謂王不明則十二官

危非重言命門歟

方

導赤散

治小腸火熱

生地黃 木通 甘草各等分

右同爲末每服三錢水一盞入竹葉七片同煎至

五分食後溫服一本用黃芩不用甘草

安神丸

治心肺火熱驚悸

麥冬焙 馬牙硝 白茯苓 山藥 寒水石研

甘草各半兩 硫砂一兩研 龍腦一字研

右爲細末煉蜜爲丸如雞頭實大每服半丸沙糖

水化下無時

千金地黃丸

本事

治心熱

黃連四兩爲末 生地黃半斤研取汁連查拌黃連

末和勻曬乾用

右再爲細末煉蜜丸桐子大門冬湯下三十九

門冬丸

治心經有熱

麥門冬去心一兩 黃連半兩

右爲細末煉蜜丸如桐子大食後熟水下三十九

清心丸

海藏方

治熱

黃連清膈丸

東垣

右或薄荷湯亦得

治心肺間有熱及經中熱

麥門冬去心一兩 黃連去蘆五錢 黃芩三錢

右爲細末煉蜜丸如菜豆大每服三十九溫水送

下無時

硃砂涼膈丸

治上焦虛熱肺脘咽膈有氣如烟搶上

黃連 山梔子各一兩 人參 茯苓各五錢

硃砂三錢另研 腦麝五分另研

右爲細末煉蜜丸如梧子大硃砂爲衣熟水送下

五七九日進三服食後

瀉黃散

氏

治脾經火熱

藿香七錢 山梔一兩 石膏半兩 甘草二兩

防風四兩

右剉同蜜酒微炒香爲細末每服一錢水一盞煎

清汁飲

調胃承氣湯

仲景

大黃去皮酒浸四兩 甘草炙二錢 芒硝半升

右三味咬咀以水三升煮取一升去滓內芒硝更

上火微煮令沸少少溫服

回金丸

溪丹

一名左金丸伐肝經火亦審虛實用之

黃連六兩 吳茱萸一兩

佐金丸

佐肺金以伐肝木之邪

片芩六兩 吳茱萸湯洗三次一兩

右爲末粥丸如桐子大每服二十五九白木陳皮  
煎湯下

四順清涼飲子

一名清涼散治前證

大黃蒸 甘草炙

當歸酒洗 茯苓各等分

右咬咀每服五錢用水一盞半薄荷十葉同煎至

七分去滓溫服

桔梗湯海藏

桔梗 連翹 山梔子 薄荷 黃芩 甘草各等

右爲粗末竹葉白水煎溫服汗之熟服春倍加防

風羌活夏倍加黃芩知母季夏淫雨倍加羌活秋

加桂五錢冬加桂一兩亦可以意消息隨證加減

而用之

人參鴻肺湯東垣

治肺經積熱上喘欬嗽曾膈張滿痰多大便澀

人參 黃芩 桔梗炒 薄荷 甘草

連翹 杏仁去皮尖 桑皮 大黃 桔梗各等分

爲末每服七錢水一盞煎八分食後通口服

龍腦飲子和劑下同

治蘆積邪熱咽喉腫痛眼赤口瘡心煩鼻衄上中

二焦藥也

藿香葉二兩四錢 石膏四兩 甘草蜜炙六兩

梔子微炒十二兩 砂仁 苦棗仁各三兩  
右爲末每服二錢至三錢新汲水入蜜調下

龍腦鴉蘇丸

治上焦熱除煩解勞去肺熱咳衄血熱驚悸脾胃  
熱口乾吐血肝膽熱竝出口苦腎熱神志不定上  
而酒毒膈熱消渴下而血滯五淋血崩等疾

薄荷一斤 麥門冬去心一兩 甘草一兩

黃芪 新蒲黃炒

生地六兩另末 黃連一兩

阿膠炒 人參各二兩 木通 銀柴胡各二兩剉

同木通沸湯浸一日夜絞取汁

右爲細末好蜜二斤先煎一兩沸然後下生地黃

末不住手攪時加木通柴胡汁慢火熬膏勿令火

急膏成然後加前藥末和丸如豌豆大每服二十

丸白湯下一方無黃連

虛勞虛煩梔子湯下

肺熱黃芩湯下

心熱悸動恍惚人參湯下

肝熱防風湯下

腎熱黃藥湯下並食後臨臥服

洗心散

治心肺積熱壅上攻頭目昏痛肩背拘急肢節

便赤澀大便祕滯

甘草 大黃各六兩

右爲細末每服二錢水一盞入生薑薄荷少許同

煎至七分溫服

鴻心湯氏

黃連一兩去鬚

治實火

利膈散

右爲極細末每服一字至半錢一錢臨臥溫水調  
下海藏云易老單方鴻心湯出於此此乃實邪也  
實則瀉其子

升陽散火湯東垣

治男子婦人四肢發熱肌熱筋痙瘺熱骨髓中熱盛

困熱如療捫之烙手此病多因血虛而得之或因

虛過食冷物抑遏陽氣於脾土久鬱則發之

生甘草二錢 防風二錢五分 炙甘草三錢

獨活 白芍 羌活 人參各五錢 柴胡八錢

右咬咀每服秤半兩水三大盞煎至一盞去粗稍

熱服忌寒涼之物及冷水月餘

地骨皮散

治渾身壯熱脈長而滑陽毒火熾發渴

地骨皮 茯苓各半兩 柴胡 黃芩 生地

知母各一兩 石膏二兩 羌活 麻黃各七錢半

右咬咀每服一兩入薑煎有汗去羌活麻黃

天門冬散

治肺壅脣熱鼻乾大便祕滯

天門冬去心 桑皮 升麻 大黃 枳殼炒

水二盞煎八分食後溫服

半夏湯

治膽熱精神不守熱泄

半夏麴 黃芩 軍薑炮 遠志去心 茯苓

生地黃 酸棗仁微炒研各八分 粳米一合

長流水二盞煎八分食後溫服

治脾肺火熱虛煩上壅咽喉生瘡

鴉蘇葉 荆芥穗 防風 桔梗 甘草 人參

牛蒡子各一兩

右爲末每服二錢不拘時沸湯點服咽痛口瘡甚

加僵蠶一兩

地黃煎

治積熱

地黃汁四升三合 茯神 知母 蔡蕤各四兩

苦蔞根 生薑汁 鮮地骨皮 生麥門冬汁

白蜜各二升 石膏八兩 竹瀝三合

右㕮咀以水一斗零二升先煮諸藥取汁三升去

查下竹瀝地黃冬汁緩火煎四五沸下蜜薑汁

微火煎至出六升初服四合日三服夜一服加至

五七合四五月作散服之

三黃丸煎

治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤腫

頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩躁飲食不

美下焦有熱小便赤澀大便祕結五臟俱熱即生

癰瘍瘡瘻

黃連 黃芩 大黃各十兩

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服三十九食後熟

水吞下視臟腑虛實加減小兒積熱亦宜服一方

用腦麝爲衣丸如豆大夜間噙化一二丸亦好

白虎湯仲景

知母六兩 石膏一斤碎 甘草二兩 糜米六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日

三服

大黃散河間

治上焦熱而煩不能睡臥

山梔仁 大黃 麥金各半兩 甘草一錢半

右爲末每服五錢水煎溫服微利則已

柴胡升麻湯東垣

生甘草 炙甘草各二錢 柴胡 升麻 葛根

羌活 獨活 人參 白芍各半兩 防風二錢半

右㕮咀每服半兩水三大盞煎至一盞去滓稍熱

服忌冷物冰水月餘

火鬱湯

升麻 葛根 白芍 柴胡根各一兩 炙甘草

防風各五錢

右咀咬每服三四錢水二大盞入連鬚葱白三寸

煎去滓稍熱服

本事方

治大人小兒五臟積熱煩躁多渴脣裂喉閉目赤

鼻頭結硬口舌生瘡

山梔仁 甘草 赤芍藥各一兩 大黃 破硝

連翹 薄荷葉 乾葛各二兩

右爲散每服二錢水一盞半竹葉七片蜜三匙同

煎至七分去滓食後服

紫雪和劑

療時氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂易叫走

瘡疫毒癟卒死溫瘡五尸五疰心腹諸疾病刺切

痛及解諸熱藥毒邪熱卒黃等并解蠭毒鬼魅野

道熱毒又治小兒驚癇百病

黃金一百兩 石膏 寒水石 磁石 滑石

已上四味各三斤搗碎水一斛煮至四斗去滓入下項

犀角屑

羚羊角屑 青木香搗碎 沉香搗碎各

五兩 元參洗焙搗碎 升麻各一斤 甘草剝炒

八兩 丁香一兩搗碎

已上八味入前藥汁中再煮取一斗五升去滓入

下項

硝石四升如闢芒硝亦得每升重七兩七錢半

砂硝精者十斤

已上二味入前藥汁中微火上煎柳木笪攪不住

手候有七升投在木盆中半日欲凝入下項

麝香當門子一兩一錢半研 珠砂飛研三兩

已上二味入前藥中攪調令勻塞之二日右件藥

成霜雪紫色每服一錢或一錢用冷水調下大人

小兒以意加減食後服

神芎丸河間

一名顯仁丸治一切火熱

大黃 黃芩各二兩 牵牛 滑石各四兩

右爲細末滴水爲丸如小豆大溫水下十九每服

加十九以利爲度日三服冷水下亦得或煉蜜丸

愈佳

當歸龍膽湯

治腎水陰虛風熱蘿蔔時發驚悸筋惕搐搦神志

不寧榮衛壅滯頭目昏眩肌肉瞞胷痞瘡寒咽

嗌不利腸胃燥澀小便澀閼筋脈拘急肢體痿弱

暗風癲病

當歸焙 龍膽草 大梔子 黃連 黃藥

黃芩各一兩 大黃 蘆薈 青黛各半兩

木香一分 麝香半錢別研

右爲末煉蜜和丸如小豆大小兒如麻子大生薑湯下每服二十九忌發熱諸物兼服防風通聖散

鴻心湯

治風熱壅盛

大黃 當歸 白芍藥 荆芥穗 麻黃去節

甘草各一錢半 白朮三錢半

右作一服水二鍾生薑三片薄荷少許煎至一鍾

去滓不拘時溫服

八正散

治火熱壅盛小便祕塞

大黃 瞿麥 薏苡 車前子 木通 山梔子

生甘草各一錢 滑石二錢

右作一服水二鍾燈心二十莖煎至一鍾不拘時

溫服加木香一錢尤佳

芍藥葉皮丸

治火盛

芍藥 黃藥 丹皮各一兩 當歸 黃連各半兩

右爲末滴水爲丸如梧桐子大每服三十九新水下食前

大金花丸

治火熱壅盛

黃連 黃藥 黃芩 大黃各等分

右爲末滴水爲丸如梧桐子大每服三十九新水下加梔子減大黃名梔子金花丸

治心經蓄熱夏至則甚  
黃連二兩 木通一兩半  
右爲末用生薑汁煮糊爲丸如梧桐子大每服二十九食後用燈心湯下日三服

碧雪

治一切積熱咽喉口舌生瘡心中煩躁致咽閉壅塞及天行時熱發強昏憒  
芒硝 破硝 硝石 馬牙硝 青黛 石膏  
寒水石水研飛 甘草各等分

右將甘草煎湯二升去滓即入諸藥再煎用柳木棍不住手攪令消鑿得所却入青黛和勻傾入砂盆內候冷結凝成霜研爲細末每用少許噙化津嚥不拘時候如覺喉壅閉塞不能吞物者即以小竹筒吹藥入喉中即愈

妙功藏用丸

右將甘草煎湯二升去滓即入諸藥再煎用柳木棍不住手攪令消鑿得所却入青黛和勻傾入砂盆內候冷結凝成霜研爲細末每用少許噙化津嚥不拘時候如覺喉壅閉塞不能吞物者即以小竹筒吹藥入喉中即愈

水二鍾煎七分食遠服  
如肺熱而煩者加麥冬二錢  
心熱而躁者加元參二錢  
脾熱而饑者加芍藥二錢  
腎熱骨蒸多汗者加地骨皮一錢  
血熱妄動者加生地二三錢  
陰虛不寧者加女貞子二錢上實下虛者加牛膝一錢  
一錢以導之

右歸飲

此益火之劑也凡命門之陽衰陰勝者宜此方加減以主之治陰勝格陽真寒假熱等證宜加澤瀉二錢煎成用涼水浸冷服之尤妙

熟地如前用法 山藥炒 山茱萸各一錢 枸杞

杜仲 薑製各二錢 火甘草 肉桂各一二錢

製附子二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服

左歸丸

治真陰腎水不足眼花耳聾口燥咽乾津液枯涸

熟地八兩 山藥炒 枸杞 山萸 蔴絲子製

鹿角膠敲碎炒珠 龜板膠敲碎炒珠各四兩

牛膝酒洗蒸熟三兩勿用熟滑者

右先將熟地蒸爛杵膏加煉蜜九桐子大每食前

用滾湯或淡鹽湯送下百餘丸

如真陰失守虛火炎上者宜用純陰至靜之劑於

本方去枸杞鹿膠加女貞子麥冬各二兩

如火篋肺金乾枯多嗽者加百合三兩

熟地二三錢或至一二兩 炙甘草一錢 山藥  
枸杞各二錢 茯苓錢半 山萸一二錢畏酸者勿用

此壯水之劑也凡命門之陰衰陽勝者宜此方加減主之

本方去枸杞鹿膠加女貞子麥冬各二兩  
如火篋肺金乾枯多嗽者加百合三兩

如夜熱骨蒸加地骨皮三兩

一陰煎

此治水虧火虛之劑故曰一陰凡腎水真陰虛損

而脈證多陽火發熱及陰虛動血等證

甘草一錢 熟地三五錢 生地 芍藥 麥冬  
丹參各二錢 牛膝一錢半

水二鍾煎七分食遠溫服

如火盛煩躁者加真龜膠二三錢化服

如汗多煩躁者加五味子十粒

如見微火者加女貞子一二錢

如虛火上浮或吐血或衄血不止者加澤瀉一二  
錢茜根一錢或加川續斷以溫之亦妙

加減一陰煎

治證如前而火之甚者宜用此方

生地 芍藥 麥冬各二錢 熟地三五錢

炙甘草五七分 知母 地骨皮各一錢

水二鍾煎服

如煩躁甚便結者加石膏二三錢

如小水熱澀者加梔子一二錢

如火浮於上者加澤瀉一二錢或黃芩一錢  
抽薪飲

治諸凡火熾盛而不宜補者

黃芩 石斛 木通 梔子炒 黃藥各一二錢

水一鍾半煎七分食遠溫服內熱甚者冷服更佳

枳殼 澤瀉各錢半 細甘草三分

水一鍾半煎七分食遠溫服內熱甚者冷服更佳

熱在血分大小腸者加槐蕊黃連以清之  
熱在血分大小腸者加槐蕊黃連以清之

熱在陽明頭面或煩躁便實者加生石膏以降之

熱在下焦小水痛澀者加草龍膽車前以利之

滋之

熱在腸胃便結者加大黃芒硝以通之

徙薪飲

治三焦火一切內熱漸覺而未甚者先宜清以此

劑其甚者宜抽薪飲

陳皮八分 黃芩二錢 麥冬 芍藥 黃藥

茯苓 丹皮各一錢半

水一鍾半煎七分食遠溫服

清膈煎

治療因火動氣壅喘滿內熱煩渴等證

陳皮錢半 貝母敲破二三錢 膽星一二錢

海石 木通各二錢 白芥子五七分

水一鍾半煎七分溫服

如火盛痰不降者加童便一小鍾

如熱及下焦小水不利者加梔子一錢半

如熱在上焦頭面紅赤煩渴喜冷者加生石膏二  
三錢

如痰火上壅而小便不利者加澤瀉一二錢

如痰火閉結大便不通而兼脹滿者加大黃數錢  
或朴硝一二錢酌宜用之

玉女煎

治水虧火盛六脈浮洪滑大少陰不足陽明有餘

煩熱乾渴頭痛牙疼失血等證如神若大便溏泄  
者乃非所宜

牛膝各錢半 麥冬二錢

水一鍾半煎七分或冷服

生石膏三五錢 熟地三五錢或一兩 知母  
牛膝各錢半 麥冬二錢

水一鍾半煎七分或冷服

如火之極盛者加梔子地骨皮之屬亦可

安胃飲

治胃火上衝呃逆不止

陳皮 山楂 麥芽 木通 澤瀉 黃芩 石斛

水一鍾半煎七分食遠服脈滑者加石膏

太清飲

治胃火煩熱發瘻嘔吐等證可與白虎湯出入酌

用

知母 石斛 木通各錢半 生石膏五七錢

水一鍾半煎七分溫服或冷服或加麥門冬

蕤豆飲

凡熱毒勞熱諸火極熱不能退者用此最妙

蕤豆不拘多寡寬湯煮糜爛

右入鹽少許或蜜亦可待冰冷或厚或稀或湯任

意飲食之日或三四次不拘此物性非苦寒不傷

脾胃且善於解毒除煩大利小水乃淺易中之最

佳最捷者也若火盛口乾不宜厚味但略羹半熟

清湯冷飲之尤善除煩清火

玉泉煎

一名一六甘露飲治陽明內熱煩渴頭痛二便祕

結溫疫斑黃及熱喘喘嗽等證功倍益元散

生石膏六兩 粉甘草一兩

右爲極細末每服一二三錢新汲水或熱湯或人

參湯調下加硃砂三錢亦妙

雪梨漿

解煩熱除陰火此生津止渴之妙劑也

雪梨用清香甘美而大者削去皮

別用大椀盛清冷甘泉將梨薄切浸於水中少頃

水必甘美但頻飲其水不食其楂退陰火極速也

滋陰八味丸

治陰虛火盛下焦濕熱等證若變丸爲湯即名滋

陰八味煎

熟地八兩蒸搗 山藥 山萸肉各四兩 丹皮

茯苓 黃蘖鹽水炒 知母鹽水炒 澤瀉各三兩

右加煉蜜搗丸梧桐子大或空心或午前用滾白

水或淡鹽湯送下百餘丸

化肝煎

治怒氣傷肝因而氣逆動火致爲煩熱脅痛脹滿

動血等證

土貝母二三錢 青皮 陳皮 芍藥各二錢

丹皮 桑子炒 澤瀉各錢半

水鍾半煎八分食遠溫服火盛加黃芩一二錢

清化飲

治血熱妄行陰虧諸火不清等證

芍藥 麥冬各二錢 丹皮 茯苓 黃芩

生地各二三錢 石斛一錢

木一錢半煎七分食遠溫服

如覺骨蒸多汗者加地骨皮一錢半

熱甚而渴或頭痛者加石膏一二三錢

下熱便濕者加木通一二錢或黃蘖梔子皆可隨證治之

單方

虛熱作渴桃膠如彈丸大含之佳

外同

大熱心悶槐子燒末酒服方寸匕

煩躁熱渴久不止葛根半兩水煎服

養老

老人風熱內熱目赤頭痛視不見物石膏三兩竹葉五十片沙糖一兩粳米三合水三大盞煎石膏竹葉

去查取二盞煮粥入糖食

聖惠

風熱攻手指赤腫癰木甚則攻肩背兩膝遇暑熱則

大便祕牛蒡子三兩新豆豉炒羌活各一兩爲末每

服二錢白湯下

本事

膈上煩熱多渴宜利九斂滑石二兩搗水三大盞煎

二盞去查入粳米煮粥

聖惠

乳石發動煩熱躁渴滑石粉半兩水一盞絞白汁頻

服方

三焦積熱元參黃連大黃各一兩爲末煉蜜丸梧子

大每服三四十九白湯下小兒丸藥米大

丹溪

肝熱病者左頰先赤心熱病者顏先赤脾熱病者鼻

先赤肺熱病者右頰先赤腎熱病者頤先赤病雖未

發見赤色者刺之名曰治未病熱病從部所起者至

期而已其刺之反者二周而已重逆則死諸當汗者

至其所勝日汗大出也

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶善

嘔頭痛面赤無汗王癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死

刺手少陰太陽 脾熱病者先頭重煩心顏青欲嘔身熱熱爭則

氣逆則甲乙死刺足太陰陽明  
肺熱病者先浙然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱爭則喘欬痛走脣膺背不得太息頭痛不堪汗出而澹然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少陰太陽而出如大豆立已

寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明

腎熱病者先腰痛筋痙攣苦渴數飲身熱熱爭則項痛而強筋寒且凌足下熱不欲言其逆則項痛員貞澹

澹然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少陰太陽諸汗者至其所勝日汗出也

肝熱病者左頰先赤心熱病者顏先赤脾熱病者鼻

先赤肺熱病者右頰先赤腎熱病者頤先赤病雖未

發見赤色者刺之名曰治未病熱病從部所起者至

期而已其刺之反者二周而已重逆則死諸當汗者

至其所勝日汗大出也

諸治熱病以飲之寒水乃刺之必寒衣之居止寒處

熱病始於臂痛者刺手陽明太陰而汗出止

熱病始於頭首者刺項太陽而汗出止

熱病始於足胫者刺足陽明太陽而汗出止

熱病身先重骨痛耳聾好瞑刺足少陰病甚爲五十

熱病始於臂痛者刺手陽明太陰而汗出止

熱病先眩冒而熱脣脣滿刺足少陰少陽

太陽之脈色榮顧骨熱病也榮未交日今且得汗待

時而已與厥陰脈爭見者死期不過三日其熱內連

腎少陽之脈色也

少陽之脈色榮煩前熱病也榮未交曰今且得汗待時而已與少陰脈爭見者死期不過三日

熱病氣穴三椎下間主胃中熱四椎下間主鬲中熱五椎下間主肝熱六椎下間主脾熱七椎下間主腎熱

榮在骶也項上三椎陷者中也

頸下逆顧爲大瘕下牙車爲腹滿顧後爲脅痛頸上者鬲上也

古今醫統曰兩手大熱爲骨厥如在火中灸涌泉穴五壯立愈

保生祕要曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火常呵以洩其火吸以和其心諸心切勿食穢氣觸我靈夏至夜半後地氣一陰生大熱勿食冷受寒霍亂侵更忌房中事元炁離命門大抵甚暑天善於養心則無秋患時當飲六一燈心湯豆蔻香薷水飽醉勿頂風前慎此則無患矣

手足火燒患處推散想水洗之

導引

儒門事親曰一叟年六十值徭役煩擾而暴發狂口鼻覺如蟲行兩手爬搔數年不已戴人診其兩手脈皆洪大如絃繩斷之曰口爲飛門胃爲竇門曰口者胃之上源也鼻者足陽明經起於鼻交頰之中旁約太陽下循鼻柱交人中環唇下交承漿故其病如是夫徭役煩擾便爲火化火乘陽明經故發狂故經言肝主謀膽主決徭役迫遠則財不能支則肝屢謀而瞻屢不能決屈無所伸怒無所泄心火燄燔遂乘陽明經然胃本屬土而肝屬木膽爲相火火隨木氣而入胃故暴發狂乃命置燠室中涌而汗出如此三次內經曰木鬱則達之火鬱則發之是也又以調胃承氣湯半斤用水五升煎半沸分作三服大下二十行血水與瘀水相雜而下數升取之乃康以通聖散調其後矣

麻先生妻當七月間病臟腑滑泄以去濕降火之藥治之稍愈後腹脹及乳痛狀如吹乳頭重壯熱面如渥丹寒熱往來嗌乾嘔逆脅脅痛不能轉側耳鳴食不可下又復渴余欲瀉其火臟腑已滑數日矣欲以溫劑止利又禁上焦已熱實不得其法使人就諸葛寺禮請戴人未至因檢劉河間方惟益元散正對此證能降火解表止渴利小溲定利安神以青黛薄荷末調二升置之枕右使作數次服之夜半遍身冰水更服涼劑戴人曰惡寒則愈矣其母懼其大寒戴人罵曰汝親也吾用藥如鼓之應桴尚惡涼藥宜涼痛減嘔定痢止及戴人至余告之已解戴人曰益元固宜此是少陽證也能使人寒熱偏劇他經縱有

醫案

寒熱亦不至甚既熱而有癲不欲再下何不以黃連解毒湯服之乃令診脈戴人曰娘子痛來心常欲動哭爲快否婦曰實欲如此余亦不知所謂戴人曰少陽相火凌燥肺金受屈制無所投告肺主悲但欲當歸芍藥以解毒湯中數味服之大瘥矣

李民範日常亦至戊子年火運君火司天其年病目者往往暴盲運火炎烈故也民範是年目大發遂遇

戴人以瓜蒂散涌之赤立消不數日又大發其病之來也先以左目內眥亦發牽睛狀如鋪麻左之右次銑背發亦左之右亦貫瞳子再涌之又退凡五次交亦五次皆涌又刺其手中出血及頭上鼻中皆出血上下中外皆奪方能戰退然不敢觀書及見日張云當候秋涼再攻則愈火方旺而在皮膚雖攻其裏無益秋涼則熱漸入裏方可擒也惟宜暗處閉目以養其神水暗與靜爲水明與動爲火所以不宜見日也蓋民範因初愈後曾冒暑出門故痛連發不愈如此涌泄之後不可常攻使服鼠黏子以退翳戴人之女子自出妻之後日漸羸瘦語如聳中出此病在中也常恐第三指失笑此心火也約半載日飲病中也常恐第三指失笑此心火也約半載日飲

冰雪更服涼劑戴人曰惡寒則愈矣其母懼其大寒戴人罵曰汝親也吾用藥如鼓之應桴尚惡涼藥宜涼痛減嘔定痢止及戴人至余告之已解戴人曰益元固宜此是少陽證也能使人寒熱偏劇他經縱有

則反兼木化也病在上宜涌之先以茶調散涌而去其七分夜用舟車丸濬川散下五七行比旦而臭斷嗚呼人有病口臭而終其老者世訛以爲肺系偏而與胃相通故臭此妄論也

薛氏醫按曰余素性愛坐觀書久則倦怠必服補中益氣加麥冬五味酒炒黑黃藥少許方覺精神清妥

否則夜間少寐足內酸熱若再良久不寐腿內亦然且兼腿內筋似有抽縮意致兩腿左右頻移展轉不安必至倦極方寐此勞傷元氣陰火乘虛下注丁酉

五十一歲齒縫中有如物塞作脹不安甚則口舌如瘡然日晡益甚若睡良久或服前藥始安至辛丑時五十有五晝間齒縫中作脹服補中益氣一劑夜間得寐至壬寅有內艱之變日間雖服前藥夜間齒縫亦脹每至午前諸齒并肢體方得稍健午後仍脹

觀此可知血氣日衰治法不同大尹祝支山因怒頭運時或寒熱日晡熱甚此肝火筋鬱氣虛頭運用八珍加柴胡山梔牡丹皮二十餘

劑而愈職坊王用之喘嗽作渴面赤鼻乾余以爲脾肺有熱用二陳加芩連山梔桔梗麥門而愈

尚寶劉毅齋怒則太陽作痛用小柴胡加茯苓山梔以清肝火更用六味丸以生腎水後不再發

大司馬許函谷在南銀台時因勞發熱小便自遺或時不利余作肝火陰挺不能約制午前用補中益氣加山藥黃蘆知母午後服地黃丸月餘諸證悉退

寓意草曰吳添官得腹痛之病徹夜叫喊不絕小水全無以茱連湯加元胡索投之始安又因傷食復反

病至二十餘日肌肉瘦削眼胞下陷纔得略寧適遭家難證變壯熱目紅腮腫全似外感有餘之候余知其爲激動真火上焚令服六味地黃加知藥三十餘劑其火始退退後遍身瘡痍黃腫腹中急欲得食不能少耐片頃整日哭煩余爲勉慰其母曰旬日後腹稍充氣稍固卽不哭煩矣服二冬膏而全瘳此極難辯治之證竟得相保不失快哉





其人振振身瞶劇必有伏飲

夫病人飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脈雙弦者寒也皆大下後苦虛脈偏弦者飲也

肺飲不弦但苦喘短氣

支飲亦喘而不能臥加短氣其脈平也

病痰飲者當以溫藥和之

心下有痰飲胃脅支滿目眩苓桂木甘湯主之

大短氣有微飲當從小便去之苓桂木甘湯主之腎

氣丸亦主之

病者脈伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此

爲留飲欲去故也甘遂半夏湯主之

脈浮而細滑傷飲

脈弦數有寒飲冬夏難治

脈沉而弦者懸飲內痛

病懸飲者十棗湯主之

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面赤黑其脈沉緊得之數十日醫吐下之不愈术防己湯主之虛者卽

愈者二日復發復與不愈者宜术防己湯去石膏加茯苓芒硝湯主之

心下有支飲其人苦目眩澤瀉湯主之

支飲胃滿者厚朴大黃湯主之

支飲不得息葶苈大棗瀉肺湯主之

嘔家本渴渴者爲欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之

腹滿口舌乾燥此腸間有水氣己椒苈黃圓主之  
卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之

假令瘦人腑下有悸吐涎沫而癲眩此水也五苓散

歲宜十棗湯

久欬數歲其脈弱者可治實大數者死其脈虛者必

苦冒其人本有支飲在胃中故也治屬飲家

先嘔却渴者此爲欲解先渴却嘔者爲水停心下此

屬飲家嘔家本渴今反不渴者以心下有支飲故也

勞榮衛氣不周故也冬自瘥

十棗湯治病懸飲者若下後不可與也凡上氣汗出

而飲者此爲飲也

小青龍湯病溢飲者當發其汗范汪用大青龍湯

宋朱肱活人書

此屬支飲

胡桃不可多食令人動瘓飲

唐孫思邈千金方

寒即爲虛先熱卽爲實故水在於心其人心下堅築

築短氣惡水而不欲飲水在於肺其人少氣身體盡重水在於肝脾支滿

水在於脾其人少氣身體盡重水在於肝脾支滿

而痛水在於腎心下悸

夫病人卒飲水多必暴喘凡食少飲多水停心下甚

者則悸微者短氣脈雙弦者寒也皆大下後苦虛耳

脈偏弦者飲也肺飲不弦但苦喘短氣支飲亦喘而

不能眠加短氣其脈平也畱飲形不發作無熱脈微

煩滿不能食脈沉滑者畱飲病有畱飲者脅下痛引缺盆嗽轉甚其人欬而不得臥引項上痛欬者如

小兒癰癧狀夫胃中有畱飲其人短氣而渴四肢歷節痛其脈沉者有畱飲者也心下有畱飲其人背寒冷大如手病人冒息上引此皆有溢飲在胃中者缺盆滿馬刀腫有劇時此爲氣飲所致也膈上之病

滿喘欬吐發則寒熱背痛惡寒目泣自出其人振振

身瞶劇必有伏飲病人一臂不隨時復轉移至一臂

其脈沉細此非風也必有飲在上焦其脈虛者爲微

勞榮衛氣不周故也冬自瘥

中脘有痰亦令人增寒發熱惡風自汗胃膈痞塞有

類傷寒但頭不痛項不強爲異耳余常見濕痰鬱於

項背或麻或強脈浮滑但不浮緊耳

宋朱肱活人書

中脘有痰亦令人增寒發熱惡風自汗胃膈痞塞有

類傷寒但頭不痛項不強爲異耳余常見濕痰鬱於

項背或麻或強脈浮滑但不浮緊耳

宋朱肱活人書

中脘有痰亦令人增寒發熱惡風自汗胃膈痞塞有

類傷寒但頭不痛項不強爲異耳余常見濕痰鬱於

項背或麻或強脈浮滑但不浮緊耳

宋朱肱活人書

中脘有痰亦令人增寒發熱惡風自汗胃膈痞塞有

類傷寒但頭不痛項不強爲異耳余常見濕痰鬱於

項背或麻或強脈浮滑但不浮緊耳

宋朱肱活人書

汗下之錯爲病不淺矣不若順氣爲先分導次之氣順則津液流通痰飲運下自小便中出有病喜吐痰唾服八味丸而作效者亦有意焉王叔和云腎寒多腫蓋腎爲水之官腎能攝水腎氣溫和則水液運下腎氣虛寒則邪水溢上其間用山茱萸山藥輩取其福附于肉桂取其溫茯苓澤瀉取其利理亦當矣臨病之際又加詳審焉

金匱完素六書

積飲

積飲畱飲積蓄而不散也水得燥則消散得濕則不消以爲積飲也土濕主否故也

酒性大熱而引飲令冷與熱凝於胃中不散而成濕故痰作矣甚者宜吐之吐後服五苓甘露勝濕去痰

元張從政儒門事親

飲當去水溫補轉劇論

畱飲止證也不過蓄水而已王氏脈經中派之爲四瘦飲懸飲支飲溢飲千金方又派之爲五皆觀病之

形狀而定名也今予皆不論此論飲之所得其來有

五有憤鬱而得之者有困乏而得之者有思慮而得

之者有痛飲而得之者有熱時傷冷而得之者飲證

雖多無出於此夫憤鬱而不得伸則肝氣乘脾脾氣不化故爲畱飲肝主慮久慮而不決則飲氣不行脾

主思久思而已則脾結故亦爲畱飲人因勞役遠

來乘困飲水脾胃力衰因而嗜臥不能布散於脈亦

爲畱飲人飲酒過多腸胃已滿又復增之脬經不及滲泄久久如斯亦爲畱飲因陰暑津液焦涸喜飲寒

水本欲止渴乘快過多逸而不動亦爲畱飲人若病飲者豈能出此五者之外乎夫水者陰物也但積水則生濕停酒則生燥久則成痰在左脅者同肥氣在右脅者同息貢上入肺則多嗽下入大腸則爲瀉入腎則爲涌水灌灌如囊裹漿上下無所故在太陽則爲支飲皆由氣逆而得之故濕在上者目黃面浮在下者股膝腫厥在中者支滿痞隔痰逆在陽不去者久則化氣在陰不去者久則成形今之用方者例言

飲爲寒積皆用溫熱之劑以補之燥之夫寒飲在中反以熱藥從上投之爲寒所拒水濕未除反增心火火既不降水反下注其上焦枯其下寒慄內經曰出

入廢則神機化滅升降息則氣立孤危詎不信夫况乎畱飲下無補法氣方隔塞補則轉增豈知內經所謂畱者攻之何後人不師古之甚也且以白朮參苓飲者服之尚加閉塞况燔艾火其瘡可知前人處

下攻終同燥熱雖亦有寒藥相參力孤無援故今代劉河間依仲景十棗湯製三花神祐丸而加大黃牽牛新得之疾下三十九氣流飲去昔有病此者數十年不愈予診之左手脈三部皆微而小右手脈三部皆滑而大微小爲寒滑大爲燥余以瓜蒂散湧其寒痰數升汗出如沃次以導水禹功去腸胃中燥垢亦數升其人半愈然後以淡劑流其餘蘊以降火之

劑開其胃口不踰月而痊夫黃連黃藥可以清上燥凡人病痰證有五一曰風痰二曰熱痰三曰濕痰四曰酒痰五曰食痰諸痰在於膈上使頭目不能清利涕唾稠黏或欬吐喘滿或時發潮熱可用獨聖散吐之次服加減飲子或搜風丸涼膈散間

足病

凡人病痰發者其證蓋有五焉一曰風痰二曰熱痰三曰濕痰四曰酒痰五曰沫痰諸痰在於膈上使頭目不能清利涕唾稠黏或欬吐喘滿或時發潮熱可用獨聖散吐之次服加減飲子或搜風丸涼膈散間

足病

凡人病痰發者其證蓋有五焉一曰風痰二曰熱痰

三曰濕痰四曰酒痰五曰沫痰諸痰在於膈上使頭

目不能清利涕唾稠黏或欬吐喘滿或時發潮熱可

用獨聖散吐之次服加減飲子或搜風丸涼膈散間

而服之內經曰所謂流潤潤燥之義也

凡人病痰證有五一曰風痰二曰熱痰三曰濕痰四

時慎不可補也大邪新去恐反增其氣轉甚於未治之時也昔河內有人病飲醫者斷爲脾濕以木香牽牛二味散之下十餘行因給病人復變散爲丸又下十餘行復變丸爲散又十餘行病者大困睡幾一晝夜既覺腸胃寬闊惟思粥食少許日漸愈雖同斷爲濕但補瀉不同其差至此內經曰歲土太過用瀉物水行腎水受邪甚則飲發中滿太陽司天濕氣瀉物水飲內蓄中滿不食註云此年太陰在泉濕盜於地病之原始地氣生焉少陰司土濕土爲四之氣民病孰齷飲發又土鬱之發民病飲發注下附腫身重又太陰所至爲積陰否隔又太陰所至稽滿又太陰之勝與太陰之復皆云飲發於中以此考之土主濕化不主寒水主寒化不主濕天多陰雨地有積潦皆以爲水在內經屬土冰霜凝沴風氣淒凜此水之化也故曰丑未太陰濕土辰戌太陽寒水二化本自不同其病亦異夫濕土太過則飲發於中今人以爲脾土不足則軒岐千古之書可從乎不可從乎

凡人病痰發者其證蓋有五焉一曰風痰二曰熱痰三曰濕痰四曰酒痰五曰沫痰諸痰在於膈上使頭目不能清利涕唾稠黏或欬吐喘滿或時發潮熱可用獨聖散吐之次服加減飲子或搜風丸涼膈散間

足病

凡人病痰證有五一曰風痰二曰熱痰三曰濕痰四

五曰酒痰五曰沫痰諸痰在於膈上使頭目不能清利涕唾稠黏或欬吐喘滿或時發潮熱可用獨聖散吐之次服加減飲子或搜風丸涼膈散間

足病

凡人病痰發者其證蓋有五焉一曰風痰二曰熱痰

三曰濕痰四曰酒痰五曰沫痰諸痰在於膈上使頭

目不能清利涕唾稠黏或欬吐喘滿或時發潮熱可

用獨聖散吐之次服加減飲子或搜風丸涼膈散間

足病

凡人病痰證有五一曰風痰二曰熱痰三曰濕痰四

五曰酒痰五曰沫痰諸痰在於膈上使頭目不能清利涕唾稠黏或欬吐喘滿或時發潮熱可用獨聖散吐之次服加減飲子或搜風丸涼膈散間

足病

凡人病痰發者其證蓋有五焉一曰風痰二曰熱痰

三曰濕痰四曰酒痰五曰沫痰諸痰在於膈上使頭

目不能清利涕唾稠黏或欬吐喘滿或時發潮熱可

用獨聖散吐之次服加減飲子或搜風丸涼膈散間

足病

凡人病痰證有五一曰風痰二曰熱痰三曰濕痰四

五曰酒痰五曰沫痰諸痰在於膈上使頭目不能清利涕唾稠黏或欬吐喘滿或時發潮熱可用獨聖散吐之次服加減飲子或搜風丸涼膈散間

足病

凡人病痰發者其證蓋有五焉一曰風痰二曰熱痰

三曰濕痰四曰酒痰五曰沫痰諸痰在於膈上使頭

目不能清利涕唾稠黏或欬吐喘滿或時發潮熱可用獨聖散吐之次服加減飲子或搜風丸涼膈散間

足病

證而治之可服消風去熱導濕化痰如通聖加半夏

導氣之劑豈不妙哉如新暴風痰者形寒飲冷熱痰者火盛制金濕痰亦有酒痰者解毒三聖丸主之五者食痰可用漢防己丸丹砂選而用之若依法服之決除濕丹無憂散亦有酒痰者停飲不散可服加減連翹飲子有神效

## 吐法

瘧在胷膈之上大滿大實非吐安能得出仲景曰大法春宜吐蓋春時陽氣在上人氣與邪氣亦在上故宜吐也涌吐之藥或丸或散中病即止不必盡刺過則傷人然則四時有急吐者不必直待春時也但仲景言其大法耳今人不得此法遂廢而不行試以名方所記者略數之如仲景傷寒論中以葱白豆豉湯吐頭痛梔子厚朴湯吐懊惱瓜蒂散吐傷寒六七日因下後腹滿無汗而喘者本事方稀涎散吐膈實中滿痰嗽失音牙關緊閉如喪神守萬全方以鬱金散吐頭痛梔子厚朴湯吐懊惱瓜蒂散吐傷寒六七日開不省人事以皂角散吐涎潮總錄方以常山吐瘧孫尚方以三聖散吐狂神驗方吐舌不正內經曰高者越之王冰曰上盛不已奪而吐之仲景曰宿食在上院者當吐之又如宿飲酒積在上院者亦當吐之又曰病人手足厥冷兩手脈乍結以客氣在胷中心下滿而煩欲食不能食者知病在胷中當吐之予今用吐法皆是仲景方中瓜蒂散吐傷寒頭痛用葱白豆豉湯以吐雜病頭痛或單瓜蒂散名獨聖加茶末少許以吐痰飲加全蠍稍以吐兩脅肋刺痛灌灌有聲者內經所謂濕在上者以苦吐之其是之謂歟今

人亦有用吐者然或中或否或涌而不能出或出而不能止豈知上涌之法名曰療痰擦之一字自有擒縱卷舒近有醫工吐一婦人半月不止涎至數斗命

懸須臾倉惶失計求予解之予煎麝香湯下咽立止

或問麝香何以止吐予謂之曰瓜苗聞麝卽死今吐

藥瓜蒂所以立解也如藜蘆吐不止者解以葱白湯

石藥吐不止者解以甘草貫衆湯惟草木吐者解以

麝香考之本草吐藥之苦寒者有豆豉瓜蒂茶葉梔子黃連苦參大黃辛苦而寒者有鬱金常山藜蘆甘

苦而寒有地黃汁苦而溫者有木香遠志厚朴辛苦而溫者有薄荷芫花辛而溫者有穀精草葱根鬚辛

而寒者有輕粉辛甘而溫者有烏頭附子尖酸而寒者有晉礬綠礬糞汁酸而平者有銅綠甘酸而平者

有赤小豆酸而溫者有飯漿酸辛而寒者有膽礬瓜蒂有小毒藜蘆芫花輕粉烏頭尖有毒外二十六味

皆吐藥之無毒者各對證擇而用之此法宜先少服

不涌漸次加之余之療痰者以叙股鷄翎探引不出

以蓋汁投之投之不出再探之且投且探無不出者

吐至昏眩頭痛者飲以冰水立解如無冰水新汲水

亦可飲壯者一吐而安弱者可三四次吐之庶無損

也有吐之次日頓快者有轉甚者蓋吐之傷而未平

也俟數日再當涌之如覺渴者新水瓜梨及涼物皆

不食惟禁食飽厚餌乾脯難化之物心火既降中脘

沖和陰道必强大禁房勞大憂大怒謹守禁忌不信

浮言真知病證決可吐者然後吐之庶萬全也  
朱震亨心法

## 痰病

脈浮當吐久得脈濶卒難開也必費調理大凡治療

用利藥過多致脾氣虛則痰易生而多

濕痰用蒼术白朮熱痰用青黛黃連黃芩食療用神

鞠麥芽山楂風痰用南星老痰用海石半夏苦姜香附五倍子作丸服痰在膈上必用吐法瀉亦不能去

風痰多見奇證濕痰多見倦怠軟弱若氣實痰熱結

在上者吐難得出痰清者屬寒二陳湯之類膠固稠

濁者必用吐熱痰挾風外證為多熱者清之食積者

必用攻之兼氣虛者用補氣藥送下痰因火盛逆上

者以攻火為先白朮黃芩軟石膏之類

內傷挾痰必用參芪白朮之屬多用薑汁傳送或加

半夏虛甚加竹瀝中氣不足加參木

痰之為物隨氣升降無處不到脾虛者宜補脾氣清

中氣以運痰降下二陳湯加白朮之類兼用升麻提

起

中焦有痰與食積而生病者胃氣亦賴所養卒不可便攻若攻之盡則虛矣

痰成塊或吐喀不出兼氣鬱者氣溫痰熱者皆難治

痰在腸胃間者可下而愈在經絡中非吐不可吐法

中就有發散之義焉

假如癆病因驚而得驚則神出舍空則痰生也血

氣入在舍而拒其神不能歸焉

血傷必用薑汁傳送黃芩治熱痰假其下火也竹瀝

滑痰非薑汁不能行經絡五倍子能治老痰佐他藥

大治頑痰一陳湯一身之痰都治管如要下行加引  
下藥在上加引上藥

凡用吐藥五升提其氣便吐也如防風山梔川芎桔梗芽茶生薑薑汁之類或用瓜蒂散

凡風痰病必用風痰藥如白附子天麻雄黃牛黃片

凡人身上中下有塊者多是痰問其平日好食何物

吐下後方用藥

許學士用蒼朮治療成窠囊一邊行極妙痰挾瘀血

遂成窠囊

眩運嘈雜乃火動其痰用二陳湯加山梔子黃連黃芩之類噫氣吞酸此食鬱有熱火氣上動以黃芩爲君南星半夏爲臣橘紅爲使熱多加青黛

痰在脅下非白芥子不能達痰在皮裏膜外非薑汁竹瀝不可導痰在四肢非竹瀝不開痰結核在喉中燥不能出入用化痰藥加鹹藥軟堅之味苦薑仁杏仁海石桔梗連翹少佐朴硝以薑汁蜜和丸噙服

海粉即海石熱痰能降濕痰能燥結痰能軟頑痰能消可入丸子末子不可入煎藥枳實瀉痰能衝牆倒壁小青丹治膈上痰熱風痰濕痰肩膊諸痛能損胃氣食積痰實者用之不宜多參萸丸能消痰喉中有物咯不出嚥不下此是老痰重者吐之輕者

用苦蓼輩氣實必用荆瀝

天花粉大能降鬲上熱痰痰在膈間使人頭暈或健忘或風痰皆用竹瀝亦能養血與荆瀝同功治稍重能食者用此一味效速穩當一瀝治痰結在皮裏膜外及經絡中痰必佐以薑汁韭汁治血滯不行中焦

有飲自然汁冷吃兩三錢盡必留中煩躁不寧後愈

凡痰之爲患爲喘欬嘔利眩運嘈雜怔忡驚悸寒熱

痛腫痞隔壅塞或胷脇間辘轳有聲或背心一片常

爲冰冷四肢麻痹不仁皆痰飲所致善治痰者不治

痰而治氣氣順則一身之津液亦隨氣而順矣古方

治痰飲用汗吐下溫之法愚見不若以順氣爲先分

導次之王隱君云痰清白者爲寒黃而濁者爲熱不知始則清白久則黃濁清白稀飲漬於上黃濁稠黏

凝於下嗽而易出則清而白欬而不能出則黃濁結滯若咯唾日久濕熱所鬱上下凝結皆無清白者甚

至帶血血敗則黑痰爲關格異病人所不識又清白者氣味淡日久者漸成惡味酸幹腥臊焦苦不一

百病多有兼痰者世所不知人身中有結核不痛不紅不作膿痰注也治痰法實脾土燥肺濕是治其本

痰病似祟論

血氣者身之神也神既衰乏邪因而入理或有之若血氣兩虧痰客中焦妨礙升降不得運用以致十二官各失其職視聽言動皆有虛妄以邪治之其人必死吁哉冤乎誰任其咎憲幕之子傳兄年十七八時暑月因大勞而渴恣飲梅漿又連得大驚三四次妄言妄見病似邪鬼診其脈兩手皆虛弦而帶沉數字曰數爲有熱虛弦是大驚又梅酸之漿鬱於中脘補虛清熱導去痰滯病乃可安遂與人參白朮陳皮茯苓連等濃煎湯入竹瀝薑汁與服旬日未效衆皆尤藥之不當余服之知其虛未完與痰之未導也仍與前方入荆瀝又旬日而安外弟歲一日醉飽後亂平治會粹

痰病吐法

吐法兼用芽茶薑水薑汁酢少許苦蓼散少許加防

風桔梗皆升動其氣便吐

吐法用附子尖桔梗蘆人參薑瓜蒂藜蘆艾葉芽茶等藥此皆自吐不用手探但藥但湯皆可吐

吐法先以布搭膊勒腰於不通風處行此法蘿蔔子

言妄語妄見詢之係伊亡兄附體言生前事甚的乃叔在邊叱之曰非邪也乃食腥與酒太過痰所爲耳

灌鹽湯一大碗吐痰一二升汗因大作困睡一宵而安又金氏婦壯年暑月赴筵歸乃姑詢其坐失序

遂赧然自愧因成此病言語失倫其中又多間一句曰奴奴不是脈皆數而弦余曰此非邪乃痰病也但與補脾清熱導痰數日當自安其家不信邀數友者噴水而呴之旬餘而死或問曰病非邪而邪治之何

遽至於死余曰暑月赴宴境外蒸熱辛辣適口內境

鬱熱而况舊有積痰加之愧悶其痰與熱何可勝言

今乃驚以法尺是驚其神而血不寧也噴以法木是實其體密其膚使汗不得泄也汗不泄則蒸熱內燔

血不得寧則陰消而陽不能獨立也不死何俟或曰外臺祕要有禁呴一科庸可廢乎予曰移精變氣乃小術耳可治小病若內有虛邪外有實邪當用正大

之法自有成式昭然可考然符水惟膈上熱痰一呷

涼水胃熱得之豈不清快亦可取安若內傷而虛與冬令嚴寒符水下咽必冰胃而致害彼鬱熱在上熱邪在表須以汗解卒得清冷膚腠固密熱何由解必致內攻陰陽離散血氣乖爭去死爲近

平治會粹

半升搗和以漿水一椀濾去粗入少油與蜜旋至半溫服後以鵝翎探吐凡用鵝翎須以桐油浸却以皂角水洗去肥瘦乾用之又法用蝦帶殼半斤入醬葱薑等料物煮汁先吃蝦後飲汁以翎勾引吐必須緊勒肚腹

### 明虞搏醫學正傳

#### 痰飲論

內經曰諸氣膿鬱皆屬肺金蓋肺氣鬱則成熱熱盛

則生痰丹溪曰自熱成積自積成痰痰挾瘀血遂成

窠囊此爲痞痛嗜膈翻胃之次第也王隱君曰痰證

古今未詳方書雖有懸飲留支飲痰飲諸飲之異

而莫知其爲病之源或頭風目昏眩運耳鳴或口眼

蠕動眉稜耳輪搔痒或四肢遊風腫硬似痛非痛或

爲齒頰痒痛牙牀浮腫而痛痒不一或嘔氣吞酸嘈

雜嘔或咽嗌不利咯之不出嚥之不下色似煤炁

形如破絮桃膠蜋肉之類或心下如停冰雪心頭冷

痛時作或夢寐奇怪鬼魅之狀或足腕痠軟腰背卒

痛或四肢骨節煩疼並無常所乃至手麻臂痛狀若

挫閃或脊中有掌大一塊如冰之寒痛者或渾身習

習如蟲行者或眼沿澀痒口糜舌爛甚爲喉閉等證

又或邊項結核似癰非癰或胷腹間如有二氣交紐

噎塞煩悶有如煙氣上衝頭面烘熱或爲失志顛狂

中風癲瘇或爲勞瘵風痹脚氣之候或心下怔忡驚

悸如畏人將捕或喘嗽嘔吐或嘔冷涎綠水黑水甚

爲肺癰瘇毒便膿攀跛其爲内外疾病百端皆痰之

所致也蓋津液既凝爲痰飲而洶湧上焦故口燥渴

乾流而之下則大小便閉塞面如枯骨毛髮焦乾婦

人則經閉不通小兒則驚癇搐搦治法宜先逐去敗  
痰然後看虛實調理故製沉香滾痰丸爲通治三焦  
痰飲之要藥也愚竊以其論證固詳不問虛實而一  
概以峻藥攻之恐未中肯綮也蓋資粟有厚薄病邪  
過多致脾氣虛則痰反易生又曰中焦有食積與痰  
而生病者胃氣亦賴所養卒不可便攻攻盡則愈虛  
而病劇夫滾痰丸止可投之於形氣壯實痰積膠固  
者若體氣虛弱之人決不可輕用

#### 戴思恭證治要訣

##### 停飲伏痰

飲凡有六懸溢支痰留伏痰飲特六飲之一耳人病  
此而止曰痰飲者蓋停既久未有不爲痰多因氣道

閉塞津液不通譬如溝渠壅滯停積淹停滯則倒流逆

上瘀濁臭穢無所不有若不速決溝渠而欲澄治已

壅之水而使之清無是理也

凡爲喘欬嘔泄眩運心嘈忪忡驚悸寒熱痛腫痞

壅閉或胷脅間瀝瀝有聲或背心一片如水冷皆飲

之所致如水之壅有瘀濁臭穢故善治痰者不治痰

而治氣氣順則一身之津液亦隨氣而順矣並宜蘇

子降氣湯導痰湯各半貼和煎或小半夏茯苓湯加

枳實木香各半錢吞五套丸或以五套九料依分兩

作飲子煎服尤好平居皆無他事只有痰數口或清

或堅宜二陳湯小半夏茯苓湯痰多間進青州白丸

子和來復丹服來白丸如和以八神來復丹卽名青

神丸此非特治痰飲尤甚療喘嗽嘔吐呃逆翻胃若  
服藥未效者一生湯加木香半錢若頭暈隨氣逆上

不爲藥解當自下部利之宜五膈寬中散加半夏半  
錢吞破飲丸仍佐以半硫丸恐大便復祕飲利不盡  
半硫丸當常服若大便先不因藥自利及老人虛人  
當利其小便宜小半夏茯苓湯改用赤苓而倍之或  
導痰湯加猪苓半錢

痰飲眩運及成飲厥者宜別加木香二生湯吞青州  
白丸子和靈砂丹名青金丹或吞養正丹半硫丸

痰飲流入四肢令人肩背痺疼兩手軟痹醫悞以爲  
風則非其治宜導痰湯加木香薑黃各半錢

痰飲而變生諸證不當爲諸證牽掣妄言作名且  
以治飲爲先飲消則諸證自愈有卒然昏悶口眼喝

斜側中而實非中四肢戰曳身如浮雲似虛而實非  
虛皆痰飲所爲也又有腎虛寒不能攝水致水邪溢

上故作痰飲宜八味丸

其人素有痰飲流注肩背作痛宜星香散或導痰湯

下五套丸

#### 樓英醫學綱目

##### 痰飲

凡有痰者眼皮及眼下必有烟灰黑色舉目便知不  
待切脈眼黑而頰赤者熱痰也面大黃脣亦熱痰也

外證必煩滿脣熱口乾思冷大便祕結小便亦熱久

必生風或眩運耳鳴眼花多虛證治之而用熱藥服

久必脈大實發大熱而中風可急下之眼黑而行走

呻吟舉動艱難者入膏肓也其證偏體骨節疼痛眼

黑而面帶土色四肢痿痹屈伸不便者風濕痰也眼

黑而氣短促者驚風痰也左右關脈大者脣中有痰

也可吐之怕吐者消息下之凡人背上一條如線而