

廣陵醫籍叢刊



喉科初指



卷三

邗東包永泰鎮魯氏著

男福成嚮五氏校

咽癰門

癰 喉 寒 伏



伏寒喉癰內積寒外感時邪

發兩關腫痛紫紅脉浮象清


咽加減立時安



此症因積寒在內外感時邪而發紫紅腫痛於帝丁兩傍
脉浮不數

治用清咽散加羌活河車赤芍葛根山甲歸尾各二錢
刺蘇葉木通各一錢細辛分兩日後加山梔一錢去羌葛
二味四五日可愈

腫爛喉風




腫爛喉風潰爛克脾家積熱
發於中寸關兩脉皆洪大針
穴清咽服有功

此症脾家積熱而生紅腫潰爛兩寸關肺脉洪大者是也
治宜針少商商陽關冲少冲兩手八穴血多為妙先以津
化八仙散一服嚥下再用清咽散加鹽水炒元參二錢鹽水

炒黃栢酒炒黃芩各錢半生大黃錢三山梔木各一錢河車
錢如^二一服後可去大黃不必再瀉三日後用十八味神藥
栢葉汁嚥漱即愈外吹鳳凰散或白獅丹



淡白喉風



此症因脾肺受寒其色不紅若用寒涼之劑七日之內必
成膿潰六脉弦緊身發寒熱

治法即用針挑患處出膿初起針少商商陽兩手四穴出

淡白喉癰何以癰肺脾寒氣
受於中切忌誤用寒涼藥七
日之內必成膿有膿即用針
挑破外針穴血自輕鬆加減
清咽三四帖管教全愈見奇
功

其紫血用清咽散加蘇葉赤芍歸尾各錢半次日換加山

甲角刺河車各二錢



大紅喉癰



此症因肺脾積熱其色鮮紅腫脹關內六脉洪大身發寒熱


治宜急針少商商陽兩手四穴或針患上出血先用山梔

此因肺脾積熱甚腫脹成癰
色大紅六脉洪大身寒熱
穴清咽病自鬆

木通各一錢海浮石生大黃歸尾角刺山甲河車各三錢
黃芩花粉赤芍各錢半河水煎二三十沸後下清咽散內
去前枳二味同煎數滾即起二帖可愈



聲啞喉風



聲啞喉癰寒太重肺臟閉塞

以成癰湯水不入聲音啞或

生斑爛熱寒攻肺脉沉而

帶瀦脾胃脉洪清咽通待至

聲音全不啞細心加減見全

功

此症因着寒太重肺臟閉塞以致湯水難入或有爛斑肺


脉沉瀦脾胃脉洪大背寒身熱

治用清咽散加羌活錢葛根錢蘇葉錢一服漱之二日後

聲音不啞去前三味換加花粉錢乳香分五葛根酒炒黃芩
歸尾赤芍山甲角刺各二錢再服八仙散玉樞丹二帖
愈



車 喉 癰



車喉癰或左右生身熱背寒

脾肺逆有紅點者因風火無

紅點是風寒凝當用清咽散

自效魁寒解熱自然平

此症或左或右身熱背寒脾肺之症有紅點者風火無紅

點者風寒脉象如前

治用清咽散加蘇葉錢二羌活錢二漱之次日再加赤芍歸尾

豆根山梔各錢半服一帖即愈



外症喉癰



外症喉癰頷下生天突穴上

乃為真內外皆腫飲食碍

見無痰內少形此因風毒相

凝聚清咽加減漸能輕日夕

如已成漏管十全大補可安

寧

此症生於頷下天突穴之上內外皆腫飲食有碍初起無

痰涎內不見形跡乃風毒也

治用清咽散加黃耆角刺山甲歸尾赤芍河車各二錢紅

花萼根各一錢乳香分五連進三服以消為止如已成漏管

用十全大補湯收功

癰 喉 腮 兜



兜腮喉癰生腮下又喚懸癰

鬱積寒清咽用以消為主

恐針之成漏頑參薺可以

期效遇此須當仔細看

此症生於腮下其名懸癰因鬱積寒氣而發外用宮灸之

法二壯

治用清咽散加山甲歸尾角刺川芎白芷各一錢升麻

分三

紅花分五乳香分五以消為度有膿針之成漏管者多用參耆

內托或可收用藥之功遇症不可輕忽

