



肺臟方 凡八類

肺臟脈論第一論一首

論曰肺主魄魄藏者任物之精也為上將軍使在上行所以肺為五臟之華蓋並精出入謂之魄魄者肺之臟也鼻者肺之官肺氣通於鼻鼻和則能知香臭矣循環紫宮上出於頰候於鼻下迴肺中榮華於髮外主氣內主胸與乳相當左乳房右乳辛肺重三斤三兩六葉兩耳凡八葉有十四童子七女子守之神名鴻鵠王藏魄號為魄藏隨節應會亥子市氣氣舍魄在氣為放在液為涕肺氣虛則鼻息利少氣實則喘喝胸憑仰息肺氣虛則夢見白客於肺則夢飛揚見金鐵之名浮相於季夏王於秋秋在上遲則在下故名曰毛陽掌血而不脉緊摶則惡寒緊則寒慄相搏故名曰病疾周有度數行有遲在上傷毛采數在反在下陰反在上石曰長而且留秋脈如浮而浮來急去大浮反此者病何如而反其氣來毛而中微此謂不及病道則令人氣逆而脊痛溫溫然不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下聞病音肺脈來厥厥盡大浮平秋以胃氣為本肺脈來不上不下如循雞羽曰肺病不字葉源無肺脈來如物之浮如風吹毛曰肺平真肺脈至大而虛如以毛羽中人膚色白亦不澤毛折乃死秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無日曰死毛而有弦曰春病弦甚曰今病肺藏氣氣舍魄喜樂無極

則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革焦毛悴色夭死於夏 手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫皮毛者也氣弗營則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷皮節傷則爪一作皮枯毛折毛折則氣先死丙篤丁死火勝金也 肺死藏浮之虛按之弱如葱葉下無根者死秋金肺王其脈微溫而短曰平反得大而緩者是脾之乘肺母之歸子為虛邪雖病易治反得沉濡而滑者是腎之乘肺子之乘母為實邪雖病自愈反得浮大而洪者是心之乘肺火之魁金為賊邪大逆十死不治反得弦細而長者是肝之乘肺木之陵金為微邪雖病卽瘥肝乘肺必作虛 右手關前寸口陰實者肺實也苦少氣胸中滿膨脹與肩相引刺手太陰治陰噫逆刺手陽明治陽 右手關前寸口陰實者肺實也苦少氣胸中滿膨脹與肩相引刺手太陰治陰肺脈來泛泛輕如微風吹鳥背上毛再至曰平三至曰離經病四至曰脫精五至死六至命盡手太陰脈也 肺脈急甚為癲疾微急為肺寒熱急情欬唾血引腰背胸苦鼻息肉不通緩甚為多汗微緩為痿漏風一作偏風頭已下汗出不可止大甚為脛腫微大為肺痺引胸背起腰內小甚為飧泄微小為消痺滑甚為息貢上氣微滑為上下出血濇甚為嘔血微濇為崩瘻在頸肢腋之間下不勝其上其能喜酸 肺脈搏堅而長當病唾血其濡而散者當病漏一作灌汗至今不復發散 白脈之至也喘而浮上虛下實驚有積氣在胸中喘而虛名曰肺痺寒熱得之醉而使之內也 黃帝問曰經脈十二而手太陰之脈獨動不休何也 手太陰本在寸口中岐伯對曰足陽明胃脈也胃者五臟六腑之海胃脈在足趺上大趾間上行三十步解中是也其精氣上清注於肺肺氣從太陰而行之其行之也以息往來故人一呼脈再動一吸脈亦再動呼吸不已脈動不止黃帝問曰氣口何以獨為五臟主岐伯對曰胃者水穀之海六腑胃居其大五味入於口藏於胃以養五臟氣氣口者太陰是也臟腑之氣味皆出於胃變見於氣口氣口屬腑臟主卽呼守口者也 扁鵲曰肺有病則鼻口張實熱則喘逆胸悶仰息其陽氣壯則夢恐懼等虛寒則欬息下利少氣其陰氣壯則夢涉水等 肺在聲為哭在變動為放在志為憂憂傷肺精氣升於肺則悲也 味主秋結滿而血者

欬逆氣肩息背痛汗出尻陰股膝掣靜膀胱足皆痛虛則少氣不能報息耳聲嗌乾取其經手太陰足太陽之外厥陰內少陰血者肺脈沉之而數浮之而喘苦洗澆寒熱腹滿腸中熱小便赤肩背痛從腰以上汗出得之房內汗出當風肺病其色白身體但寒無熱時時欬其脈微遲為可治宜服五味子大補肺湯瀉肺散春當刺少商夏刺魚際皆瀉之季夏刺大淵秋刺經渠冬刺尺澤皆補之又當灸膻中百壯第三椎二十五壯邪在肺則皮膚痛發寒熱上氣氣喘汗出欬動肩背取之膺中外腧背第三椎之傍以手重按之快然乃刺之取之缺盆中以越之形寒寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上行肺氣傷其人勞倦則欬唾血其脈細緊浮數皆吐血此為躁擾噴怒欬逆肺傷氣壅所致也肺中風者口燥而喘身違而重冒而腫脹肺中寒者其人吐濁涕肺中水者其身體腫而小便難時時大便如鴨溏肺脹者虛而滿喘欬目如脫狀其脈浮大太陽脈浮緩少陽脈微緊微為血虛緊為微寒此為麗乳診得肺積脈浮而毛按之辟易肠下時時痛逆背相引痛少氣善忘目瞑結癰皮膚寒秋愈夏劇主皮中時痛如蟲緣之狀甚者如鍼刺之狀時瘡色白也肺之積名曰息竇在右肠下腹大如杯久久不愈病灑灑寒熱氣逆喘欬發肺癰以春甲乙日得之何也心病傳肺肺當傳肝肝道以春王王者不受邪肺復欲還心心不肯受因留結為積故知息竇以春得之肺病身當有熱欬較短氣唾出膿血其脈當短濶令反浮大其色當白而反亦者此是火之冠金為大逆十死不治商音人者王肺聲也肺聲哭其音磬其志樂其經手太陰厥逆陽明則榮衝不通陰陽反祚陽氣內擊陰氣外傷傷則寒寒則虛虛則厲風所中噦吸戰掉語聲嘶塞而散下氣息短憊四肢辟弱面色少華遺失便利甚則不可治依源麻黃續命湯王之賦風篇中又言音喘急短氣好唾此為火冠金陽擊陰陰氣沉陽氣升升則實實則熱熱則狂狂則閉眼悖言非常所說口赤而張飲無時度此熱傷肺肺化為血不治若面赤而鼻不欲可

治也 肺病為瘧者令人心寒寒甚則熱熱間善驚如有所見者恒山湯主之方見第十卷溫瘧篇中若其人本來語聲雄烈忽爾不亮御氣用力方得出言而及於常人呼共語直視不應雖曰未病勢當不久此則肺病聲之候也察觀疾病表裏相應依源審治乃不失也 白為肺肺合皮白如豕膏者吉肺主鼻鼻是肺之餘其人金形相比於上商白色小頭方面小肩背小腹小手足發動身輕精瘦急心靜悍性喜為吏治秋冬不耐春夏春夏感而生病主手太陰廉廉然肩膺厚薄正殊則肺應之正白色小理者則肺小小則少飲不病喘喝粗理者則肺大大則虛虛則寒喘鳴多飲善病胸喉痹逆氣巨肩反膺陷喉者則肺高高則實實則熱上氣肩急欬逆合腋張脇者則肺下下則逼責迫肝善脇下痛鼻塞或壅而涕生息肉好肩背厚者則肺堅堅則不病欬上氣肩背薄者則肺脆脆則易傷於熱喘息鼻衄肩膺好者則肺端正端正則和利難傷膺偏欹者則肺偏傾偏傾則病胸偏痛鼻亦偏疾凡人分部陷起者必有病生大腸陽明為肺之部而藏氣通於內外部亦隨而應之沉濁為內浮清為外若外病內入則所部起內病裏出則所部陷外入前治陽後治陰內出前治陰後治陽實瀉虛補陽主外陰主內凡人死生休否則藏神前變形於外人肺前病鼻則為之孔開焦枯若肺前死鼻則為之梁折孔閉青黑色若天中等分墓色應之必死不治看色深淺斟酌促遠不出一年促不延時月肺疾少愈而卒死何以知之曰赤黑如拇指麤點見頰頰上肺前病鼻則為之孔開焦枯若肺前死鼻則為之梁折孔閉青黑色若天中等分墓色應之必死不治看其年若年上不應三年之中禍必應也 秋金肺脈色白主手太陰脈也以尺至脉之氣也

殺金得勝火易氣主合之

太陰之別名列缺起於腋下分間並太陰之經直入掌中散入於魚際別走手陽明主肺生病病實則大腸熱熱則手足掌起起則陽病陽脈反逆大於寸口三倍病則欬上氣喘渴煩心胸滿膍臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背痛風汗出中風虛則大腸寒寒則久欬小便遺數數則陰病陰脈反小於寸口一倍病則肩背寒痛少氣不足以息季脇空痛尿色變卒遺失無度秋三月者主肺大腸白氣裡病也其源從太陽擊手太陰太陰受淫邪之氣則經絡壅滯毛皮緊豎發泄邪生則臟腑傷溫隨秋受羈其病相反若腑虛則為陰邪所傷乍寒乍熱損肺傷氣暴喘嘔逆若臟實則為陽毒所損體熱生斑氣喘引飲故曰白氣裡病也扁鵲曰灸心肝二腧主治丹毒白裡病當依源為療調其陽理其陰則臟腑之病不生

肺虛實第二

灸法四首 方二十一首

肺實熱右手寸口氣口以前脈陰實者手太陰經也病苦肺脹汗出若露上氣喘咽中塞如欲嘔狀名曰肺實熱也

治肺實熱胸懶仰息泄氣除熱方

石膏八兩白前杏仁六克

白朮橘皮各五克

枸杞根皮各二克

七合右七味㕮咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮三沸分三服

衍義

肺為天一生水之上源脾為厚土生金之肺母今因肺過熱燥不能施白露下降之令故用石膏白前亦蜜滋降秋燥杏仁橘皮枸杞根皮泄其逆滿尤妙在白朮一味培土安金填塞壯火遊行之路庶幾金不受鑠水能承制而無陰火土協心包逆乘母氣之虛設不預為籌度專力耗氣泄火未免熱去寒起則與時師奚擇哉

治肺熱悶不止胸中喘急驚悸客熱來去欲死不堪服藥泄胸中喘氣方 桃皮 芫元各一兩二味㕮咀以水四斗煮取一斗五升去滓以故布手巾內汁中薄胸溫四肢不盈數日即歇

**行義** 肺合皮毛肺氣內壅已極不堪更以湯藥助滿故用破血導水之味漬布搭胸使藥氣內通濁氣外泄乃奇兵解圍之策從十三篇中悟出

**橘皮湯** 治肺熱氣上欬息奔喘方 橘皮 麻黃 柴胡 紫蘇 刑繁作  
蓋各三兩 杏仁 宿薑 酪四 石膏 八兩

右七味㕮咀以水九升煮麻黃兩沸去沫下藥煮取三升去滓分三服不瘥與兩劑

**行義** 肺滿上氣喘欬本當用麻黃越婢麻杏甘石等方慮其甘草大棗助滿故易橘皮紫蘇以散上奔之氣膽欲大而心欲小之作用略見一斑

**治肺熱喘息鼻衄血方** 羚羊角 元參 射干 雞蘇 苓藥 升麻 柏皮 酸三生地升 桔子仁

四兩 淡竹茹 雞子大一枚 右十味㕮咀以水九升煮取三升分三服須利者下芒硝三兩更煮三沸

**行義** 肺熱喘衄良由龍雷煽虐反侮肺金之象故用羚羊入肝散血射干入肺散氣梔子柏皮分解於內升麻雞蘇開提於內芍藥地黃順血下注元參竹茹抑火前通若勢劇須利者下芒硝以急奪之自然龍火潛蹤金不受侮烏有喘衄之患乎

**治肺熱飲酒當風風入肺膽氣妄泄目青氣喘者方** 麻黃 四兩 甘草 五味子 各三兩 杏仁 五十粒 母薑 五兩

淡竹葉 切一升 六味㕮咀以水七升先煮麻黃去沫下諸藥者取三升去滓分三服

**行義**

前方以梔子柏皮佐羚羊散上溢之血升麻雞蘇佐射干散上盛之氣此方以竹茹杏仁佐脈

開發肺氣五味甘草佐母薑收攝膽泄膽竄則目青自除風息則氣喘自己二方所宗總不出梔子柏

皮湯麻黃連翹赤小豆湯射干麻黃湯等方之變法

**瀉肺散** 治酒客勞倦或出當風喜怒氣含於肺而目黃腫起卽頭眩欬逆上氣時忽忽欲絕心下絃急

不能飲食或吐膿血胸痛引背支滿欲嘔方 五味子 百部 各二兩半 荸苓 附子 肉蓯蓉 石斛

當歸 遠志 川續斷 各一兩半 細辛 甘草 各七分 防風 川椒 紫菀 桂心 乾薑 欽冬 各一兩半 桃仁

部石斛專為木盛生風而設當歸續斷桃仁專為勞傷血胸痛引背而設甘草乾薑川椒專為飲食欲吐面目黃腫而設桂附遠志旋覆專為起卽頭眩忽忽欲絕上盛下虛而設苟非固脾腎之根本安能任肺氣之疎泄歟

灸法

肺脹氣搶脇下熱痛灸陰都隨年壯穴在俠胃腕兩邊相去一寸胃腕在心下三寸 肺脹脇滿嘔吐上氣等病灸大椎并兩乳上第三肋間各七壯 肺與大腸俱實 右手寸口氣口以前脈陰陽俱實者手太陰與陽明經俱實也病苦頭痛目眩驚狂喉痹痛手臂捲脣吻不收名曰肺與大腸俱實也  
煮散 治肺與大腸俱實令人氣憇方 麻黃 茯苓各六 黃芪 大青 桂心各三 細辛 杏仁各五  
石膏二兩 丹參半兩 五味子 甘草 橘皮 貝母 川芎各一 枳實二枚右十五味治下節為粗散  
帛裹一方寸匕半以井花水一升五合煮取七合為三服日再

衍義

邪之所湊其氣必虛故治肺與大腸俱受客邪而實用麻黃湯及麻杏甘石湯之製以解風從火化之熱必兼五味以收肺氣之逆黃芪以斂麻黃之散其餘等味皆疎泄痰氣之亞耳

肺虛冷 右手寸口氣口以前脈陰虛者手太陰經也病苦少氣不足以息嗌乾不津液名曰肺虛冷也  
治肺虛冷聲嘶傷語言用力戰掉緩弱虛寒入肺方 防風 獨活 川芎 秦椒 乾薑 黃芪各  
十四天雄 麻黃 山萸肉 五味子各三十 八銖 甘草三十 六銖 泰光 桂心 山藥 杜仲 人參 細辛  
防己十株 菊花 紫菀各二十 貫眾二枝附子七分右二十二味治下節以酒服方寸匕日二服 一方有石膏六分當歸五分

衍義

風入肺絡而致聲嘶語難用力戰掉故用麻黃附子細辛開發肺寒防己貫眾通行經脈參芪甘草保護肺氣雄桂椒蔓協濟附子之雄防獨芳秦助力麻辛之散萸味薯杜匡扶參芪之補甘菊紫

菟專化雄附之烈其方似乎龐雜而實井井有條各具相制之妙非洗心求之不能得其奧義

酥蜜膏酒

治肺氣虛寒厲風所傷語聲嘶塞氣息喘欬唾上氣通聲方

酥

崖蜜

飴糖

生薑

汁

生百部汁

棗肉

杏仁

研

柑皮

五具

右八味合和微火煎常攪

三上三下約一炊久取薑汁

等各減半止溫酒一升服方寸七細細咽之日二夜一〇又方

猪脰

三具

大棗

百枚右二味以酒五升清之秋冬七日春夏五日出布絞去滓七日服盡二七日忌鹽羊脰亦得治欬嗽胸膈支滿多喘上氣尤良

肘后方治久欬上氣二十年諸治十瘡者

治肺寒損傷氣嗽及涕唾鼻塞方

棗肉

二斤

研

杏仁

二升

熬酥

生薑汁

白糖

白蜜

生百部汁

升格

右七味合和微火煎常攪約一炊久下之細細溫清酒服二合日二

行義 肺竅為風寒所襲而致喘欬上氣語聲嘶塞故用薑汁杏仁柑皮百部溫散肺絡之結膠飴棗肉乳酥崖蜜通行肺脾之津津回燥潤津自復矣厥後大腸腑門通聲晉從此化出 又方專取猪脰滌除痰垢大棗通行津液清酒治證如前或易羊脰入肺尤捷〇又方卽酥蜜膏酒倍用棗肉杏仁之通津而去柑皮之耗氣

補肺湯

治肺氣不足逆滿上氣咽中悶塞短氣寒從背起口中如含霜雪言語失聲甚者吐血方

五味子

三兩乾薑

桂心

款冬花

二格

麥冬

一升桑根白皮

一斤大棗

一百

梗米

二合

右八味㕮咀以水一斗先煮桑白皮五沸下藥煮取三升分三服〇又方

治肺胃虛寒喘乏少食不能飲食

黃芪

五兩甘草

鍾乳

人參

二兩地黃

桂心

茯苓

白石英

桑白皮

厚朴

乾薑

紫菀

橘皮

當歸

五味子

遠志

麥冬

兩

大棗

二十

右十八味㕮咀以水一斗四升煮取四升分三服

日三夜二〇又方

治肺氣不足欬逆上氣牽繩而坐吐沫唾血不能飲食方

蘇子

一升桑白皮

兩

半夏六兩紫菀

人參

甘草

五味子

杏仁

兩

款冬花

射干

一兩

麻黃

乾薑

桂心

各三兩

欵冬花 竹葉 橘皮 桂心 桑白皮 茯苓 紫菀各一兩

麥冬四兩 生薑五兩 杏仁放糧米五十粒米

二合大棗十枚右十六味㕮咀以水一斗三升先煮桑白皮粳米大棗以米熟去滓內諸藥者取五升

分六服日三〇又方

治肺氣不足心腹支滿欬喘逆上氣唾膿血胸背痛手足煩熱惕然自驚皮毛起或哭或歌或怒乾嘔心煩耳中聞風雨聲面色白方

欵冬花 桂心各二兩桑白皮一斤 生薑

五味子 鍾乳各三兩麥冬四兩粳米五合

大棗十枚右九味㕮咀以水一斗二升先煮粳米棗令熟去滓內藥煎取二升分三服溫服之

一方用白石英二兩

廣濟有紫菀人參各二兩名紫菀湯

津內藥煎取二升分三服溫服之

一方用白石英二兩

廣濟有紫菀人參各二兩名紫菀湯

衍義

補肺湯五方首言寒從背起背者胸之腑肺之舍故用乾薑桂心溫胸中之寒欵麥二冬滋胸

中之燥五味桑皮理胸中之邪大棗粳米培胸中之氣溫補肺臟本寒而兼清解標熱也

其第二方兼溫補肺胃虛寒故用鍾乳石英薑桂之屬力助參芪之補氣歸地之滋血且中藏生脈以化石藥之

悍厚朴橘皮紫菀桑皮開泄胸中之滯

其第三方雖證見欬吐涎沫因有胸中引急知為正虛邪實故於射干麻黃湯中除去大棗之戀膈參入麻黃湯中桂封二味更加人參易乾薑助胃祛邪蘇子桑

皮止逆安神乃寓補於瀉之奧旨非精熟金匱之法者難以語此

其第四方方下主治較之首方惟其人吐血舌乾稍為不同然方中紫菀欵麥二冬未嘗不治吐血但易生薑加竹茹專為古乾起見必其人

形神羸瘠以故參之第二方中石英鍾乳兼溫肺胃二經也

其第五方良由金衰不能制木木邪橫干諸藏方下所云心腹支滿濁陰逆上也欬逆上氣唾膿血胸中痛火逆上乘肺位也手足煩熱四肢

為諸陽之本也惕然自驚邪干心包也皮毛起或哭邪干肺也或歌邪干脾也或怒邪自暴也乾嘔

邪干胃也煩心邪干臍中也耳聞風雨聲陰邪上走腎竅也難證見諸經受邪總以收攝虛陽兼清旺

氣為主方中鍾乳桂心五味非收攝虛陽之用乎欵麥二冬桑皮薑桑粳米非兼清旺氣之用乎合五

方論之可見補正必需辛溫散標不離清潤

# 千金要方

## 卷十七

附 張路王先生序

五

民國四年石印

麻子湯 治肺氣不足欬唾膿血氣短不得卧方 麻子一升 桑皮 錫各一桂枝 人參各二阿膠  
紫菀各一生薑三兩 乾地黃四兩 右九味㕮咀以水一斗五升合煮取四升分五服

行義 此炙甘草湯之變方因欬唾血膿肺中津傷故用人參阿膠地黃麻仁以滋津血之燥生薑桂枝以散肺氣之結紫菀卽甘草之變味桑皮卽麥冬之變味錫糖則大棗之變味耳

錫煎 治肺氣不足咽喎苦乾方 作錫任多少取乾棗一升去核熟搗水五升和使相得絞去滓澄去上清取濁者內飴中攬火上煎勿令堅令連服如雞子大漸漸服之日三夜二

行義 肺胃一氣貫通肺氣不足實由胃中津枯不能上滋於肺所以咽喎苦乾但取建中湯中之二以資胃氣而助蒸化之力也

治肺風氣萎絕四肢滿脹喘逆胸滿方 炙肺腧各二壯肺腧對乳引繩度之在第三椎下兩傍相去各一寸五分

肺與大腸俱虛 右手寸口氣口以前脈陰陽俱虛者手太陰與陽明經俱虛也病苦耳鳴嘈嘈時妄見光明情中不樂或 恐怖名曰肺與大腸俱虛也

小建中湯 治肺與大腸俱不足虛寒乏氣小腹拘急腰痛羸瘠百病方 大棗十二枚 生薑 桂心各三  
甘草二兩 芍藥六兩 右五味㕮咀以水八升煮取三升去滓合飴糖八兩煮三沸分三服 人參各二兩

名黃芪  
建中湯

行義 桂本血藥而辛溫散邪恐其動血故以芍藥護持榮氣不使隨桂外泄得甘草之甘溫而和寒熱諸邪薑棗之辛甘而和榮衛諸氣為風傷衛之首方參入膠飴一味取稼穡之甘便為建中專藥所以寒傷榮之天中脈微虛寒之裏氣不足咸賴乎此允為虛羸和解中外之聖

**麻黃引參湯** 治肺勞虛寒心腹冷氣逆氣胸脇痛  
**細辛** 桂心各三橘皮二分石膏八兩竹葉升切一右十一味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服  
**行義** 勞役而邪升於肺故用金匱厚朴麻黃湯中麻黃石膏杏仁細辛以泄肺滿澤漆湯中半夏生薑白前桂心以滌痰垢參入紫蘇橘皮竹葉以助麻黃半夏石膏之力引清氣上升濁氣下降喘息面腫隨手可瘥矣

**半夏湯** 治肺勞虛寒心腹冷氣逆氣胸脇痛飲食卽吐虛乏不足方 半夏一升生薑一斤桂心四兩甘草厚朴各二兩人参橘皮麥冬各三兩右八味㕮咀以水一斗煮取四升分四服腹痛加當歸二兩

**行義** 勞乏而胸中陽氣不布濁陰上攻逆滿原非本虛之謂故用參桂薑半溫中麥冬甘草滋肺卽兼厚朴橘皮開泄滯氣胸中陽氣得人參薑桂守護之力則濁陰不復上僭矣

**厚朴湯** 治肺勞風虛冷痰澼水氣晝夜不得卧頭不得近枕上氣胸滿喘息氣絕此痰水盛溢方 厚朴麻黃桂心黃芩石膏大戟橘皮各二兩半夏一升生薑十兩大棗十五枚右十六味㕮咀以水一斗三升煮取四升去滓分五服

**行義** 痰澼水氣積於胸中不能眠卧故彙採金匱射干麻黃湯厚朴麻黃湯澤漆湯中泄肺諸味參入大戟與射干澤漆味雖變而功用不殊其餘枳橘茯苓秦艽不過為麻朴薑半之佐輔苟不知金匱之淵源無以推千金之發派

**治喉痺氣逆欬嗽口中唾涎方** 灸肺腧七壯亦可隨年至百壯

**氣極第四** 論一首 灸法二首 方六首

論曰凡氣極者主肺也肺應氣最與肺合又曰以秋遇病為皮痺皮痺不已復感於邪內舍於肺則寒溫

之氣客於六腑也。若肺有病則先發氣氣上衝胸，常欲自憇。以秋庚辛日傷風邪之氣為肺風，肺風之狀多汗。若陰傷則寒，寒則虛；虛則氣逆，欬欬則短氣暮；則甚。陰氣至濕，氣生故甚。陰畏陽，氣晝日則瘥。若陽傷則熱，熱則實，實則氣喘息上胸膈甚，則唾血然。陽病治陰，陰是其裏，陰病治陽，陽是其表。是以陰陽表裏衰王之源故知。以陽調陰，以陰調陽，陽氣實則決，陰氣虛則引。善治病者初入皮毛，肌膚筋脉則治之。若至六腑，五臟半死矣。扁鵲曰：氣絕不治。一作奔而冷汗出二日死。氣應手太陰太陽氣絕則皮毛焦氣先死矣。

鍾乳散

治氣極虛寒，陰畏陽，氣晝暮甚，氣短息寒，亦治百病。令人力強能飲食去風冷方。

鍾乳研

乾薑

桔梗

茯苓

細辛

桂心

附子

人參

白朮

防風

桔梗根

牡蠣

各半右

十二味

治下篩酒服方寸匕，日三漸加至二匕。

五十以上可數服得力乃止。

有熱加苓各三兩

翼方云有冷加椒

六銖

六銖

六銖

六銖

六銖

六銖

研

衍義

氣極虛寒而用鍾附薑桂細辛參苓白朮，世所共能。

反用桔防之耗氣，桔梗之化熱，牡蠣之斂

陰，人所共昧。曷知耗氣專為救本，化熱專為散標，斂陰專為復陽，能達此義，則鍾乳白朮之反激亦可從此聆悟矣。腎臟門中寒食鍾乳散即此。

黃芪湯

治氣極虛寒，皮毛焦津液不通，虛勞百病虛損力乏方。

黃芪

四兩人參

白朮

桂心

各二兩

生薑

八兩大棗十枚附子

三十銖方不用

一

右七味㕮咀以水八升煮取二升去滓分四服

衍義

前方兼治標，執故須耗氣斂陰。此方專力救本，所以純用溫補，但加薑棗以和榮衛，通津液也。

大露宿丸

治氣極寒，癖不已，內舍於肺寒，氣入客於六腑，腹脹喘滿，寒冷積聚，百病方。

譽石

附子

各三兩

右六味為末蜜丸如梧子大，酒服十九日，三漸加之慎熱矣。

乾薑

桂心

皂莢

桔梗

附子

各二兩

右六味為末蜜丸如梧子大，酒服十九日，三漸加之慎熱矣。

火等

衍義

見前第十六卷，痼冷積熱門。

歸十二味為丸用治人天冷夏月溫飲食不解衣者  
克竟享之全無口脣酸楚餘旨故波

**歸十二**味為丸用治人大冷夏月溫飲食不解衣者

卷之三

治氣極傷軟端息虧摶常欲自憇心腹滿痛內外有熱煩嘔不安方 前胡八兩

黃芍

**藥** 各四兩 **生薑** 五兩 **黃芩** 三兩 **枳實** 一枚 **大棗** 十二枚 **右八味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服**

行義

氣極傷熱而用前胡麻黃開發於外半夏枳實消豁於內芩藥黃芩清解於中生薑大棗兼和

中外也

竹葉湯

治氣極傷熱氣喘甚則嘔血短少不欲食口燥咽乾方 竹葉二升麥冬 小麥 生地各一

生薑

右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服

衍義

氣極傷肺而至喘乏唾血用越婢全方以治旺氣惟恐津血愈傷故加竹葉以清營冬地以

澠津血

小麥以除腫燥然小麥入於越婢方中則與厚朴麻黃湯中匡佐麻黃石膏發越內動肝風異

卷之三

卷之三十一

名太倉七  
呻吟一編

**壯** 湿不三壯則火壯乃濕在肺從肺中橫之 肺中雷喴利通食不化逆氣之上肺下一寸

積氣第五

論二首  
炎去二十四首  
方五十一首

論曰七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣凡七種氣積聚堅大如杯若積在心下腹中疾病不能飲食時來時去每發欲死如有禍祟此皆七氣所生寒氣卽嘔逆惡心熱氣卽說物不竟而迫怒氣卽上氣不可忍熱痛上搶心短氣欲死不得息恚氣卽積聚在心下不得飲食喜氣卽不可疾行不能久立憂氣卽不可劇作暮卧不安愁氣卽善忘不識人語置物四方還取不得去處若聞急卽四肢脇腫手足拘攣捉不能舉如得病此是七氣所生男子卒得飲食不時所致婦人卽產後中風諸疾也

七氣丸

烏頭

大黃各七  
紫菀

半夏

前胡

細辛

丹參

旋苓

川芎

桃仁

杏仁

葛蒲一  
作

藥石膏

吳茱萸

桂心

桔梗各三

人參

甘草

防葵各一

乾薑

川椒各半

右二十味為末蜜

丸如梧子大酒服三丸日三加至十九

一方去半夏加甘遂三分

胡洽無丹

參甘草

七氣丸

主七氣七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣此之為病皆生積聚堅牢如杯心腹絞痛

不能飲食時去時來發則欲死凡寒氣狀吐逆心滿熱氣狀恍惚眩冒失精怒氣狀不可當熱痛上蓋心

短氣欲絕不得息恚氣狀積聚心滿不得飲食喜氣狀不可疾行久立憂氣狀不可苦作卧不安席愁

氣狀平故如怒喜忘四肢附腫不得舉止亦治產後中風餘疾方

大黃一兩

人參

半夏

吳萸

桔梗

枳實

柴胡

乾薑

細辛

桔梗

菖蒲各二

茯苓

川芎

甘草

川椒一兩

桂心

石膏

桃仁各三

右十五

味為末蜜丸如梧子大每服酒下三丸日三服漸加至十九

翼方無旋苓川芎

廿草石膏桃仁

參甘草

大黃

半夏

人參

甘草

川椒

桂心

石膏

桃仁

右十五

行義

七氣丸首方雖用參桂薑半甘草之屬以治憂愁喜耗諸氣猶恐辛溫之力不逮不能治寒熱

恚怒諸氣所以更加烏萸椒辛助大黃防葵以破結桃芎丹苑以和血前結菖苓以散氣石膏一味專

泄旺氣耳其第二方較前用法稍緩不用烏頭防葵之峻力破結裁去紫菀丹參之紓緩粉龐又以柴

胡之升散易前胡之降泄設見筋攣不舉而無大吐嘔逆不妨以桂心之溫血易川椒之下氣未為不可

七氣湯

治寒氣熱氣憂氣勞氣愁氣或飲食為膈氣或勞氣內傷五臟不調氣衰少力方

乾薑

黃芩

厚朴深師作桂心

半夏

甘草

地黃

芍藥

桔梗根深師作橘皮

川椒各二兩

吳萸五合

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分三服日三〇又方

治虛冷上氣勞氣等方

半夏

一升

人參

生薑

桂心

甘草各一

右五味㕮咀以水一斗煮取三升分三服日二

衍義

湯丸主治有暴久微甚之分久而劇者非丸無以克應暴而虛者湯液便可宣通七氣湯首

方用椒薑萸半散結人參甘草助氣則與丸方無異若其人素羸血熱則兼芍地以化薑椒之燥芩姜

以清肺胃之熱枳朴以降之氣也

心滿不得氣息引背痛如刺之狀食則心下堅大如粉絮大痛欲吐吐卽瘥飲食不得下甚者及手足

冷上氣欬逆喘息短氣方 麥冬 甘草各五兩 人參四兩 川椒 遠志 桂心 細辛各三附子一兩

乾薑一兩右九味為末蜜丸微使津先食含如彈丸一枚細細咽之喉中胸中當軟藥力稍盡復含一

丸日三夜二服藥十日自愈

延年方若不能含者可分一大丸作十小丸盡服之夏月宜增麥冬甘草

梧子五丸空腹服之如寒冷則心痛咽

人參胡洽云亦可作梧子大小丸酒服之

經心錄以吳萸代桂心酒下如

梧子五丸空腹服之不出咽之不下飲食少者

中有物吐之不出咽之不下飲食少者

行義 噎之與膈本同一氣膈病之始靡不由噎而成原其大槩不外乎鬱故張雞峯以為神思間病

其受病之源非止一端嘗攷五噎之中獨多思噎五膈之中獨多飲膈每見多思慮人每患氣噎經謂

思則氣結是也好熱飲人每患酒膈丹溪謂之死血是也然血膈亦非止一端往往有勇力過甚血菀

於胃阻礙飲食成膈者卽如靈樞蟲為下膈亦不過言下膈有此一證若夫命門火衰不能溫養上藏

食辟時乃出者得非下膈之證乎而素問又有三陽結謂之膈言小腸大腸膀胱之津血俱結如廁澀

難下不通而上逆勢所必然所以五膈丸中不用萸木苓橘之燥而用麥冬上滋肺氣甘草中安胃氣

遠志下通腎氣上下交通何有阻隔之患乎其方雖列肺臟而飲食不下膈塞不通邪在胃脘其間所

用椒辛薑桂附子人參等味却與五噎丸中不異也

治結氣冷癥積在肠下及脚氣上入小腹腹中脹滿百病方

大蒜去心皮三升搗令極熱以水三升和

令調絞取汁更搗餘滓令熟更以水三升和令調絞取汁

合得九升所得滓可桃顆大棗之以微火煎取三升下牛乳三升合煮取三升旦起空腹一頓溫服令

盡至申時食三日服一劑三十日服十劑止

大蒜煎 治疝瘕積聚冷澼疾飲心腹脹滿上氣咳嗽刺風風癲偏風半身不遂腰疼膝冷氣息否塞百

病方 蒜六斤四兩去皮切水一升內半斗煮取一斗去滓取汁中各一兩牛乳 二升  
華荳各三 胡椒 乾薑各三 石蜜 阿魏 戎鹽各二 石菖蒲  
木香各一 乾胡桃四兩 右十二味為末內蒜汁中以銅器微火煎取一斗空腹酒下一兩五日已上稍加至三兩二十日覺四體安和更加至六兩此治一切冷氣甚良

行義 蒜氣穢濁用以治穢濁之疾同氣相感之用然在藜藿之人為當若素體清瘦者用之反傷清純之氣良非所宜其大蒜煎治諸冷癥否塞百病用椒薑華魏木香菖蒲胡蒜之烈以破積結牛乳乳酥石蜜戎鹽佐胡桃之潤以化辛烈也

桔梗破氣丸 治氣上下否塞不能息方 桔梗 橘皮 乾薑 厚朴 枳實 細辛 菖薺各三 吳萸 白朮各六 胡椒 川椒 烏頭各七分 菖薺十分 人參 桂心 附子 茯苓 前胡 防葵 川芎各五 甘草 大黃 檳榔 當歸各八 右二十四味為末蜜丸如梧子大每服酒下十九日三有熱者空腹服之

行義 上下否塞不能布息故用桔梗橘皮前胡以散痞防葵華薺大黃以蕩實檳榔枳實厚朴以泄滯烏頭附子細辛以破結川椒吳萸胡椒華薺以下氣乾薑桂心以溫中川芎當歸以和血人參白朮茯苓甘草以安正氣而助藥力也

檳榔湯 治氣實苦積聚不得食息方 檳榔三七 附子一枚半夏一升細辛一兩乾薑八兩大黃 紫

荳 柴胡各三 橘皮 甘草 紫蘇各三 茯苓各二 右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分三服相去如人行十里久若有癥結堅實如石加鱉甲三兩防葵二兩氣上加桑皮切二升枳實厚朴各二兩消息氣力強弱進二劑後隔十日更服前桔梗破氣丸

行義 金匱大黃附子湯本治寒積脇下偏痛發熱脈緊弦子金參入半夏生薑茯苓甘草橘皮紫蘇紫苑柴胡檳榔等味總皆大黃附子細辛三味之輔佐耳