

藥性切用

上
函
全

徐靈胎醫書三十二種

藥性切用

草部 宣類

吳江徐洞溪靈胎著

人參 大補能回元氣。於無有性味甘溫。肺家專藥。切用靈活五藏之虛。隨所引而至。益五藏之陽。生陰生血。陽自生而陰自長。退虛火。止煩渴。所謂甘溫能降大熱也。若大虛吐衄。生噯。嘔汗。乃氣不攝血。血脫益氣耳。參條補力稍減。有橫行手臂之功。參蘆湧吐虛痰。參鬚降泄虛逆。有一種小者。名曰太子參。氣質稍嫩。其用不下大參。參葉苦寒。雖有瀉熱生津之用。而苦寒之性。不甚益人。虛甚者忌之。珠兒參 甘寒微苦。入肺而瀉熱補虛。用代沙參之不及。性味稍沉。胃虛者不宜多用。會蘭參 補虛功在珠參之上。力近東洋元虛。挾微熱而消渴者較勝。其性甘涼可知。潞黨參 味甘微溫。補益中氣。藏平無火。元氣微虛者宜之。有一種西黨參。微甘帶辛。宜入補托藥用。白黨參 氣味辛劣。用之發散虛邪。不入補劑。紅黨參 味甘性潤。益血補虛。最為平穩。但力薄耳。西洋參 苦寒微甘。補氣清肺。氣味濃厚。功在珠參之上。胃虛不耐寒涼者。宜久製用。東洋參 氣味甘平。力能補虛退熱。無寒涼損胃之虞。殊勝西洋。足稱良劑。惟產虛羸弱久痢忌。高麗參 性溫氣浮。味甘純補。大能退表虛寒熱。稍遜人參之引用靈活耳。北沙參 甘淡性涼。補虛退熱。益五藏之陰。肺虛勞熱者最宜之。傷寒溫疫。肺虛挾熱者。亦可暫用。桔梗 辛苦性平。色白。入肺力能清咽利膈。表散外邪。肺氣滯於大腸者。宜桔梗開之。為諸藥舟楫。能引沉降之品。至於至高之分成功。有一種賁者。兼能解毒。又名薺薺。亦可偽參。甘草 性味甘平。生用緩中氣。瀉火。炙用溫元氣。補中和藥。解毒中滿忌之。節行肢節。頭入吐劑。稍入莖中。

藥性切用

姜糖 即玉竹甘平性潤補中益氣為溫風咽痛尚藥用代參著功力稍緩。

黃精 性味甘平。補益中氣。潤養精血。功力輕緩。稍遜玉竹一籌。

黃耆 性味甘溫。生用托邪實表。炙用補中益氣。但其性滯。不似人參之靈活。

白朮 苦甘性溫。生用豁痰利水炒焦燥濕健脾。製熟補脾潤燥炒黑止血醒脾。其利腰膝結血有健脾之功。蓋脾健氣運則結血自解。野生者氣清。於潛者力倍。種收者氣濁。第可調補錄用。斷難挽回生死。若陰虛燥熱。肝腎有動氣者均忌。

蒼朮 苦溫辛烈。燥胃強脾。發汗除濕。能升發胃中陽氣。辟惡解鬱。產茅山者。真米泔浸焙。亦有麻油炒者。燥結多汗忌。

天麻 味辛性溫。入肝經氣分。諸風掉眩。頭旋眼黑。屬風痰滯。伏者非此不除。濕紙色煨熟用。子名還筒。子能定風益虛。若血液衰少。非真有風邪者忌用。

秦朮 辛苦性平。祛風勝濕。活血舒筋。入手足陽明。肝胆亦治。骨蒸潮熱。利大小便。左紋者良。

柴胡 味苦微寒。生用升陽解表。能引清氣上行。而平少陽厥陰之邪熱。止諸瘧寒熱。入肝胆心色三焦。酒炒則引入血分。治熱入血室。鹽水炒除煩熱。蜜炒退骨蒸。醋炒則入肝經。而調經散結。為解表和裏之尚藥。性雖上升。多用不能下泄。其稍尚於達下。其苗搗汁。滴治耳聾。若陰虛無邪。氣升火炎者。均為切禁。

均為切禁。

銀州柴胡 較軟。柴胡性味稍平。入肝腎而尚治虛勞。煩熱骨蒸。髓熱幹長微白者良。

前胡 苦辛甘平。入肺而消痰下氣。解熱疎風。為風邪欬嗽之尚藥。氣香質嫩者良。外無感者勿用。按柴胡前胡均是風藥。但柴胡性升。前胡性降。為異。

川獨活

辛苦微溫氣緩善搜入足少陰氣分以理伏風而勝濕痺癰濕痺並宜之

西羌活

性苦性溫氣雄而散入足太陽經以理遊風而勝濕解利周身百節之痛為撥亂反正之藥

如血虛身痛頭疼不因風寒濕邪者二活並忌

青防風

辛苦微溫入足太陽經搜肝瀉肺又行脾胃二經為去風勝濕之要藥無外邪者勿用

綠升麻

甘辛苦平入手足陽明太陰生用表散風邪升散火鬱炒用能升陽氣於至陰之下引甘溫之

藥上行以補衛氣之散而實其表陰虛火升者忌之按柴胡生麻均是升藥但柴胡從左升引少陽清氣

上行升麻從右升引陽明清氣上行為異

北細辛

性溫味辛表散寒邪兼祛浮熱乃手少陰引經足少陰本藥味極辛能行水氣以潤燥性極

烈不可多用獨用

遠志

苦性辛溫散鬱洩熱入手少陰經能通腎氣上達於心利九竅交心腎甘草水浸用若純虛無滯

鬱者勿用

葉名小草止洩益陰

金毛狗脊

苦甘微溫滋腎益肝除風虛濕脾強腰脚利機關為滋補虛痺良藥

浮羊藿

辛香甘溫入腎肝而興陽益精羊脂拌炒用相火易動者遠之

巴戟天

甘辛微溫入腎命血分除風氣脚氣強壯腰膝酒浸焙用陰虛相火熾者忌之

瑣陽

性味甘溫入腎命而興陽潤燥大便滑泄強陽精不固者均忌

肉蓯蓉

甘酸鹹溫入腎命血分潤燥興陽峻補精血功近瑣陽酒浸洗去甲酥炙用禁忌亦與瑣陽相同

肥白朮

苦辛性平氣濇而收質潤兼補入肺止吐血衄血肺損者能復生之

參三七

甘苦微溫散血止血定痛能損新血吐血衄血無瘀者勿服草三七功用相似性味稍烈藜蘆輩

宜暫用之。

地榆 苦酸微寒。性沉而瀉。入下焦血分。除血痢。止腸風。俱炒炭用。稍反行血。與根相反。

紫丹參 味苦。赤色。氣平。而降入心。與包絡。破宿血。生新血。兼四物為女科要藥。雖能補益。長於行血。血

虛無瘀者勿用。

元參 苦甘微寒。入肺腎二經。除煩止渴。解毒利咽。瀉無根浮游之火。脾虛泄瀉。忌亦為焙熟用者。

苦參 大苦燥濕。大寒勝熱。沉降入腎。功專解毒消癰。肝腎虛而無濕熱者忌之。

龍胆草 大苦大寒。沉陰下行。入胆肝瀉火。兼入膀胱腎經。以除下焦之濕熱。酒洗亦能上行。大損胃氣。

無實火者忌用。

川黃連 大苦大寒。入心瀉火。而燥脾濕。瀉火生用。燥濕炒用。豬胆汁炒。治肝膽火。酒炒。治上焦火。姜

炒。治中焦火。鹽水炒。治下焦火。吳茱萸湯炒。治濕熱在肝膽氣分。醋炒。治濕熱在心脾血分。無實熱者均忌。

連非川產。反能瀉人。

胡黃連 性味苦寒。瀉瀉熱。益肝膽。厚腸胃。治大人骨蒸。小兒疳熱。禁忌同川黃連。

黃芩 性味苦寒。瀉肺火。退寒熱。中虛者名枯苓。入肺以清肌表之熱。內實者名條苓。入大腸而清熱。安

胎瀉火。生用退寒熱。酒炒用。

紫草 甘鹹氣寒。入厥陰分。而涼血活血。為痘瘡血熱專藥。便滑者忌之。

肥知母 辛苦寒滑。瀉陽明有餘之熱。滋少陰不足之陰。潤燥上效。除煩安胎。酒浸炒清。上鹽水

炒。滋下便滑者均忌之。

川貝母 味甘微寒。涼心散鬱清肺。而化熱痰。象貝形堅。味苦瀉熱。功勝不能解鬱也。土貝形大味

苦瀉熱解毒外科尚藥俱去心用之。

白頭翁 苦堅腎寒涼血入陽明血分兼入厥陰除熱痢下重血分無熱者忌之。

白前 辛甘微寒入肺而消痰降氣能除肺實氣壅肺虛者忌之。

白薇 苦鹹微寒陽既銜任之藥退熱益陰宜於血熱血虛者忌之。

白茅根 性味甘寒入肺而涼血止血針可潰膿花能止衄。

白蘚皮 味甘性燥氣寒善行入脾胃而除濕熱兼入小腸膀胱行水道利竅通關為諸風頑痺尚藥下

部虛寒雖有濕症勿用。

延胡索 辛苦性溫入手足厥陰太陰能行血中氣滯氣中血滯生用破血炒用調血酒炒活血醋炒止

血必須炒黑若經事先期血虛崩中均忌。

落得打 性味甘平治跌打損傷金瘡出血並用其根煎湯洗之酒炒行血醋炒止血搗爛則粘可塗傷腫

開金鎖 性味苦平善祛風濕治手足不遂筋骨疼痛與蒼朮當歸同用甚效。

冬虫夏草 性味甘平滋腎保肺功崇止血化痰能已勞嗽冬在土中身活如老蚕有毛能動至夏則毛

出土上連身俱化為草若不取則至冬復化為虫。

錦地羅 性平微苦治山嵐瘴毒并諸中毒瘡毒以根搗汁酒服一錢即解。

水仙根 味苦微辛性寒體滑瀉熱解毒搗塗癰疽暴腫花名金盞銀台作香澤塗身去風氣又療婦

人五心煩熱。

醫畧六書約性切用卷之三

草部 芳草類

白當歸 甘辛苦溫。入心肝脾三經。為養血溫藥。血滯能通。血虛能補。血枯能潤。血亂能撫。頭止血而上行。身養血而中。手尾破血而下。行。全活血而流走。酒炒活血。醋炒止血。極善滑腸。泄瀉忌用。如不得已。土炒可以益脾。糯粉炒可以厚胃。用者詳之。

白芍藥 苦酸微寒。入肝脾血分。為手足太陰。行經瀉肝火。斂陰血。安脾肺。固腠理。乃血虛腹痛之常藥。瀉火生用。斂陰炒用。酒炒和血。醋炒止血。

赤芍藥 苦辛微寒。瀉肝火。散惡血。酒炒活血。醋炒亦能止血。必須炒黑。乃治血瘀。經絡不能歸經之血。如血虛者切忌。按白芍補而斂陰。赤芍散而瀉血。白益肝能於土中瀉木。故瀉痢虛弱宜之。赤能散邪。能行血中之滯。故傷寒實宜之。

川芎 辛溫升浮。入手足厥陰。為足少陽引經升清陽。而開諸鬱。潤肝燥。而補肝虛。上行頭目。下行血海。乃搜風散滯止痛。調經之專藥。但辛竄之劑。氣升火炎者忌。單服久服。令人暴亡。

牡丹皮 辛苦微寒。入手足少陰。厥陰瀉血中伏火。散瘀除煩。退無汗之骨蒸。生用涼血。酒炒和血。姓婦忌之。澤蘭葉 味苦甘辛。氣香微溫。入足太陰。厥陰泄熱。行血利竅消腫。為產科專藥。無瘀勿用。按澤蘭走血

分。消水腫。是治血化為水之水藥。蘭香草一類二種。走氣分。為消渴良藥。即數食肥甘。傳為消渴治之。以蘭除陳氣也。

馬蘭根葉 性味辛涼。瀉熱解毒。為明血分之藥。

川鬱金 辛苦微甘。氣香性寒。入心與包絡。兼入肺肝。涼心散鬱。破血下氣。為氣中血藥。婦人經脈逆行。血氣刺痛。摩服効速。若吐衄不因氣逆者忌。唐鬱金。破氣破血。少解鬱化氣之功。草鬱金。性味尤烈。藜蘆體實。暴怒氣逆。血滯者。可以暫用。

姜黃 味苦辛溫。色黃入脾。兼入肝經。破氣散血。烈於鬱金。片子姜黃。橫行手臂。理血中之氣。可為風寒濕痺引經。

蓬莪朮 辛苦性溫。氣中血藥。入肝散瘀。行氣癥瘕。癖醋摩醋炒。烈於鬱金。虛人酌用。

荊三棱 性味苦平。血中氣藥。入肝破瘀。開結消堅。積老塊。醋炒麴煨。其力峻於蓬朮。虛人忌之。

金香附 即莎草子。辛苦微甘。氣香性溫。入十二經。能行血中之氣。解鬱調經。安胎利產。為女科常藥。生

用上行胸膈。外達皮膚。炒用下達腎肝。旁徹腰膝。鹽水炒軟。堅潤下。童便製散。瘀除蒸。青鹽炒。入腎調氣。

酒浸炒。入肝行經。醋浸炒。消積聚。姜汁炒。化痰飲。四製調經。炒黑止血。陰血燥。均當忌之。

廣木香 辛苦苦溫。入三焦氣分。升降諸氣。力能泄肺疎肝。和脾安胎。調氣生摩。厚腸煨用。有一種青

木香。味稍較苦。功崇入肝疎逆。為疝氣常藥。馬兜鈴根。亦名青木香。亦可治疝。性稍涼耳。

砂仁 即縮砂蜜。辛溫香。竄入脾胃。而快氣調中。通行結滯。止痛安胎。多服耗氣。炒研去衣用。

白豆蔻 性味辛溫。流行三焦。快膈散滯。為肺家本藥。兼入脾胃。去殼炒研用。穀主寬胸開胃。力較薄耳。

草豆蔻 辛溫。氣散燥。濕散滯。溫胃祛風。微炒用。

草果 性味辛烈。入胃而破氣除痰。消食化積。炒熟取仁用。按草果知母。一陰一陽。草果治太陰獨勝之

寒。知母治陽明獨勝之熱。

肉豆蔻 即肉果。性溫氣香。煖胃醒脾。固中澀腸。麴裏。或糯粉包。煨研細用。吐瀉初起忌之。

破故紙 即補骨脂。辛苦大溫。入心包命門。補火生土。燥濕止瀉。鹽水炒用。多服單服。能下氣。

益智仁 性味辛溫。入脾而兼入心。命門。益智能通。君相補火。攝涎。縮小便。鹽水炒用。泄瀉遺濁。有熱

者均忌。

蛇床子

辛苦性溫入腎命。而祛風燥濕除下體濕痒。惡瘡為外科專藥。

萆薢

性味辛熱。逐胃冷祛痰涎下氣。散浮熱止牙痛頭痛。錯焙用。性能耗氣動火不可多用。

高良姜

辛熱性烈祛寒逐冷。除中脫作痛如冰子。名紅豆蔻。性稍輕浮入脾肺而祛寒散結。微炒用。

廣霍香

辛溫芳香入手足陽明太陰二經。力能醒脾祛暑。快胃辟穢。為吐瀉腹痛專藥。梗主和胃化

氣而少溫散之力。

土霍香

但能溫胃。殊欠芳香之用。鮮藿滴露氣味清徹。善能達邪暑。症寒熱最宜。

白芷

性味辛溫色白入肺氣香入脾。發手足陽明之表。祛風燥濕治頭面口齒諸疾。血虛火痰者忌之。

藁本

辛溫氣雄善祛風寒濕邪。入太陽而兼治督脉頭痛上連巔頂帶濁。由清陽下陷必需之。

香薷穗

性味辛溫散暑理濕。為夏月胃暑解表之藥。無表邪者忌。

荊芥穗

辛苦性溫芳香氣散入肺肝氣分兼入血分。為風邪血病之藥。治風生用。治血炒黑用。然惟

風在皮裏膜外者宜之。若風入骨肉又須防風不得混用。

紫蘇葉

辛溫色紫入肺而祛寒發表。調氣和血。安胎定喘。氣虛者禁用。蘇子消痰理嗽。散鬱定喘。炒

所用。腸滑者忌。

蘇梗順氣安胎。功力稍緩。虛人最宜。

雞蘇

即水蘇。又名龍腦。薄荷性味雖與紫蘇相近。但辛烈走氣不入湯劑。

薄荷葉

性味辛涼散風熱清利頭目。搜肝肺宣滯解鬱。但辛香耗氣多服損人。蘇產者良。

甘松香

辛溫芳香稍帶甘味。功尚調氣解鬱。開胃醒脾。香散甚於霍香。虛人量用。

山奈

性味辛溫中辟瘴散氣。烈於甘松。虛人不宜輕用。

嬌酣草

芳香辛溫溫中辟惡。禁忌同於山奈。

茉莉花 性味辛溫色白入肺芳香入脾功尚辟穢治痢虛人宜之
醫畧六書藥性切用卷之三下

草部 濕草類

鮮生地 味苦大寒稍帶微甘入心腎二經涼血散瘀瀉熱益陰為血瘀熱結之藥血分無實熱者忌之
乾生地 苦甘性寒沉陰主降入手足少陰厥陰兼入手太陽經液陰退熱涼血生血調經安胎利大小
便為陰虛挾熱之藥脾虛泄瀉胃虛食少者均忌然亦有炒鬆炒炭用者蓋炒鬆能去血中之濕炒炭
能止濕熱傷陰之血也小生地功力甚薄只宜血熱之人根生地瀉血中之熱均無滋陰益血之功

瘡瘍痘疹並宜之

熟地黃 微甘微溫入足三陰經滋腎水封填骨髓養血液補益真陰為補陰壯水之藥陰虛無熱最
宜之但性能膩膈痰多氣鬱之人宜酌用亦有熟砂仁末拌炒鬆用者修製俱忌鐵器

旱蓮草 一名纏腸又名金陵草甘鹹微寒汁黑入腎益陰涼血功勝脾虛作瀉腎虛腹痛均忌

麥門冬 甘寒微苦清心潤肺瀉熱除煩為生津止嗽之藥去心用其性寒凝潤滑肺燥邪熱初解脾

胃虛寒泄瀉均忌然亦可糯粉炒用勿滑砂拌用鎖心

甘菊花 甘苦微寒清鬱熱兼益金水平肝木解熱熄風為明目清頭善解鬱熱之藥

菊葉搗汁能拯

疔毒垂危

穀精草 辛溫輕浮啟胃舒陽善發少陽陽明清氣功專明目退翳為眼科發光藥

草決明 即馬蹄決明一名決明子甘苦鹹平入肝除風熱退目翳為明目淬光藥

葉作菜食利五

藏以明目

青箱子 亦名草決明。味苦微寒。入厥陰。而除風泄熱。治目疾。腫子散大者忌。

木賊草 甘苦性平。治目疾。暴發。除翳膜。遮睛。去節。能發汗。多服損肝。賊目故名。

麻黃 辛溫微苦。入足太陽。兼入手少陰。陽明。而為肺家藥。為發汗散邪。通關利竅。風寒表實者宜之。

去節用。不可過劑。寒多痰喘。氣喘。屬邪實病痼者。根節獨能止汗。

刺薊 一名白薊。辛苦微溫。入肝而疎肝明目。解散風邪。微炒。或入乳拌蒸用。

沙苑薊 性味苦溫微瀼。固精補氣。強腰為腎虛遺精。不勝酸澁。為藥。鹽水炒所用。

益母草 一名茺蔚。辛苦微寒。入手足厥陰。行血去瘀。為經產藥。無瘀勿用。茺蔚子。性味畧同。更能

調經活血。令人有子。微炒。非血滯者不可用。

夏科草 辛苦微寒。入厥陰。而煖肝。解熱散結。消癰。久服亦能傷胃。

青蒿葉 苦寒芬芳。得春生之氣最早。入少陽厥陰。除煩清暑。退熱除蒸。為勞熱暑熱藥。梗兼和胃。

建連翹 味苦微寒。其性清浮。其形象心。入手少陰厥陰。兼入手足少陽。手陽明經。瀉火散結。解毒消癰。

多餌亦能減食。

紫花地丁 辛苦性寒。瀉熱解毒。為外科敷治藥。

漏蘆 性味苦鹹軟。堅消癰。瀉熱解毒。為外科藥。

大力子 一名惡實。一名牛旁子。一名鼠粘子。辛苦微寒。入肺而疎風散結。瀉熱清咽。消斑疹。利二便。腸

滑者忌。亦有土炒用者。

大小薊 甘苦性涼。俱能涼血散瘀。但小薊力微。不能如大薊之能消癰毒。

馬鞭草 味苦微寒。破血通經。殺虫消脹。取苗葉用。虛人忌之。

劉寄奴

性味苦溫。破血通經。除脹止血。莖葉花子皆可用。多服令人吐利。

紅花

古名紅藍花。辛苦甘溫。入肝治血少用。活血多用。和血多用。破血行血。

子散血結。葉塗癰腫。

王不留行

甘苦性平。行走不住。善入血分。通經下乳。乃陽明衝任之藥。取苗子漿水浸。蒸熟用。孕婦及

氣血虛人並忌之。

瞿麥穗

性味辛寒。利小腸而降心火。逐膀胱濕熱。為通淋要藥。即落陽花。取莖殼用。

篇蓄

一名扁竹。辛味苦平。利水通淋。為治疸消腫要藥。

車前子

性味甘寒。入膀胱而兼入肺肝。為利水清熱之藥。開水竅。以安精竅。令人生子。強壯。炒研用。腎

虛氣陷。及精竅滑泄者。均忌。車前葉。性味相近。清熱功勝。兼能涼血明目。莖葉勿可並使。

燈心

甘淡微寒。降心火而利小腸。兼清肺熱。燈草燒灰。吹喉痺。塗乳止夜啼。中寒小便不禁者勿服。

地膚子

甘苦微寒。入膀胱而除浮腫。利小便而通淋閉。炒研用。葉作浴湯。去皮膚風熱丹腫。

冬葵子

甘寒淡。滑利數滑胎。根葉同功。花分赤白。治白帶下。赤者亦治血淋。

海金沙

甘寒淡。滲除小腸膀胱血分濕熱。為血淋要藥。

茵陳蒿

性味苦寒。入足太陽。兼入足太陰陽明。尚利濕熱。為黃疸君藥。

貼莖蘆

辛苦大寒。入肺而兼入膀胱。其性急速。下氣定喘。喘鳴水氣噴急者。非此不能除。為瀉表氣分

濕熱要藥。取子炒研。苦者性劣不可輕投。

大青

苦鹹大寒。入心胃。而解斑毒。熱狂。取莖葉用。無實熱者忌。

漂青黛

性味鹹寒。色青。入肝解五藏鬱火。無實火者忌。

白蘆根

性味甘寒。入胃而降火止嘔。蘆筍能解魚蟹河豚毒。噉噉反胃。由中寒者勿服。

稀簽草 味苦微辛。生寒熱。溫入肝胃。而透骨搜風。理濕除痺。酒拌蒸晒九次。蜜丸亦可入煎。多服燥血。

旋覆花 苦辛鹹平。入肺大腸經。下氣定喘。軟堅化痰。為疎理風氣水濕。尚藥。蜜絹包。虛齋用。根能續筋。

紫菀茸 苦辛溫潤。入肺而化氣開結。理虛嗽止血。為治血疾。尚藥。陰虛肺熱。不宜多用。獨用亦可。鹽水。

或蜜水炒用。白者名女菀。功用相近。但入氣分為異。

款冬 性味辛溫。入肺而潤燥化痰。除煩止咳。為肺虛效。嗽尚藥。去梗用。花虛甚。蜜炙。

淮牛膝 苦酸性平。入足厥陰少陰。炒用性溫。益肝腎強筋骨。能引諸藥下行。生用利二便。散惡血。酒炒。

入肝。鹽水炒入腎。川產長於利濕。杜產名天明精。一名地松。去瘀功勝。氣陷便泄精滑者並忌。

川續斷 苦性微溫。入肝腎。而理傷。續筋通經安胎。酒炒用。

胡蘆巴 苦溫純陽。入腎命而主降。治疝。壯元陽。祛冷濕。為腎虛腹中冷痛之尚藥。炒用。陰虛火炎者忌。

蕪艾葉 味苦大辛。生溫熟熱。入三陰。而祛寒理血止痛。調經為煖子宮。尚藥。灸火通十二經。陽氣治寒。

濕痺痛。野艾。但能灸。火不入湯劑。

木綿 性味甘溫。燒火治血崩金瘡。子散結治乳癰。油幸熱損目。有草木二種。

雞冠花 性味甘涼。尚去濕熱。治赤白利帶下崩中。子治腸風。苗塗瘡痔。與青箱子一類二種。

元寶草 性味辛寒。益陰而止吐血。生江浙田塍間。

雪裡青 味苦大寒。瀉熱解毒。搗汁灌咽喉。善開結閉。渣塗癰腫。能潰散。

萬年青 味甘性寒。瀉熱湯痰。搗汁入醋。少許灌之。立可吐痰。則咽喉自解。子善催生。

白米飯草 一名糯米飯草。性味甘平。潤肺止咳。益味和中。可治勞傷。花力尤勝。

淡竹葉 甘淡微寒。利小便。除煩熱。孕婦忌之。

蒼實 苦酸性平。益氣充飢。久服不餓。蒼實同。獨蒜甲片食。鹽米醋搗餅貼癰。兩炷香癰可化。血從便出。

蒼葉 味甘溫。利肺氣。通小便。陳久者良。

芭蕉根 味甘大寒。瀉熱解毒。寬脹消癰。搗汁用。

芋麻根 性味甘寒。破血解毒。止天行腹痛。搗汁用。軋麻亦可煎湯。無根麻亦可代。

萱草 性味甘涼。解利濕熱。快腸悅志。令人歡樂。無憂。故名合歡草。又名無憂草。根治沙淋。下水氣。

石龍芮 性味苦平。補陰氣不足。令人皮膚光澤。取子用。

董葉 一名水蘊。俗呼胡椒菜。性味甘寒。微辛苦。瀉除煩熱。下瘀血。為散結解毒。常藥。

狗尾草 一名光明草。性味辛寒。眼科拳毛倒睫。翻轉目臉。以三莖蘸水。夏去惡血。良。

敗醬 一名苦菜。性味苦寒。瀉熱毒。破血排膿。為外科常藥。取根苗用。

薇銜 一名鹿銜。南人名吳風草。味性苦平。理血中之濕。善治酒風濕痺。歷節諸痛。

馬蘭子 一名蠡實。性味甘溫。治寒疝冷積諸痛。

石龍芻 即龍鬚草。味苦微寒。通淋止痛。敗席有垢者。功勝。

酸醬 即燈籠草。性味苦寒。清肺止咳。佛耳草。治寒痰欬嗽。此治熱痰欬嗽。力能解利濕熱。亦治黃病。

鼠麴草 即佛耳草。性味甘平。除痰止咳。雜米粉作糗食之。咄美。荒年可以充飢。

醫畧六書藥性切用卷之四上

草部毒草類

川附子 辛甘大熱。入腎命。通行十二經。生用煖腎藏。以祛寒濕。熟用補命火。以回元陽。鹽水炒黑。湯入。

腎藏燥濕。功勝兼益元氣。下寒上熱。裡寒外熱之症最宜。

川烏頭 即附子之母。氣味清疎。善祛風寒濕痺。不能如附子。有頃刻回陽之功。痺症氣實者宜之。姜汁炒。或生用。寒疾宜附子。風疾宜烏頭。烏附六。性尚達。利用以湧吐濕痰最捷。

天雄 獨類無附。即雄附子。性味雖雄。但能溫經逐冷。不能頃刻回陽。濕痺寒甚宜之。側子 旁生。功立稍遜。能旁達四肢。但可發散寒痺。無附子之補力也。

漏蘆 初生未成。雖治冷痺惡瘡。非寒毒深痼勿用。

草烏頭 辛苦大熱。力能開頑痺。以化痰搜風毒。以勝濕。非生薑汁炒透。令人麻悶。仍須以生薑汁解之。虛人不可輕用。烏喙兩歧相合。性味不純。不堪服食。遠之可也。

白附子 辛甘性熱。入陽明而善祛遊走之風。能引葯勢上行。治頭面百病。虛者忌之。

天南星 一名虎掌。辛苦性溫。入肝脾肺。而祛風燥濕。散結除痰。麋湯泡炒用。陳胆星。臘月取南星末。入黃牛胆中。和汁。風乾。尚化風痰。以益肝胆。年久彌佳。

半夏 辛溫性燥。入脾胃。而化痰止嘔。燥濕醒脾。生薑汁製透用。半夏糊。以半夏末入麴作糊。盒生。

黃衣性。稍和緩。能治血虛伏濕之痰。霞天麴。以霞天膏渣入半夏末。和造。龜成。能治中虛沉痼之痰。霞天膏。以嫩黃牛肉煮取淨汁。煎煉成膏。大補中虛羸弱。按南星半夏。均是燥藥。但南星治風痰。半夏治。

濕痰。為不同。

常山 辛苦性寒。吐痰逐飲。能截諸瘧。虛人忌之。按常山吐瘧痰。藜蘆吐風痰。瓜蒂吐熱痰。烏附。

六吐濕痰。菜菔子吐氣痰。蜀 即常山苗。功用相近。性稍輕楊耳。

藜蘆根 辛寒至苦。入口即吐。善於通項。令人嚏。虛人慎用。紫大戟 辛苦性寒。泄閉瀉水。按大戟能瀉藏府水飲。甘遂能行經絡水飲。白芥子能散皮裡膜。

外痰氣 三味全劑名 控涎丹 虛人不可輕用。

甘遂 性味苦寒。入腎經。瀉隧道。水飲直達。水飲所結之處。麤裡根氣。非大承之實。不可輕用。

商陸 性味苦寒。沉陰下行。與大戟甘遂同功。取白花之根。黑豆拌蒸。脾虛者忌用。

芫花 性味苦溫。通行水飲。痼癖醋炒。用毒。性至緊。取効甚捷。稍涉虛者忌。

續隨子 一名千金子。性味辛溫。行水破結。利大小腸。去殺。姦細。去油皮。脾虛便滑者忌。

牽牛 性味辛熱。入肺而兼入腎。命大瀉水飲。而走精髓。通下焦。鬱遏大腸風秘。氣秘有黑白二種。黑者

力速。又名黑白二丑。取子淘淨。炒所用。氣虛者忌之。

蓖麻子 辛甘性熱。善走亦善收。能出有形滯物。外用頗奏奇功。氣頗近。已豆內服。不可輕試。

芫花 一名管仲。味苦微寒。瀉邪熱。解毒。

射干 一名烏扇鳥。翼性味苦寒。入太陰厥陰。能瀉實火。火降則血散腫消。而痰結自解。為咽喉腫痛藥。

蚤休 一名重樓金線。味苦微寒。常治癰疽蛇毒。為外科常藥。

玉簪 一名白鶴仙。即白鶴花根。辛甘性寒。塗癰腫。解諸毒。最能損齒去牙。

川大黃 大苦大寒。入足太陰。手足陽明厥陰。其性沉陰降泄。酒製亦能上行。瀉滯腸胃。為攻下實熱之

品。藥。生用更峻。苟非實熱內結。不可輕投。

藺如 性味辛寒。破癥瘕血結。除熱痺排膿。素問四烏鯁骨。一藺如丸。用以治婦人血枯。血結甚効。

天名精 一名地松。一名活鹿草。一名蝦蟆藍。辛甘性寒。能除熱吐痰。破血解毒。根名杜牛膝。功用相

同。鶴蟲即天名精子。性味苦寒。殺虫治蛇。為蛇咬腹痛常藥。

山慈如 甘微辛寒。功常清熱解毒。散結消癰。搗塗蛇虫狂犬傷。

茵芋 辛苦微溫。治風濕拘攣。痺痛多熱用。

莽草 辛苦微溫。祛風勝濕。煎沐頭風。痼疾不入湯劑。

仙茅 性味辛熱。入腎命而助火興陽。治虛勞失溺。或虛陽溺閉。尚於補火助陽。惟精寒火衰者宜之。有

火者切忌。糯米泔浸去毒用。

蒼耳子 一名棠耳。即詩卷耳。甘苦性溫。善於發汗解散。風濕上通腦頂。下行足膝。外達皮膚。去刺酒蒸。

虛人忌之。

鳳仙子 一名急性子。微苦微溫。性急通竅。催生墮胎。透骨損齒。與玉簪根同功。花甘溫性滑。活血能

消積聚。根葉苦甘微辛。散血通經。塗打撲腫痛。

木鱉子 味苦大寒。力能利腸。治瘡消腫。追風僅可。外科敷治。不入湯藥。

土連翹 性味苦溫。入血分。以祛風寒濕痺。大損新血。無瘀勿用。

烟草 一名相思草。思味辛溫。入口而頃刻能周一身。令人胸次爽快。辟穢禦瘴。然過嗜則火氣灼人。耗

血損元。養生家宜遠之。

醫畧六書藥性切用卷之四中

草部蔓草類

何首烏 甘苦微溫。益肝補腎。為平補陰血之良藥。有赤白二種。黑豆拌九蒸九晒用。修製忌鐵。腸滑者

禁。亦有土拌炒用者。活血亦須酒炒治痺宜之。

菟絲子 甘辛微溫。入足三陰。強陰益精。為腎虛平補良藥。取子搗蒸作餅。或去油炒研用。

覆盆子 甘酸溫。補益肝腎。為固精縮小便藥。潤淨搗餅。或炒研用。葉能收濕。為末摻瘡。濕爛。