

本草類方卷之九

崩中漏下第一百三

婦人血漏

伏龍肝半兩阿膠蠶沙炒各一兩爲末每空肚酒服二三錢以知爲度。寇氏衍義

婦人崩中

百草霜二錢狗膽汁拌勻分作二服當歸酒下。經驗方

婦人血崩

赭石火煨醋淬七次爲末白湯服二錢。普濟方

女人血崩

貫衆半兩煎酒服之立止。集簡方

崩中漏下

青黃赤白使人無子禹餘糧煨研赤石脂煨研牡蠣煨研烏賊骨伏龍肝炒桂心等

分爲末溫酒服方寸七日服忌葱蒜。張文仲備急方

婦人血崩

金絲草海栢枝砂仁花椒蠶退紙舊錦灰等分爲末煮酒空心服陳光述傳。談埜

翁方

婦人崩中

益智子炒碾細米飲入鹽服一錢。產寶

婦人崩中

獨聖散用防風去蘆頭炙赤爲末每服一錢以麵糊酒調下更以麵糊酒投之此藥

累經効驗一方加炒黑蒲黃等分。經驗方

崩中下血

黃芩爲細末每服一錢霹靂酒下以秤鍾燒赤淬酒中也許學士云崩中多用止血

及補血藥此方乃治陽乘陰所謂天暑地熱經水沸溢者也。本事方

漏血欲死

鷄蘇煮汁一升服之。梅師方

婦人血崩

三七研末同淡白酒調一二錢服三服可愈加五分入四物湯亦可。瀕湖集簡方

下血血崩

血如山崩或五色漏帶並宜常服滋血調氣乃婦人之仙藥也香附子去毛炒焦爲

崩中不止

末極熱酒服二錢立愈昏迷甚者三錢米飲下亦可加櫻灰。許學士本事。荆芥穗於麻油燈上燒焦爲末每服二錢童子小便服此夏太君娘娘方也。婦人

婦人血崩

新縮砂仁新瓦焙研末米飲服三錢。婦人良方。

崩中漏下

石韋爲末每服三錢溫酒服甚效。

崩中下血

晝夜不止千金方用芎藭一兩清酒一大盞煎取五分徐徐進之。聖惠加生地黃

汁二合

同煎

崩中下血

小腹痛甚者芍藥一兩炒黃色栢葉六兩微炒每服二兩水一升煎六合入酒五合

再煎七合空心分爲兩服亦可爲末酒服二錢。聖惠方

婦人血崩青礬二兩輕粉一錢為末水丸梧子大每服二三十九新汲水下○摘玄方

崩中漏下青黃赤白使人無子好墨一錢水服日三服○肘後方

血崩帶下赤芍藥香附子等分為末每服二錢鹽一捻水一盞煎七分溫服日二服十服見効

名如神散
○良方

血崩不止夏枯草為末每服方寸匕米飲調下○聖惠方

婦人血崩血氣痛不可忍遠年近日不瘥者雷氏木賊散主之木賊一兩香附子一兩朴硝半

兩為末每服三錢色黑者酒一盞煎紅赤者水一盞煎和滓服日二服臍下痛者加

乳香沒藥當歸各一錢同煎忌生冷硬物猪魚油膩酒麵○醫壘元戎

崩中下血大小薊根一升酒一斗漬五宿任飲亦可酒煎服或生搗汁溫服○又方小薊莖葉

洗切研汁一盞入生地黃汁一盞
白米半兩煎減半溫服○千金方

傷中崩赤

醍醐杵汁拌酒煎沸空
心服一盞○千金方

婦人崩中

連日不止熟艾鷄子大阿膠炒爲末半兩
乾姜一錢水五盞先煮艾薑至二盞半傾
出入膠烊化分三服一日
服盡○初虞世古今錄驗

血崩不止

木苒根四兩酒一盞煎七分
空心溫服○臞仙乾坤生意

婦人血崩

凌霄花爲末每酒服二錢
後服四物湯○丹溪纂要

崩中漏下

桑耳炒黑爲末酒服方寸
匕日三服取效○千金方

崩中痢下

治婦人崩中及下痢日夜數十起欲死者
以此入腹卽活懸鈎根薔薇根柿根菝葜

各一斛剉入釜中水淹上四五寸煮減三
之一去滓取汁煎至可丸丸梧子大每溫

大直頂

崩中漏下

三

酒服十九日三服。千金翼。

崩中下血

不問年月遠近用槐耳燒存性爲末每服方寸匕溫酒下。產寶方。

崩中漏下

木耳半斤炒見烟爲末每服二錢一分頭髮灰三分共二錢四分以應二十四氣好酒調服出汗。

孫氏集效方。

崩中下血

用湖鷄腿根一兩擣碎酒二錢煎一錢服。瀕湖集簡方。

崩中下血

陳年蒸餅燒存性米飲服二錢。

婦人血崩

草血竭嫩者蒸熟以油鹽姜淹食之飲酒一二盃送下或陰乾爲末姜酒調服一二

錢一服卽止生于磚縫井砌間少在地上也。危亦林得效方。

崩中漏下

不止者桃核燒存性研細酒服方寸匕日三。千金。

產後崩中

下血不止。菖蒲一兩半。酒二盞煎取一盞。去滓分三服。食前溫服。○千金方。

血崩不止

白扁豆花焙乾為末。每服二錢。空心炒米煮飲。入鹽少許調下。即効。○奇効良方。

阿伽陀丸

治婦人血崩。用胡椒紫檀香鬱金茜根小藥皮等分為末。水丸。梧子大。每服二十丸。

阿膠湯下。○時珍曰。按酉陽雜俎。胡椒出摩伽陀國。此方之名因此。而訛者也。

漏胎下血

蓮房燒研。麴糊丸。梧子大。每服百丸。湯酒任下。日二。○朱氏集驗方。

血崩不止

諸藥不効。服此立止。用甜杏仁上黃皮燒存性。為末。每服三錢。空心熱酒服。○保壽

堂方

赤白崩中

舊葫蘆瓢炒存性。蓮房煨存性。等分研末。每服二錢。熱水調服。三服有汗為度。即止。

甚者五服止。最妙忌房事。發物生冷。○海上方。

血崩不止 老絲瓜燒灰棕櫚燒灰等分 鹽酒或鹽湯服。奇效良方

婦人白崩 扶楊皮半斤牡丹皮四兩升麻牡蠣煨各一兩每用一兩酒二鍾煎一鍾食前服。

集簡方

崩中下血 荷葉燒研半兩蒲黃黃芩各一兩為末每空心酒服三錢

血崩不止 不拘冷熱用蓮蓬殼荊芥穗各燒存性 等分為末每服二錢米飲下。聖惠方

血崩不止 烏梅肉七枚燒存性 研末米飲服之日二

血崩不止 桂心不拘多少砂鍋內煨存性為末每米飲空腹服一二錢名神應散。婦人良方

婦人崩中 晝夜不止丁香二兩酒二升煎一升分服。梅師方

婦人血崩 鳧茈一歲一箇燒存性 研末酒服之。李氏方

血崩不止

胡桃肉五十枚燈上燒存性研作一服空心溫酒調下神效

血痢血崩

椿樹皮荊芥等分爲末冷醋調服一錢血崩以煎七服神效不可具述○危氏得效方

婦人血崩

黃絹灰五分棕櫚灰一錢貫衆灰京墨灰荷葉灰各五分水酒調服卽止○集簡方

血崩不止

好綿及婦人頭髮共燒存性百草霜等分爲末每服三錢溫酒下或加棕灰○東垣

崩中赤白

方用白綿子蓮花心當歸茅花紅花各一兩以白紙裹定黃泥固濟燒存性爲末每

崩中赤白

服一錢入麝香少許食前好酒服○乾坤祕韞用舊綿絮去灰土一月新蚕絲一斤

崩中赤白

陳蓮房十箇舊炊簞一枚各燒存性各取一錢空心熱酒下日三服不過五日愈

崩中赤白

不問遠近取槐枝燒灰食前酒下方寸匕日二服○深師方

崩中赤白

崩中漏下

五

血崩不止

槐花三兩黃芩二兩爲末每服半兩酒一盞銅秤錘一枚桑柴火燒紅浸入酒內調

服忌口。

乾坤祕韞

血崩不止

櫻樹皮燒存性空心淡酒服三錢一方加煨白礬等分。婦人良方

婦人尿血

船茹一斤洗淨河水四升半煮二升半分二服。千金方

崩中帶下

椒目炒礮細每溫酒服一錢。金匱鈞玄

崩中漏下

赤白用桑螵燒灰溫酒服方寸匕日二。千金

血露不絕

鋸截桑根取屑五指撮以醇酒服之日三服。肘后方

婦人漏血

不止槐花燒存性研每服二三錢食前溫酒下。聖惠方

下血血崩

槐花一兩櫻灰五錢鹽一錢水三鍾煎減半服。摘玄方

血崩不止

漆器灰樓灰各一錢栢葉煎湯下。○集簡方

崩中漏下

五色使人無子蜂房末三指撮溫酒服之大神效。○張文仲方

崩中腹痛

毛蟹殼燒存性米飲服一錢。○證治要訣

崩中下血

不止用白僵蠶衣中白魚等分爲末并華水服之。○日二千金黃蠶銀珠

婦人血崩

蠶沙爲末酒服三五錢。○儒門事親

婦人血崩

鯽魚一個長五寸者去腸入血竭乳香在內綿包燒存性研末每服三錢熱酒調下

婦人漏下

甄權曰鼈甲醋炙研末清酒服方寸七日二。○又用乾姜鼈甲訶黎勒皮等分爲末

糊丸空心下三十丸日再

崩中不止

蠶故紙一張剪碎炒焦槐子炒黃各等分爲末酒服立愈。衛生易簡方

赤白崩中

魚縱膠三尺焙黃研末同雞子煎餅好酒食之

血崩不止

頌曰用五靈脂十兩研末水五盞煎三盞去滓澄清再煎爲膏入神麴末二兩和丸

梧子大每服二十丸空心溫酒下便止極効。集要用五靈脂燒研以鐵秤錘燒紅

淬酒調服以効爲度

婦人血崩

鹽黃散治下血淋瀝疼痛用鹽黃蠶脫紙並燒存性晚蠶沙白僵蠶並炒等分爲末

入麝香少許每服二錢用米飲送下日三服甚效。聖惠方

崩中垂死

肥羊肉三斤水二斗煮一斗三升入生地黃一升乾薑當歸各三兩煮三升分四服

金。千

婦人血崩

老母豬屎燒灰酒服三錢。李樓方

赤白崩中

豬毛燒灰三錢以黑豆一椀好酒一碗半煮一碗調服

女人漏血

亂髮洗淨燒研空心溫酒服一錢。婦人良方

赤白崩漏

蘊燒灰酒服二錢白崩用白蘊紅崩用紅蘊。海上

婦人血氣

卒下血不止清酒和豬血炒食之。思邈主治

崩中漏下

常灸豬腎食之。張文仲方

赤白痢

血痢

鼠中識

入血

赤白痢

女人血

赤白痢

入血

鼠中識
赤白痢
入血

赤白痢
入血

女人血
赤白痢

赤白痢
入血

入血
赤白痢

鼠中識
赤白痢

血痢
赤白痢

赤白痢
入血

赤白痢
入血

赤白痢
入血

本草類方卷之九

胎前第一百四

胎前產後

逆生橫生瘦胎產前產後虛損月候不調崩中百草霜白芷等分爲末每服二錢童子小便醋各少許調勻熱湯化服不過二服。杜壬方

胎動下血

或胎已死百草霜二錢櫻灰一錢伏龍肝五錢爲末每服一二錢白湯入酒及童尿調下。筆

峯雜興方

婦人胎動

十月未足欲產梁上塵竈突墨等分酒服方寸匕。千金方

妊娠腰痛

如折者銀一兩水三升煎二升服之。子母秘錄

胎動欲墮

痛不可忍銀五兩芎根二兩清酒一盞水一大盞煎一盞溫服。婦人良方

本草類方

胎前

胎熱橫悶

生銀五兩葱白三寸阿膠炒半兩水一盞煎服亦可入糯米作粥食。聖惠方

妊娠欬嗽

車釐一枚燒赤投酒中冷飲。聖惠方

妊娠心痛

不可忍鹽燒赤酒服一撮。產寶

妊娠下痢

疼痛用烏鷄卵一箇開孔去白留黃入鉛丹五錢攪勻泥裹煨乾研末每服二錢米

飲下一服愈是男二服愈是女。三因方

妊婦胎動

朱砂末一錢鷄子白三枚攪勻頓服胎死即出未出即安。普濟方

妊婦胎動

母欲死子尚在以此下之水銀朱砂各半兩研膏以牛膝半兩水五大盞煎汁入蜜

調服半匙。聖惠方

轉女爲男

婦人覺有妊以雄黃一兩絳囊盛之養胎轉女成男取陽精之全于地產也。千金

方

妊娠子淋

不得小便滑石末水和泥臍下二寸。外臺秘要

妊娠患淋

冬葵子一升水三升煮二升分服。千金方

妊娠尿難

飲食如故用貝母苦參當歸四兩爲末蜜丸小豆大每飲服三丸至十丸。金匱要畧

胎動不安

秦艽甘草炙鹿角膠炒半兩爲末每服三錢水一大盞糯米五十粒煎服。又方秦

艽阿膠炒艾葉等分

如上煎服。聖惠方

因驚胎動

出血取黃連末酒服方寸七日三服。子母秘錄

安胎清熱

條芩白朮等分炒爲末米飲和丸梧子大每服五十丸白湯下或加神麴凡妊娠調