

類證治裁卷之八

丹陽林珮琴義桐甫著

男 芝本校

調經論治

婦科首重孕育。孕育先在調經。素問曰。女子二七天癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。言天一之真精至。月信亦通。乃能孕子。謂之月事者。女子屬陰。其血如潮。應月之盈虧。有常期者也。故謂之經。儻一愆期。則失其常度。而諸病生焉。夫任主胞胎。衝爲血海。二脈流通。臟腑之血。皆滙注於此。衝任皆奇經。而血之生化。由脾胃。若七情內損。六淫外侵。兼之過食勞倦。致脾胃日虧。化源日薄。衝



任日衰神色日奪所重尤在調肝。蓋婦女善鬱。木失條暢。枝葉萎悴。肝不藏血。經之所由不調也。然不調之中有先期有後期有錯亂有痛經有倒經有居經有淋瀝不斷有枯閉不通經不準必不受孕。然參前數日受孕者有之。當經行食禁生冷。藥忌寒涼。以血得寒則凝滯不行。不慎禁忌則腹痛瘦泄亦致不調。且血隨氣行。經不調多由於氣。丹溪謂經來成塊者氣之凝也。將行作痛者氣之滯也。行後作痛者氣血虛也。先期而來者血熱。後期乃至者血虛。亦無不由氣也。錯經妄行者氣之亂也。色淡者虛而挾水也。紫者氣之熱。黑者熱甚也。乍少乍多淋瀝不斷者氣不攝血也。故調經必兼氣藥。更若臟損經閉則由悲傷肺憂傷心思傷脾怒傷肝。

房勞傷腎。肺傷則氣陷血脫。心傷則驚悸盜汗。脾傷則食減肌瘦。肝傷則髮焦筋痿。腎傷則淋帶骨蒸。甚至嗽熱泄瀉。衝任虧敗。源涸流竭。如素問云。二陽之病。發心脾。有不得隱曲。其在女子。爲不月。夫心主血。脾統血。因思慮過度。所願不遂。鬱而成損。則先經閉。而後乾嗽。累月經年。遂成乾血勞瘵。治難措手矣。古謂經前勿補。經後勿瀉。此爲經期腹痛者言之。其實調經之要務。令血氣和平。自然經準。受孕如陽太過。則先期。原因有火。然虛而生火。仍當養營。攝血。亦有無火而先期。或補中氣。或固腎關。不宜過用寒涼也。陰不及。則後期。本屬血虛。然有血熱而燥瘀者。宜清補。亦有血逆而留滯者。宜疏利。毋庸預執溫補也。其陰陽乖亂。錯經妄行。或由

火邪搏營遲早互見或由經氣舛逆口鼻上衝務審其虛實寒熱

而調之至於經期前後腹痛虛實懸殊經未行而先痛者血為氣

滯經通則痛自除經已行而猶痛者衝脈本虛血去則痛益甚滯

者理其氣溫而行之虛者培其營峻以填之設淋瀝不止必固以

攝之亦有腹愈痛經愈多至痛欲死者係火搏於血治宜行血如

歸等斂血如芩理脾如苓以益母破氣中之血以延胡破血中之氣

以香附開其鬱虛者加人參理脾則血有統破結則火痛悉除故

調經莫如益母延胡其經閉不行肥人多痰塞導痰湯加瘦人多

鬱火四物湯加丹皮山梔澤蘭因脾胃虧而食少者旺其運納之權歸芍異因

肝腎虧而骨蒸者壯其營陰之本地黃湯去萸澤加龜板五味子因思慮鬱損心

脾者。歸脾丸。小營煎。因勞嗽傷肺氣者。枳勞散。或溫養下焦。熟地沙苑

眼芡實。或宣通奇脈。杞子牛膝當歸。紫苑湯。若枯閉日久。輕用破血通經。子杜仲龍

則愈枯其枯矣。又有經後發熱倦怠。兩目如帛蔽不明。此脾腎精

華不能上注於目也。朝用補中益夕用地黃丸。至於七七數盡。當

斷不斷。或因氣血有餘。若已斷復來者。即為崩漏。宜固攝衝脈。補大

元煎。加續斷阿年高經或大行腹痛不止者危。膠海螵蛸兔絲。

經閉論治

潔古曰。經言月事不來者。胞脈閉也。胞脈屬於心。絡於胞中。今氣

上迫肺。心氣不得下通。故月事不來。先服降心火之劑。加芩連四

湯去。後服局方五補。後以衛生治脾養血也。李氏論經閉有二。曰

血滯血枯如經行時餘血一點未淨或外感風寒內傷生冷七情

鬱結為痰為瘀凝窒經絡為血滯或經盡後勞傷衝任欬嗽骨蒸

火逼水涸為血枯血滯經閉如當歸散元歸散以破瘀加味導痰湯以滌瘀滯

去則經通若血枯經閉多主傷肝素問云有病胸脇支滿妨於食

病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四支清目眩時時前後血病

名血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月

事衰少不來也治以四烏鰂骨一蘆茹二物并合以五丸為後飯

飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也蓋胸脇支滿肝病也妨食肝病傳脾也故聞腥臊臭出清液肝病肺乘也故唾

血四支清目眩肝血傷矣蘆茹即茜根能散血後飯先藥有因飲

也鮑魚汁利腸垢和肝傷取臭穢以佐烏鰂骨辟宿瘀也食勞倦損傷脾胃者節齋云只宜補養脾胃白朮為君茯苓芍藥為臣佐以黃耆甘草

陳皮、麥芽、川芎、當歸、柴胡。脾能生血，經自行矣。有因思鬱致損心血者，寇宗奭

云：童男室女，積想在心，思慮過度，男則神色消散，女則月水先閉。

蓋憂愁思慮多傷心脾，故神衰食減，火炎燦金，肺金燥，腎水絕，木

氣失榮，四肢乾痿，五臟傳遍死矣。能改易心志，用藥扶持。宜柏子

蘭湯益陰，制火忌。青蒿、蟲等涼血行血。凡經閉因血滯者，多凝瘀積痰。

牛膝散。若胃熱消渴，津液燥竭。玉燭散。若思鬱成損。歸脾湯。潮熱骨蒸。

加味逍遙散。室女經行復閉，羸熱成勞，肝脈弦出寸口，上魚際者。

加熟地龜板。宜加味小。若乾嗽。地黃湯、去丹澤、加甜。婦人經少漸閉。

急與婚配。柴胡湯。杏仁、五味、白芍、貝母。婦人經少漸閉。

五心煩熱，肌削脈數，乃陰虛陽乘，當養血益陰。人參固本丸。下利而經

斷者，利止經自來。若脈微濇，雖經止二三月不行，亦非胎，養血經

自行也。

經先期至者主血熱。加味四物湯。立齋分肝經血燥者。加味逍

經鬱滯者。歸脾湯。肝經怒火者。加味小柴胡湯。血分有熱者。加味四

動火者。補中益氣湯。景岳分血赤濃紫。脈洪多火而經早者。清化微

火陰虛內熱動血者。保陰煎。脈症無火。心脾不攝。經亦早者。小營

福飲。加杜仲五味子。若一月二三至者。乃氣血敗亂。當調其寒熱虛實。不

得以經早血熱概之。大約血熱者。腹多不痛。其來必多。固經丸

黃芩藥。

經後期至者主血虛。加味八珍湯。立齋分脾經血虛者。人參養

少者。地黃湯。氣血俱弱者。八珍湯。景岳分血淡不鮮。脈微遲無火而

後期者。大營煎。亦有陰火內燄。血本熱而仍後期者。乃水虧血少。

加味四物湯。地黃丸。過期作痛者。氣血兩虛。入珍湯。加木香。肥人過期色淡為瘕。

二陳湯。加芎歸貝母。大約血虛者。腹多空痛。脈大無力。或濡細。入物湯。加香附。

經亂遲早無定。午前午後多因心肺虛損。滋血湯。或因受驚氣亂。經亦

亂者。茯神。棗仁。柏子仁。麥冬。下歸附丸。或氣盛於血。不受孕者。抑氣散。景岳分三

陰虧兼陽虛者。大營煎。去牛膝。憂思損心脾者。歸脾湯。七福飲。食少脾不健運。

宜溫燥者。理中湯。六君湯。脾虛不攝為淋漏者。保元湯。加杜仲。芡實。牡蠣。肝虛不藏。

多驚惕者。補肝散。去獨活。木瓜。加茯神。情志不遂。肝脾氣結。經期亂者。逍遙飲。

經痛有經前身痛拘急者。散其風。越痛散。加秦艽。有經前腹痛畏冷者。溫其

寒。調經飲。加薑桂。茴香。氣滯者行其滯。加味烏藥湯。血瘀者逐其瘀。通瘀煎。氣血

疝結者理其絡。失笑散。癥瘕痞脹者調其氣血。交加地黃丸。虛寒急痛

者溫其裏。煎五物。痛在經後者補其虛。八珍湯。一切心腹攻築脇

肋刺痛月水失調者和其肝。元胡索散。經滯臍腹痛不可忍者

導其壅。琥珀散。從本事方改訂并治產後惡露不快血上搶心迷悶不醒氣絕欲死。

中痛。當歸芍藥湯主之。此補中瀉木又云婦人腹痛。小建中湯主之。此亦補脾

伐肝之意。

色經凡經以色紅為正其紫者風也。四物湯加荆防白芷。黑者熱甚也。四物湯加芩連。

紫黑兼腹痛者氣血併也。四烏湯加蓬朮川連。不痛者。但加川連。淡白者虛而

兼帶也。芎歸湯加參耆朮芍。赤白兼臍腹冷痛者虛寒也。伏龍肝湯。如米泔水

如屋漏水或帶黃混濁模糊者淫痰也。六君湯加蒼朮香附。如豆汁者熱



也。四物湯加丹參丹皮。成塊成片者。血隨氣凝。或風冷乘之也。通瘀煎。去澤泄。

入胞門。忽崩鮮血。一味防風丸。旋覆花湯下。

倒經。期氣逆直犯清道。而為吐衄。宜折其逆勢而調之。用山梔丹。皮生地丹。

參白芍蘇子鬱金童便。或用四物湯。和韭汁童便服。因怒火傷肝致逆者。龍膽丹。皮青皮。黃芩。白芍。山梔。

因心氣不足。衄血面黃者。茯苓補心湯。

居經。三月一行為居經。俗名按季。或由脈微氣血俱虛。或由寸口脈微而

濇。少陰脈微而遲。或由陽脈浮大。陰脈反弱。又一歲一行者為

避年。此因稟受不齊。勿與經閉同治。

淋瀝不止。症多氣不攝血。止經湯。子宮虛寒。淋瀝。膠艾四物湯。血分有熱不

斷。蒲黃散。

作多經水過多當歸過多淋瀝膠艾四物湯經水濇少四物加

調經脈候

尺脈滑血氣實婦人經脈不利。少陰脈弱而微則少血。寸口脈浮而弱浮則為虛弱則無血。脈來狀如琴絃苦少腹痛主月水不利孔竅生瘡。肝脈沈主月水不利腰腹痛。尺脈來而斷續者月水不利當患小腹引腰痛氣滯上攻胸臆。腎脈微濇為不月。

附方

八珍湯

見一卷中風

導痰湯

見一卷中風

氣血痰阻

補血補脾補腎心脾心勞嗽欬傷升補固攝降火

四物湯

見一卷中風

歸芍異功散

異功散見中風

此加

歸

芍各二錢

六味地黃湯

見一卷中風

歸脾湯

見二卷勞瘵

小營煎

歸地各二錢半
炙草一錢
茯神

白芍
杞子
棗仁各二錢

山藥各二錢

劫勞散

見二卷欬嗽

紫苑湯

見二卷肺癰

補中益氣湯

見一卷中風

大補元煎

見一卷中風

芩連四物湯

四物湯加

芩連



中國醫藥大學圖書館藏

心火 氣血 氣血 破瘀 破瘀 通瘀 通補 通補 通補 瀉熱 肝燥

三和湯

地

芍藥 歸

等

分

水煎

芍藥

地骨皮

等

分

蜜丸

酒

下

大黃

朴

三和湯

地

芍藥

歸

等

分

五補丸

參

地

芍藥

等

分

水煎

芍藥

地骨皮

等

分

蜜丸

酒

下

大黃

朴

五補丸

參

地

芍藥

歸

等

分

衛生湯

歸

芍藥

各

二兩

黃耆

三兩

炙草

一兩

每服

半

衛生湯

歸

芍藥

各

二兩

黃耆

三兩

炙草

一兩

每服

半

當歸散

歸

芍藥

劉寄奴

枳殼

延胡

沒藥

等

分

為

當歸散

歸

芍藥

劉寄奴

枳殼

延胡

沒藥

等

分

為

元歸散

元

胡索

當歸

每服

三錢

加薑煎

元歸散

元

胡索

當歸

每服

三錢

加薑煎

柏子仁丸

柏子仁

各

一兩

牛膝

卷柏

各

五錢

澤蘭葉

續斷

柏子仁丸

柏子仁

各

一兩

牛膝

卷柏

各

五錢

澤蘭葉

續斷

澤蘭湯

澤蘭葉

三兩

歸

芍藥

各

一兩

甘草

五錢

每服

澤蘭湯

澤蘭葉

三兩

歸

芍藥

各

一兩

甘草

五錢

每服

牛膝散

牛膝

一兩

歸

芍藥

各

七錢

為末

每服

三錢

酒調

牛膝散

牛膝

一兩

歸

芍藥

各

七錢

為末

每服

玉燭散

見六卷

腹痛

玉燭散

見六卷

腹痛

玉燭散

見六卷

腹痛

玉燭散

見六卷

腹痛

玉燭散

見六卷

腹痛

玉燭散

見六卷

腹痛

玉燭散

見六卷

腹痛

玉燭散

見六卷

加味逍遙散

見一卷

火

加味逍遙散

見一卷

火

加味逍遙散

見一卷

火

加味逍遙散

見一卷

火

加味逍遙散

見一卷

火

加味逍遙散

見一卷

火

加味逍遙散

見一卷

火

加味逍遙散

見一卷

肝怒益陰血熱火熱內熱心脾經多氣血虛

加味小柴胡湯

小柴胡湯見一卷溫各二錢

此加麥冬

生地

固本丸

見一卷中風

加味四物湯

四物湯加

丹

梔柴

清化飲

地芍

丹

苓

苓

麥各二錢

石斛一錢

保陰煎

見五卷瘕

七福飲

見三卷鬱

固經丸

黃藥

白芍各三兩

黃芩二兩

炙龜版四兩

服五七十九

白湯下

樗根皮便製香附各一兩半

酒糊丸桐子大每

加味八珍湯

八珍湯加皮各八分

柴胡

黃耆各五分

香附

丹

養營湯

見二卷勞瘵



經遲痰阻虛痛經亂氣亂氣盛脾虛補脾脾虛

大營煎

見三卷關格

二陳湯

見一卷中風

八物湯

地芎歸
檳榔各五分

芎 延胡 苦棟各一錢

木香

滋血湯

參 耆 苓

山藥各一錢 芎 芎 地各八分

歸附丸

當歸四兩
薑汁製

香附八兩童便浸透晒干再加酒醋鹽
為末醋糊丸 空心砂仁湯下三錢 血

虛加熟地

附

抑氣散

香附四兩
末 開水下二錢

陳皮一兩 茯神 甘草各五錢 為

理中湯

見一卷中風

六君子湯

見一卷中風

保元湯

見一卷火



肝虛

補肝散

地耆

水各一兩
山藥

棗仁

獨活各四兩
木瓜各五錢

歸

芎

為末每服

五錢
棗煎

情志

逍遙飲

熟地三錢
當歸

陳皮八分

遠志五分
棗仁各二錢

茯神

炙草一錢

白芍各

加人

參

越痛散

虎骨

歸

芍

木

苓

草

防

芷

續斷

風痛寒痛

調經飲

當歸

牛膝各三錢

山查炒二錢

製香附二錢

水煎

脹悶加厚樸

青皮

仁

氣滯

加烏藥

行滯

加味烏藥湯

烏藥

砂仁

木香

元胡索各一兩

為末每服七錢

薑三

片

水煎

逐瘀

通瘀煎

見五卷厥



中國醫藥大學圖書館藏