

東醫西寶鑑

卷二十四

消食散

治食積腹痛白朮陳壁土炒二錢半麥芽續砂山查肉各一錢橘紅香附米神麴青皮各

七分甘草五分右為末每一錢米錢錢或剉取二錢入薑三片煎服亦可亦亦

消積丸

治乳食傷積腹脹氣急丁香使君子肉五箇烏梅肉巴豆肉各三箇使君子肉五箇右為

末飯丸麻子大每三九或五九橘皮湯下入門

安蟲散

治虫痛胡粉炒黃檳榔苦練根鶴虱白礬半生半枯各二錢右為末每服一字大兒五分

米飲調下。或以米糊和丸麻子大一歲兒五丸溫漿水入清油打勻送下名曰安虫丸

揚氣丸

治小兒腹虛脹胡椒全蠋各四十九箇右末麴糊和丸粟米大米飲下五七丸至二十

丸如腹大者加羅蔔子炒正傳

五軟五硬

五軟者頭項軟。手軟。腳軟。身軟。口軟是也頭項軟者天柱骨倒也通用健骨散

外貼生筋散。○手軟者無力以動也宜薏苡丸。○
腳軟者行遲也。治法見下。○身軟者肉少皮膚自

離或遍身筋軟者鹿茸四斤丸加當歸青鹽服之
○口軟者語遲也。治法見下。已上五軟皆稟受不

足或因吐瀉若不治必成篤疾。入門。○五硬者頭
項硬。○手硬。○腳硬。○身硬。○口硬也硬者強直

水奔乃肝受風邪宜用烏藥
順氣散。方見風門。○入門

健骨散

治頭軟頭不能正也項軟者天柱骨倒也白
殭蚕炒為末每服五分或一錢薄荷泡酒調

下日三
綱目

生筋散

外貼之木鼈子三箇草麻子三十粒俱去殼
右研勻先抱起兒頭摩項上令熱作片貼之

綱目

薏苡丸

治手軟薏苡仁當歸秦艽酸棗仁防風羌活
各五錢右為末蜜丸芡實大荆芥湯化下。綱目

鹿茸四斤丸

治身軟筋骨痿弱肉菴蓉牛膝木瓜兔絲子熟地黃鹿茸天麻杜仲五味子各

等分爲末蜜丸梧子大溫酒或米飲下三五十丸局方。一名加減四斤丸細目

解顱

年大小兒頭縫不合如開解故曰解顱此由腎氣

不成故也腎主骨髓而腦爲髓海腎氣不成則腦髓不足故不能合也凡得此疾者不過千日其間亦有數歲者乃成廢人也湯氏。生下而顱不合

者腎氣不成故也長必少笑更有目白睛多面眇白色瘦者多愁少喜也錢乙。解顱即小兒頭縫

不合也宜服六味地黃丸方見虛勞或八物湯方見虛勞加酒炒芩連煎服外貼三辛散天南星散

且以頭巾裹遮護之自合亦良法也錢乙

三辛散

治解顱乾薑七錢半細辛桂心各五錢右爲末薑汁和付顱上小兒面赤即愈三四

天南星散

治同上大天南星微炮爲末醋調塗緋帛上貼顱上炙手頻熨立效錢乙

顛填顛陷

顛填者顛門腫起也。因乳哺失常或寒熱乘脾其氣上衝則顛高而突。又有肝盛風熱交

攻亦致顛填突起汗出毛髮黃而短是也。若寒氣

上衝則牢硬熱氣上衝則柔軟當瀉風熱宜用瀉

青丸方見五歲入門。顛陷者顛門成坑也因

藏府有熱渴引水漿致成泄利則氣血虛弱不能

上交腦髓故顛陷如坑不得平滿宜用

黃狗頭骨炙黃為末雞子清調付入門

語遲行遲

語遲者五歲中口軟是也。兒在胎時母有驚怖驚氣入於心包絡使心神不足舌本不通

宜服菖蒲丸錢乙。小兒諸病後不能言宜雞頭

丸錢乙。一五歲不能言咸以為廢人用六

味地黃丸方見虛勞加五味子鹿茸及補中益氣

湯方見內傷將半羊始發一二言至一年始言語

如常同春。行遲者胎軟是也。氣血不充骨髓不

滿軟弱不能行或肝腎俱虛肝主筋筋弱不能束

骨宜六味地黃丸加鹿茸牛膝五味子五加皮久

服之虎骨丸亦佳或用五加皮散得效。凡小兒

行遲齒遲解頤五軟鶴膝騎白多愁皆因稟受堅
氣不足宜以六味地黃丸加鹿茸補之或用調元
散同春○小兒鶴膝者由稟受不足血氣不充故
肌肉瘦瘠骨節呈露如鶴之膝乃腎虛得之宜六
味地黃丸加當歸牛膝鹿茸久服仍以天
南星炮為末醋調烘熱貼之甚良同春

菖蒲丸

治心氣不足五六歲不能言石菖蒲人參麥
門冬遠志川芎當歸各二錢乳香朱砂各一

錢右為末蜜丸麻子大米飲下
十丸至二十丸日三服入門

雞頭丸

治小兒諸病後不能言雄雞頭炙一箇鳴蟬
炙焦三箇大黃煨甘州炙各一兩當歸川芎

遠志麥門冬各七錢半木通黃芪各五錢右為末
蜜丸菜豆大空心米飲下五丸日三四服錢氏

虎骨丸

治行遲虎脛骨生乾地黃酸棗仁白茯苓肉
桂防風當歸川芎牛膝黃芪各等分右為末

蜜丸麻子大木瓜湯
下五丸或十丸得效

五加皮散

治三歲不能行五加皮二錢半牛漆木瓜各一錢二分半末每一錢米飲調下得效

調元散

治行遲山藥五分白朮白芍藥熟地黃當歸川芎黃芪蜜炒各二分半人參白茯苓茯神

各二分甘州一分半石菖蒲一分右剉作一貼薑三棗二水煎服 同春

髮不生齒不生

髮不生者因稟受血氣不足不能榮於髮宜服菰蓉丸。齒不生者由齒者骨

之所終髓之所養稟氣不足則髓不能充於骨故

齒久不生宜服芎黃散得效。齒久不生用雄雌

散方見齒門。長齒生牙賴雄鼠之骨末取大老

鼠去肉取脊骨為末擦牙齦上日二次效 本艸

菰蓉丸

當歸生乾地黃肉菰蓉白芍藥各一兩胡粉五錢右為末蜜丸黍米大每十丸黑豆湯吞

下兼磨化二三十

丸塗擦頭上得效

芎黃散

川芎生乾地黃當歸山藥白芍藥各一兩沈香五錢甘州三錢右為末白湯調服半錢內

將乾末糝磨齒齦
上日二次得效

龜背者初生不能護背風入於脊骨或坐太早亦致偻僂背高如龜多成痼疾宜服松葉

丹枳殼丸且取龜尿點脊骨節上卽平○龜智考

胃高脹滿其狀如龜此肺藏受熱所致也或乳母

多食五辛及酒麪過度或夏月多飲熱乳宜服百

肺熱脹滿攻於胃脘而成矣

片苓梔子煎服正傳

治龜背松花枳殼防風獨活各一兩麻黃大

黃前胡桂心各五錢右爲末蜜丸黍米大

飲下

丸得效

治同上枳殼防風獨活大黃前胡當歸麻黃
各三錢右爲末麪糊和丸黍米大末飲吞下

一
二
十
丸
丹
心
○

一名龜背丸 同春

百合丹

治龜胸大黃七錢半天門冬杏仁百合木通桑白皮枳殼甜葶藶石膏各五錢右末蜜丸

菽豆大白湯下五七丸至十丸得效○一名龜胸丸 同春

滯頤

小兒滯頤者口角流涎是也涎者脾之液流出積於頤上此由脾胃虛冷不能制其津液故也法當

溫脾○內經論舌縱涎下皆屬於熱可辨冷熱而

治之熱涎者胃火炎上宜用通心散方見上冷涎

者胃虛也宜用木香半夏丸 入門

○滯頤冷證宜用溫脾丹 湯氏

木香半夏丸

木香半夏麴丁香各五錢白薑白朮青皮陳皮各二錢半右末蒸餅和丸麻子

大朱湯灌 入門

溫脾丹

半夏麴丁香各五錢白朮青皮乾薑各二錢半右為末糊丸黍米大朱飲下一二十丸 湯氏

丹毒

小兒丹毒乃熱毒之氣與血相搏而風來之故赤腫其遊走遍身者又名赤遊風入腎入腹則殺人

也湯氏○小兒丹毒百日内發者必死急急救之
湯氏○金絲瘡一名紅絲瘡其狀如線巨細不一
經謂丹毒是也保命○丹毒自腹內生出四肢則
易愈自四肢入腹則難治三四○毒氣入裏腹脹
則火毒氣所走之處截經刺之出血一云急以細
鍼刺出惡血即消入門○丹毒宜服犀角地黃湯
方見血門四順清涼飲方見火門外用拔毒散水
黃散泥金膏塗之○又溝渠中小鰕鵲付之又伏
龍肝和雞子清塗之又鯉魚血鱧魚血芭蕉根汁
藍葉汁水中苦塗之皆可○蜈蚣吸出惡血最妙
諸方

拔毒散

治丹毒遊走癰熱寒水石二兩三錢石膏一
兩黃柏甘肅各二錢右爲末水調塗之芭蕉

汁調尤妙
妙入門

冰黃散

治同上煖硝大黃末各五錢
右并水調勻雞羽掃塗
回春

泥金膏

治丹毒熱癰無名腫毒蚯蚓糞二分
煅硝一分右新汲水濃調敷上同春

諸瘡

小兒初生月裏諸疾乃胎毒之淺者若一二歲後
所生之疾乃胎毒之深者宜按法治之綱目。小

兒惡瘡天氣溫和時頻與澡洗更衣名曰外宣亦

不須服藥春用柳條荊芥夏用棗葉槐枝秋用苦

參煎湯溫洗

湯氏

○一二歲生瘡遍身先服五福

化毒丹

方見上

犀角地黃湯

方見血門

外用父親

熱小便雞羽蘸洗青黛末糝之妙入門。小兒面

瘡通面壞爛無全膚流膿水百藥不效臘猪脂付

之神效白楊木枝燒取瀝付之亦效丹心。小兒

癰頭瘡以防風通聖散

方見風門

酒製為末每一

錢水煎服三十貼見效又詳見諸瘡門可參考丹

心。小兒口中百病及口瘡重舌重唇喉痺腫塞

互用牛黃散

醫鑒

○胎熱血熱風熱諸瘡遍

身痒痛宜用大連翹飲生料四物湯

醫鑒

牛黃散

牛黃片腦鵬砂各一分辰砂雄黃青黛各二
分黃連黃栢末各八分煅硝一錢半右末每

少許膠
之醫鑒

大連翹飲

治諸瘡甘艸四分柴胡黃芩荊芥各三分連翹車前子瞿麥滑石惡實赤芍藥梔子

木通當歸防風各二分蟬殼二分半右剉作一貼入竹葉二片燈心十莖水煎服

醫鑒

生料四物湯

治同上生地黃赤芍藥川芎當歸防風各三分黃芩薄荷各二分右剉作一貼

水煎服
得效

紅絲癰

一人生子遍身生紅絲癰不救後生三四子皆然東垣曰汝腎中伏火精中多有紅絲以

氣相傳生子故有此疾俗名胎癰是也今視之果如其言遂以滋腎丸數服瀉腎中火邪忌酒肉辛熱之物其妻以六味地黃丸養其陰血後受胎五月以黃芩白朮作散與服而生子前疾不復作矣

東垣

藥毒成淋

一童子自初生患淋五七日必一發發則大痛下如黍粟者約一盞然後定意其父

必多服下部藥積毒在胎留於子之命門而然以紫雪和黃柏末丸梧子大晒極乾熱湯下百丸又半日痛大作連腰腹乃下如黍粟者一洗許病減十分之八又與陳皮一兩桔梗木通各五錢作貼與之又下如黍粟者一合而安父得燥熱且能病胎况母得之者乎書此以證東垣紅絲瘡之事

斷乳

兒二三歲時欲斷乳宜用畫眉膏入

畫眉膏

山梔子炒黑三箇雄黃朱砂輕粉各少許爲末清油調勻候兒睡着濃抹畫兒兩眉上醒

來目不喫乳未效再

畫初用墨搽乳頭門入

小兒諸病死證

眼上赤脉下貫瞳人水火困絕。額門腫起兼及作坑心絕。鼻乾黑燥。肺絕。

○肚大青筋脾絕。○目多直視覩不轉睛五歲俱花。○指甲黑色肝絕。○忽作鴉聲脉絕。○虛舌出

口心絕。○噤齒咬人腎絕。○魚口氣急啼不作聲。
肺絕。○蛔虫既出必是灰形胃絕。○凡病困汗出
如珠不流者灰。○凡兒病其頭毛皆上逆者灰。○
唇口乾目皮反口中氣冷手足四垂其臥如縛掌
中冷者皆灰入門。○其五硬五
軟五冷五乾皆惡證也直小

痘疹二證專由胎毒

大古無痘疹周末秦初乃有之
入門。○夫胎在腹中至六七月

則已成形食母腹中穢液入兒五藏食至十月即
穢液滿胃至生時兒口中猶有不潔產母以手拭
淨則無疾病俗以黃連甘州水下其臍糞之穢此
亦母之不潔餘氣入兒藏中遇風寒邪氣相搏而
成痘疹也。○子在母腹中十月之間隨母呼
吸呼吸者陽氣也而生動作滋益精氣神飢渴皆
食母血兒隨月長筋骨皮肉血脉形氣俱足十月
降生口中尚有惡血啼聲一發隨吸而下此惡血
復歸命門胞中僻于一隅隱伏而不發直至兒因
內傷乳食溼熱之氣下陷合于腎中二火交攻榮

氣不從逆於肉理惡血乃發諸癰疹皆出於腎水其瘍後聚肉理歸於陽明故三番斑始見之證皆足太陽王膀胱剋丙小腸其始出皆見於面終歸於陽明肉理熱化為膿者也二火熾盛反勝寒水通身俱出此皆從足太陽傳變中來也東垣○癰之為病皆由子在母腹中時浸漬食母血穢蘊而成毒皆太陰溼土壅滯君相二火之所作也海藏○內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火蓋因胎毒藏於命門遇少陰少陽司天君相二火太過熱毒流行之年則發作矣正傳

稀痘方

稀痘方有服朱砂法延生第一方稀痘免紅丸
稀痘免痘湯獨聖丹百壽散服梅花方秘傳稀

痘湯

諸方

服朱砂法

如米細光明朱砂水飛為末每五分作三次煉蜜調量兒大小加減溫水送下不拘

痘出未出首尾可服密者可稀稀者可無黑陷者可起痘癰者可消但性微寒不可多服入門○一

法蜜少許調朱砂
末一字可得效

延生第一方

小兒初生臍帶脫落後取置新瓦上用

蓋之類蓋之存性研為末預將朱砂透明者為極
細末水飛過臍帶若有五分重朱砂用二分五釐
生地黃當歸身濃煎汁一二蜆殼調和前兩味抹
兒上臍間及乳母乳頭上一日之內用盡次日大
便遺下污穢濁垢之物終身永無瘡疹及
諸疾生一子得一至十分妙法也 醫鑒

稀痘兔紅丸

一名太極丸臘月初八日取採生兔一
隻取血以蕎麥麪和之少加雄黃四五

分候乾成餅凡初生小兒三日後與某豆大者二
三丸乳汁送下一歲兒五丸或七丸三歲後十五
丸服久則遍身養出紅斑是其驗也有終身不出
痘疹者雖出亦稀小兒已長會飲食者就以兔血
啖之尤妙或云不必八日但臘月
兔亦可用然終不若八日佳 醫鑒

滌穢免痘湯

五六月間取絲瓜小小蔓藤絲陰乾約二兩半重收起至正月初一日子時父

母只令一人知將前絲瓜藤煎湯待溫洗兒全身頭面上下以去其胎毒洗後不生痘也如出亦輕只三五顆而已

獨聖丹

絲瓜近蒂取三寸連皮子納於固濟砂瓶內以桑柴火燒存性爲末以如數配入砂糖搗

成餅時時與兒吃盡爲佳小兒痘疹服此則少或全然只燒蒸三兩日不出者或每遇作熱時則與食之出痘必少醫鑒。凡痘疹初出或未出時服此藥則多者可少少者可無重者可令輕也又云入朱砂少許尤妙正傳

百壽散

初生月內用之老無瘡疹黃連一兩朱砂二錢右水煎先拭去口中涎淨灌下少許令燕

之卻以餘藥傾盆中浴兒身令遍海藏