

经济指标上升很快，有些小高炉的，已經达到了大高炉的水平。在今鋼鉄生产繼續跃进中，“小洋群”的現得十分显著。

东同志經常教导我們，进行任何工須抓住主要矛盾，他說：“任何过程数矛盾存在的話，其中必定有一种，起着領导的、决定的作用，……

个主要矛盾，一切問題就迎刃而解謂主要矛盾，也就是工作中的关键去年我們大抓鋼鉄“小洋群”建設，集解决了大办鋼鉄中的关键問題，因而去年和今年鋼鉄生产的跃进再跃进。

三、省委又适时地大抓煉鋼轉炉的建和新建了四十二座三吨煉鋼轉炉，今陸續建成投入生产以后，鋼产量迅速完成二十三万吨的煉鋼跃进指标，的保証。明年我們打算大抓化肥“小建設，以促进农业的更大发展。

明在贯彻执行中央关于大中小結合、的方针中，是經過一番爭論的。当两种主張：一种主張是搞大不搞小，搞土，一味調大的洋的产量高、质量本低；單純依賴大的洋的。一种主張年搞大，搞土不搞洋，片面強調小的易搞、来得快，滿足于“小土群”。省这两种主張都是不全面的，都是一条而不是两条腿走路。安徽省的具体产資源丰富，群众热情高涨，这是，是基本的方面；但是經驗缺乏，薄弱，这是不利的一面。显然，我

們既不能單純依賴大的洋的，也不能滿足于“小土群”。大型企业具有产量高、质量好、劳动生产率高等等許多优点，为了加速实现工业化，集中力量建設一批現代化的大型企业是非常重要的。但是建設大的洋的所需投資多，建設時間长，設備不易解决，技术难以掌握，投資效果發揮慢，在時間和任务紧迫情况下，單單地指望搞大型企业是不現實的，是会妨碍發揮广大群众的积极性的。而小型企业和土法生产，能够在最大範圍內組織群众参加，适应資源分散和工业基础薄弱的特点；但又决不能停留在土法生产上，必須按照实际情况，有条件地逐步向“小洋群”发展。

根据中央“两条腿走路”的方针，結合我省具体情况，我們坚决地在鋼鉄和其他工业部門中大搞“小洋群”。“小洋群”所需投資少，建設快，設備易于解决，技术容易掌握，接近原料产地和消費地区，可以充分利用分散的資源，充分滿足人民多种的需要，并迅速为国家积累資金。安徽省工业生产的实践证明，坚决执行“两条腿走路”的方针，大搞“小洋群”，对加速工业的义极大。馬鞍山鋼鉄公司过去用八个月，只建立了中型高炉一千九百多立方米，而在去年不到四个月的时间內，全省就建立了小高炉近一万立方米。大搞“小洋群”，充分地調动了广大群众办工业的积极性，打破了办工业的神秘观点，破除了迷信，解放了思想，鍛

① “毛澤东选集”第1卷，人民出版社1958年版，第310頁。

較止醫林狀元壽世保元戊集卷之五

大醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

男龔安國校

腹脹痛或時作痛小便不利身熱口渴

蒼木厚

樸薑汁炒各三兩

陳皮二兩

草一兩五錢木

香砂仁

各一兩

右為末薑

散香正氣

散治感

亂轉筋吐

瀉及傷寒

大腹皮黑

眩暈

脈風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風浮寒緊濕細暑虛涎弦而滑虛脈則無治眩暈法尤當審諦先理痰氣次隨證治

眩者言其黑暈言其轉冒言其昏眩暈之與冒眩其義一也其狀目閉眼眩身轉耳聾如立舟車之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而取軌也風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而眩暈也喜怒哀樂悲恐憂思鬱而生痰隨氣上厥七情致虛而眩暈也淫慾過度腎家不能納氣歸原使諸氣逆奔而上此眩暈之出於氣虛也明矣吐衄漏崩肝家不能收攝榮氣使諸血失道妄行此眩暈之生於血虛也又明矣以致新產之後血海虛損或瘀不行皆能眩暈是不推尋致病之因乎治法隨機應敵其間以升降鎮墜行焉最不可妄施汗下然而眩暈欲解自汗則有之若諸逆

水洗白朮

苓紫蘇

藿香

蒼朮半

夏各三白

芷厚樸

陳皮二各

兩桔梗

甘草各二

右為粗末

每服二錢

加薑末水

煎溫服

六和湯
治胃暑霍
亂吐瀉

發汗劇者言亂目眩與夫少陰病下利止而頭眩時時自汗者此虛極而脫也識者將有採薪之憂

清暈化痰湯 主方治眩暈之總司也

陳皮去白半夏姜汁炒白茯苓去皮各一錢半枳實麩炒一錢川芎酒炒各八分

白芷細辛南星姜汁炒防風各七分甘草三分

右剉一劑生薑三片水煎服以此作丸亦可○氣虛加人參七分白朮去虛

一錢○血虛加當歸倍川芎○有熱加黃連薑炒七分

○一論頭旋眼黑惡心煩悶氣短促上喘無力言語心神顛倒目不敢開如在

風雲中頭苦裂身重如山四肢厥冷不得安睡此乃胃氣虛損停痰而致也

半夏白朮天麻湯方見頭疼

○一論勞役之人饑寒眩暈者脉虛弱也

補中益氣湯方見內傷依本方加半夏天麻白芍熟地黃○一眩暈屬氣虛有

濕痰者依本方去柴升加白茯苓川芎半夏天麻桔梗白芷

○一論陰虛火動眩暈者脉必數也

扁豆薑汁炒去 清離滋坎湯方見勞瘵 依本方加川芎天麻山梔竹瀝少許

皮各一分 錢五分 赤○一論真陽不足上氣喘急氣短自汗虛極欲倒如坐舟車眩暈手足冷
脈沉

茯苓 藿參附湯 人參五錢 大附子炮三錢

香川厚右剉一劑生薑十片水煎熱服

樸薑汁炒 木○一論眩暈之症因氣虛痰火炎上故也

瓜砂仁清陽除眩湯 人參六分 白朮去片一錢 白茯苓一錢 陳皮一錢 半夏湯泡一錢

去殼研半天麻八分 檳榔八分 甘草四分 旋復花八分 右剉一劑生薑煎服

夏製杏仁○一論肥白人日常頭眩眼花卒時暈倒者名曰痰暈

各八分 人參清痰祛眩湯 南星姜泡 半夏姜汁 天麻 蒼朮米泔浸 川芎 茯苓去皮

三分 甘草五分 桔梗 枳殼去穢 烏藥 酒芩 羌活各八分 甘草三分 陳皮

生薑為引 水煎服○ 右剉生薑水煎臨服入竹瀝薑汁全服

治夏月中暑熱渴○ 薑附湯 乾薑一兩 大附子生去皮一錢

白石膏通 右剉每五錢水煎溫服

紅一白龍

滑二兩紅枯

礬一兩澤瀉

兩甘草五錢

右為末糯

木糊為九

每服一錢

燈心湯下

益元散

治小兒伏

熱泄瀉小

便短赤煩

躁帝哭滿

頭痛痲赤

疰丹毒等

一論一切失血過多眩暈不醒者
芎歸湯 川芎 當歸各等分

右剉水煎溫服。虛甚加炮過大附子

一論氣血兩虛而挾寒作頭目眩暈者

十全大補湯 方見補益 依本方如有痰加陳皮半夏

一治一人形體魁梧不慎酒色因勞怒頭暈仆地痰涎上壅手足麻痺口乾

引飲六脉洪數而虛予以為腎經虧損不能納氣歸原而頭暈不能攝水歸

元而為痰陽氣虛弱而麻痺虛火上炎而作渴以補中益氣湯合地黃丸料

一人氣短痰暈服辛香之劑痰盛遺尿兩尺浮大按之如無予以為腎家不

能納氣歸元香燥致甚耳用八味丸料三劑而愈八味丸方見補益

一人形體豐厚勞神喜怒面帶陽色口渴吐痰或頭目眩暈或熱從眼起左

三脉洪而有力予為足三陽虧損用補中益氣湯加麥門五味及加減八味

一大方痰暈湯 半夏法製一錢 橘紅一錢 赤茯苓一錢 黃芩酒洗七分 白朮五分

川芎五分 黃連五分 黃柏酒川七分 薄荷五分 石膏一錢 甘草五分

右用燈心

湯調服三

伏天水調

服亦佳如

水瀉不止

每益元散

二錢加五

倍于未七

分燈心湯

下如瀉而

壯不痛人

事困倦每

益元散二

錢加白朮

末山藥末

各一錢燈

心湯下中

暑吐瀉每

益元散二

錢加藿香

三分丁香

一分浙米

泄調下○

理中湯○

治中寒吐

知母七分 右剉一劑生薑三片水煎臥服

○ 一生員形體魁梧不慎酒色因勞怒頭暈仆地痰涎上湧手足麻痺口乾引飲六脉洪數而虛余以為腎經虧損不能納氣歸源而頭暈不能攝水歸源而為痰陽氣虛熱而麻痺虛火上炎而作渴補中益氣合六味丸料治之而愈其後或勞役或入房其病即作用前藥而愈

○ 一孟都憲氣短痰暈服辛香之劑痰盛遺尿兩尺淨大按之如無余以為腎家不能納氣歸元香燥致甚耳用八味丸料三劑而愈

○ 一孫都憲形體豐厚勞神善怒面帶陽色口渴吐痰或頭目眩暈或熱從腹起左三脉洪而有力右三脉洪而無力余謂是三陰虧損用補中益氣加麥門五味及加減八味丸而愈

十全大補湯 見補益 補中益氣湯 見內傷 八味丸 見補益 六味丸 見補益

麻木

脉浮而濡屬氣虛關前得之麻在上體關後得之脉在下體也脉浮而緩屬濕

冷病手足厥 治中寒吐 理中湯○ 泄調下○ 一分浙米 三分丁香 錢加藿香 益元散二 暑吐瀉每 心湯下中 各一錢燈 末山藥末 益元散二 益加白朮 事困倦每 壯不痛人 下如瀉而 分燈心湯 倍于未七 二錢加五 每益元散 水瀉不止 服亦佳如 伏天水調 湯調服三 右用燈心

白朮 乾

薑 人參

甘草 炙

加附子名

附理中湯

右用水煎

熟加煨薑

汁服之

四神丸

治脾胃虛

弱瀉利腹

痛飲食不

思每至五

更連瀉數

為麻痺脉緊而浮屬寒為痛痺脉澁而芤屬死血為木不知痛癢內經曰風寒濕三氣合而為痺故寒氣盛者為痛痺濕氣勝者著痺河間曰留着不去四肢麻木拘攣也經又曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入深榮衛之行澁經絡時疎故不痛皮膚不榮故為不仁矣夫所謂不仁者或周身或四肢唧唧然麻木不知痛癢如繩扎縛初解之狀古方名為麻痺者是也丹溪曰麻是氣虛木是濕痰死血然則曰麻曰木者以不仁中而分為二也雖然亦有氣血俱虛但麻而不木者亦有虛而感濕麻木兼作者又有因虛而風寒濕三氣乘之故周身掣痛兼麻木併作者古方謂之周痺治法宜先汗而後補也醫者宜各以類推而治之不可執一見也

○一論麻木遍身手足俱麻者此屬氣血兩虛宜

加味八仙湯

當歸 酒洗

川芎

熟地黃 各七分

白芍 酒炒 八分

人參 六分

白朮 去苦 二錢

陳皮 八分

半夏曲 七分

白茯苓 去皮 一錢

柴胡 四分

川羌活 五

防風 五分

秦艽 六分

牛膝 六分

甘草 炙 三

桂枝 三分

右判一劑生薑一片棗一枚水煎食遠服○氣虛加黃芪蜜炒八分

葶藶 炙
去油
肉豆 鹽水
補骨脂 四兩

五味子 各二
○一論麻是渾身氣虛也

兩吳茱萸 加減益氣湯
黃芪蜜炒 人參

湯泡三 柴胡 木香各五分 香附 青皮去穢 川芎各八分 桂枝三分 甘草三分

右為未用 右判一劑生薑棗煎服
○一論十指盡麻并面目皆麻此亦氣虛也

紅棗五六 補中益氣湯 依前方去青皮川芎桂枝加麥門冬羌活防風烏藥共十四味

十枚生薑 煮熟去薑 用夾去皮 核為九如 桐子大每 服三五十 丸白湯送 下○

人參 治濕 丸日久脾 氣虛弱食 少倦怠面 色萎黃四 肢無力元 氣欲脫

白朮 兩入 五積散 方見中寒

雙合湯 當歸 川芎 白芍 生地黃 陳皮 半夏姜炒各一錢

紅花三分 桃仁去皮 白芥子錢一 甘草三分 白茯苓去皮 右判一劑薑十片水煎熟入竹瀝薑汁同服

○一論手足麻痺因濕所致也 香蘇散 方見感冒 依本方加蒼朮麻黃桂枝白芷羌活木瓜

○一論感風濕手膊或痛或木或遍身麻木

○氣欲脫 依本方加蒼朮麻黃桂枝白芷羌活木瓜

白朮 兩入 五積散 方見中寒

推身風... 凡身各五

參山藥 ○一論婦人七情六鬱氣滯經絡手足麻痺宜

炒扁豆汁 開結舒經湯 紫蘇 陳皮 香附 合烏 川芎 蒼朮米泔浸

炒白茯苓 羌活 南星 半夏 當歸各八分 桂枝四分 甘草三分

苡仁炒 右劉生薑三片入薑汁竹瀝服

神麴炒各二兩 ○一論口舌麻木涎及嘴角頭面亦麻或嘔吐痰涎或頭眩眼花惡心遍身木

陳皮 砂 止麻消痰飲 黃連 半夏 瓜蒌仁 黃芩 白茯苓 桔梗

仁 甘草 枳殼麩炒 陳皮 天麻 細辛 南星 甘草

炙各 ○ 右劉生薑三片水煎服。血虛加當歸。氣虛加人參。亦有十指麻木胃

煉蜜為丸 中有濕痰死血加蒼朮白朮少佐熟附子行經中死血者四物湯加紅花桃

參苓白朮 仁韭葉忌生冷魚腥發風發熱之物

兒脾胃虛 一論十指麻木疼痛不仁

弱元氣不 大附子木香各等分每服三錢薑三片水一碗煎七分服

足嘔吐泄 一論婦人遍身麻木痺謂之不仁皆因血分受風濕所致用祛風散送下五

瀝此脾中 祛風散 生川烏 白朮去芦 白芷各三錢 甘草二錢

和不熱久服養氣育神醒脾悅色

人參 白

木 茯苓

山藥

甘草 各二兩

白扁豆 汁

炒薏苡仁

蓮子

砂仁 桔

梗 各一兩

右為末薑

久濕不止

大法補虛

鳳髓經云

右為細末酒調吞下五補丸

五補丸

黃芪 蜜炒一兩

人參 五錢

附子 一個

當歸 三錢

白芍 酒炒五錢

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服五七十九丸祛風散送下

○一論不仁者謂不柔和也痛痒不知針灸不知是也經曰諸乘虛寒而鬱冒

不仁蓋其血氣虛弱不能周流於一身於是正氣為邪氣所伏故肢體頑麻

不知痛痒寒過厥如死屍而鬱且冒也用桂麻各半湯不愈者補中益氣湯

入薑汁設或身汗如油喘不休喘而直視水漿不入者此為命絕也

○一論風熱血燥皮膚瘙痒頭面手足麻木

清涼潤燥湯

當歸 酒洗

生地黃 各一錢半

黃連

黃芩

白芍煨

天麻

防風

羌活

荆芥 各八分

細辛 六分

甘草 五分

右剉水煎食遠服麻甚加川烏炮三分

○一論面上木處可將桂枝為末用牛皮膠和少水化開調敷之厚一二分若

脚底硬木處可將牛皮膠鎔化入生姜汁調和仍入南星末五錢和勻用厚

紙攤貼二三分乘半熱裏貼脚底上用溫火烘之此外治法也

脾中有積
熱暹留至
使中年濕
不使項軟
見人多哽
氣更兼清
水鼻中流
少間有似
黃金色若
有垂腸更
不取形症
又看胸膈
上胸前深
赤汗如油
唇赤生瘡
眼赤若命
不調脾命
即休○

七味千金
散治痢
下日久不
瘥○

宜黃連八
分

龍骨煨赤
石脂煨厚

○一治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜臥乃熱傷元氣也

黃芪八錢人參五錢白芍三錢柴胡二錢五分升麻二錢五味子一百四十個生甘草五錢

炙甘草二錢右剉水煎稍熱空心服

○一治兩腿麻木沉重無力多汗喜笑口中涎下身重如山語聲不出右寸脉

洪大黃芪三錢當歸二錢蒼朮四錢陳皮五錢藁本二錢黃柏一錢

柴胡三錢升麻一錢知母一錢酒炒五味子一錢生甘草二錢牛

右每剉一錢水煎空心服少待以早飯壓之

○一治皮膚間有麻木乃肝氣不行故也

黃芪一兩白芍一兩橘皮一兩半澤瀉五錢炙甘草一兩

癲狂

右剉水煎溫服

癲脉搏大滑者生沉小緊急不治。狂脉實大生沉小死。癲脉虛可治實則死。丙經曰巨陽之厥則暈首頭重足不能行發為眴仆而暴仆也。是蓋陽氣逆亂

樸薑汁烏

梅肉各二分

阿膠炒三分

甘草一分

右為末米湯下

腹癆門

益黃散

治脾胃虛寒腹痛下

痢

陳皮一兩青

皮訶子

肉甘草

炙各丁香

錢二

故令人卒然暴仆而不知人氣復則甦此則癇之類也又曰陽明之厥則癲

疾欲走呼腹滿不得臥面赤面熱妄見妄言又曰甚則棄衣而走登高而歌

踰垣上屋罵詈不避親疏是甚得之於陽氣太盛胃與大腸實熱燥火鬱結

于中而為之耳此則癲狂之候也曰癲曰狂分而言之亦有異乎難經謂重

陰者癲重陽者狂素問註云多喜為癲多怒為狂然則喜傷於心而怒傷於

肝乃二臟相火有餘之症難經陰陽之說恐非理也大抵狂為痰火實盛癲

為心血不足多為求望高遠不得志者有之癲病獨主乎痰因火動之所作

也治法癲者宜吐狂宜下癲則宜安神養血兼降痰火雖然此三証者若神

脫而目證如愚癡者縱有千金我酬吾未如之何也已矣。癲者喜笑不常

顛倒錯亂之謂也。狂者大開目與人語所未嘗見之事為狂也又云狂者

狂亂而無正定也。讞語者合目自言日用常行之事為讞也又蓄血症則

重復語矣。鄭聲者聲顛無力不相接續造字出於喉中為鄭聲也。陰附

陽則狂陽附陰則癲脫陰者目盲脫陽者見鬼

一論癲者心血不足也此方主癲狂喜笑不常

右為細末
每服二錢
水一盞煎
六分食前
服○

服○
調中丸
治脾胃虛
寒下痢而
腹痛

○
腹痛

○
白朮
土人
炒八

○
參
甘草

炒各
五錢
炮乾

○
薑
四錢

○
右為末
煉

○
蜜丸
桐子

○
大每服
一食

○
二十九
食

○
前溫水
化

○
當歸散
凡小兒
夜啼面
青手冷
不吐乳

養血清心湯

人參 白朮去芦 白茯苓云皮 遠志去心 酸棗仁炒
川芎 各一錢 生地黃二錢 石菖蒲一錢 當歸一錢半 甘草五分 麥門冬去心

右剉一劑水煎服

○一論狂者痰火實盛也宜後清心滾痰丸主之若風熱實盛者宜

防風通聖散方見中風 依本方加牡丹皮生地黃桃仁主之治一切大風癩狂

○一論喜笑不休者心火之盛也

以海鹽二兩火燒令紅研細以河水一大碗煎三五沸待溫二次啜之以

釵探吐熱痰次服

黃連解毒湯方見鳳昌 依本方加半夏竹葉竹瀝姜汁少許

○一論婦人癩疾歌唱無時踰垣上屋者乃營血迷於心包所致也

加味道遙散 當歸 白芍炒 白朮去芦 白茯苓去皮 柴胡

生地黃 遠志去心 桃仁去皮 蘇木 紅花 甘草

右剉一劑煨薑一片水煎服有熱加小柴胡湯生地辰砂水煎服

○一論發狂無時披頭大叫欲殺人不避水火古人治狂謂之失心苦參主心

是厥寒服
痛也宜此
方服之

當歸去芦頭

白芍炒人

參各一錢 甘

草炙三 桔

梗 陳皮

各一錢

右吹咀煎

五分時時

少服愈

七氣散

治七情相

干陰陽不

升降氣道

壅滯攻衝

腹結氣故足以治時熱狂言

苦參丸

苦參為末煉蜜為丸如梧子大每服二三十丸薄荷湯送下

○一論一切癩癩風狂或因驚恐怖畏所致及婦人產後血虛驚氣入心并室

女經脉通行驚邪蘊結頓服比比經効

抱膽丸

水銀二兩一錢 硃砂一兩研 鉛一兩半

乳香一兩研

右將鉛入銚內水銀結成砂子次下朱砂滴乳乘熱用柳木棍研勻丸如芡

實大每一丸空心并花水吞下病者得睡切莫驚動覺來即安再服一丸除

根○一方薄荷湯化下亦可

○一論癩狂失心不寐此方用硃砂能鎮心安神酸使可收引故棗仁能斂神

歸心香可使利竅故乳香能豁達心志許學士加人參亦謂人參能寧心耳

寧志膏

辰砂一兩

酸棗仁炒五錢

乳香五錢

加人參一兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸薄荷湯化下

○一論癩狂失心此病因憂鬱得之痰涎包絡心竅此藥能開鬱痰

青皮 陳

白金丸

白礬三兩

鬱金七兩

皮 桔梗

蓬水

官桂 益

智仁 各一兩

甘草 半

夏 錢五分

香附子 一兩

五 錢

右為細末 每服一二錢 舊來湯下不拘時

服

三稜散 治積氣肚

疼

砂仁 甘

草 益智

右為末米糊丸每服五十丸溫水送下

○ 一論癩狂五癇驚悸一切怪症此皆痰火實盛也

清心滾痰丸

大黃酒蒸四兩 黃芩四兩 青蒙石五錢

沉香二錢

牙皂五錢 犀角五錢

朱砂五錢

射香五分

右為細末水丸每服四五十丸滾水送下

○ 一論心風者何蓋君火在心因怒發之相火助盛痰動于中脇氣上攻迷其

心竅則為癩為狂所怒之事膠固於心輒自談失其條序謂言之心風與風

何于也若痰不盛者則有感亦輕

○ 一論久患心風癩狂健忘怔忡失志及恍惚驚怖入心神不守舍多言不定

此藥大能安神養血寧心定志

紫河車一具長流水洗淨慢火焙乾為末煉蜜為丸空心酒送下

○ 一論癩狂亂打走叫上房用瓜蒂散吐出其痰數升又以承氣湯下之即愈

○ 一論人氣心風即痰迷心竅發狂作用真花蕊石煨黃酒淬一次為細末每服

錢黃酒調下

○ 一論癩狂五癇眩暈時作時止痰涎壅盛心神昏憤此屬氣血虛而挾風痰

仁三稜

鬱火也

逢木青

驅風豁痰湯

人參

白朮

去苦

白茯苓

去皮

半夏

姜炒

陳皮

枳實

酒炒

皮各等

懷生地黃

當歸

酒洗

川芎

白芍

酒炒

桔梗

去苦

南星

天麻

右為未白

瓜蒌仁

白附子

僵蠶

黃連

姜炒

黃芩

酒炒

遠志

甘草水泡去心

使君子丸

甘草 右剉一劑生薑五片水煎溫服

治腹內

一癲狂健忘失志及恍惚驚怖入心神不守舍多言不定一切真氣虛損用

諸虫作疾

紫河車八補藥內服之大能安神養血寧志治健忘驚悸怔忡不寐以六味

口吐青水

丸加遠志石菖蒲人參白茯苓當歸酸棗仁炒

使君肉切

一治心志狂惑

焙檳榔

用無灰酒一碗真麻油四兩共和勻楊枝二十條逐一條攪一二下攪遍

洗年大黃

楊枝直候油酒相和如膏煎至八分狂者強灌之令熟睡或吐或不吐覺

半生半熟

來即醒

各七錢五

一治狂言鬼語

用蝦蟆一箇燒為末酒調服

右除檳榔

一治癲狂諸病

到曉不過

火餘三味
再焙同槌

將軍湯

大黃

四兩酒浸一宿

右用水三升煎之分作三服

糊為末沙

糖為九麻

仁大每服

三十九至

五十九淡

猪肉汁空

心下或雞

汁亦好○

烏梅散

治腹痛及

初生嬰兒

臍下冷痛

等症○

烏梅去玄

胡索粉

癲狂病者多怒為癲多喜為狂癲者精神不守言語錯亂妄見妄言登高罵詈是也狂之病始發少臥少飢自賢自貴妄笑妄動登高而歌棄衣而走是也癲病者賊邪之并於肝狂病者賊邪之并於心也此皆實症宜瀉而不宜補故用大黃瀉之取其苦寒無物不降可以瀉實又必數日後方可與食但得寧靜便為吉兆不可見其瘦弱減食以溫藥補之及飲食飽之病必再作戒之戒之緩與之食方為得體故曰損其穀氣則病易愈所以然者食入于陰長氣于陽故也又宜滾痰丸下之

○一治癲狂不止得之驚憂極者用甜瓜蒂半兩為末每服一錢井水調一盞投之即大吐後熟睡勿令驚起神効

○一治邪狂癲癩不欲眠妄行不止用白雄雞二隻煮熟五味調和作羹食

○一治因驚憂失心或思過多氣結不散積有痰涎留灌心包窒塞心竅以致

沒藥 鈎

雄朱丸

朱砂 錢半研

雄黃 明淨者研

白附子 一錢

藤 各三錢 五分