

一九七七年各省、市、自治区

高考数学题解汇编

梧州市教学研究室编

一九七八年三月

目 录

北京 (理)	(1)	云南.....	(151)
上海 (理)	(8)	辽宁.....	(158)
上海 (文)	(16)	吉林.....	(164)
天津.....	(21)	青海.....	(171)
黑龙江.....	(28)	甘肃.....	(178)
河北.....	(34)	安徽 (理工)	(185)
河北(中专).....	(42)	贵州.....	(196)
河南.....	(48)	浙江.....	(202)
山东.....	(57)	内蒙.....	(208)
山东(中专).....	(64)	四川.....	(217)
山西.....	(68)	江西.....	(227)
陕西.....	(76)	福建 (理)	(233)
宁夏.....	(86)	福建 (文)	(246)
新疆 (理)	(99)	福建(中专).....	(250)
新疆 (文)	(106)	湖北.....	(257)
江苏.....	(110)	湖南.....	(263)
江苏(南通).....	(118)	广东.....	(272)
湖南(株洲).....	(123)	西藏.....	(277)
广西 (理)	(132)	科技大学(安徽).....	(283)
广西 (文)	(137)	梧州市1977年高二数学 竞赛试题选解.....	(287)
广西(百色)(理).....	(141)		
广西(百色)(文).....	(147)		

北 京 市 (理科)

一、解方程 $\sqrt{x-1}=3-x$.

解 方程两边平方得 $x-1=9-6x+x^2$

$$x^2-7x+10=0$$

解之得 $x_1=5, x_2=2$.

经检验 $x_1=5$ 是增根; $x_2=2$ 是原方程的根.

二、计算 $2^{-\frac{1}{2}} + \frac{2^0}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}-1}$.

$$\begin{aligned}\text{解 原式} &= \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}+1}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)} \\ &= \frac{2}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}+1}{(\sqrt{2})^2-1} = \sqrt{2} - (\sqrt{2}+1) = -1.\end{aligned}$$

三、已知 $\lg 2=0.3010$, $\lg 3=0.4771$, 求 $\lg \sqrt{45}$.

$$\begin{aligned}\text{解 } \lg \sqrt{45} &= \frac{1}{2} \lg (9 \times 5) = \frac{1}{2} (\lg 3^2 + \lg 5) \\ &= \frac{1}{2} (2 \lg 3 + \lg \frac{10}{2}) \\ &= \frac{1}{2} (2 \lg 3 + \lg 10 - \lg 2) \\ &= \frac{1}{2} (2 \times 0.4771 + 1 - 0.3010) \\ &= 0.8266.\end{aligned}$$

四、证明： $(1 + \operatorname{tg} \alpha)^2 = \frac{1 + \sin 2\alpha}{\cos^2 \alpha}$.

证明(一) $(1 + \operatorname{tg} \alpha)^2 = \left(1 + \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}\right)^2 = \frac{(\cos \alpha + \sin \alpha)^2}{\cos^2 \alpha}$
 $= \frac{\cos^2 \alpha + 2\sin \alpha \cdot \cos \alpha + \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{1 + \sin 2\alpha}{\cos^2 \alpha}$.

证明(二) $(1 + \operatorname{tg} \alpha)^2 = 1 + 2\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg}^2 \alpha$
 $= 1 + \frac{2\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}$
 $= \frac{\cos^2 \alpha + 2\sin \alpha \cdot \cos \alpha + \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{1 + \sin 2\alpha}{\cos^2 \alpha}$.

五、求过两直线 $x + y - 7 = 0$ 和 $3x - y - 1 = 0$ 的交点，并且通过点 $(1, 1)$ 的直线方程。

解法一 解 $\begin{cases} x + y - 7 = 0 & (1) \\ 3x - y - 1 = 0 & (2) \end{cases}$

$(1) + (2)$ 得 $4x - 8 = 0$

$\therefore x = 2$ ，代入(1)得 $y = 5$ 。

$\therefore$ 两直线的交点是 $(2, 5)$ ，由两点式得：

$$\frac{y - 5}{5 - 1} = \frac{x - 2}{2 - 1}$$

$y = 4x - 3$ 即 $4x - y - 3 = 0$ ，这是所求的直

线方程。

解法二 设所求直线方程为

$$(x + y - 7) + k(3x - y - 1) = 0.$$

已知它过点 $(1, 1)$ ，则 $-5 + k = 0$ 。

即 $k = 5$ 。代入所设方程得 $4x - y - 3 = 0$ 。

六、某工厂今年七月份的生产为100万元，以后每月产

值比上个月增加20%，问今年七月份到10月份的总产值是多少？（以上每题8分）

解 设 W 为总产值。

$W = 1,000,000[1 + 120\% + (120\%)^2 + (120\%)^3]$
方括号 $[\quad]$ 中为一等比级数和，公比 $\gamma = 1.2$ 。

$\therefore W = 1,000,000[\frac{(1-\gamma^4)}{(1-\gamma)}]$ 把 $\gamma = 1.2$ 代入得

$$W = 1,000,000[\frac{1-1.2^4}{1-1.2}] = 1,000,000[\frac{1-2.0736}{1-1.2}]$$

$$= 1,000,000 \times \frac{-1.0736}{-0.2} = 5,368,000 \text{ (元)}$$

答：今年七月份到10月份的总产值是5,368,000元。

七、已知二次函数 $y = x^2 - 6x + 5$

1. 求出它的图象的顶点坐标和对称轴方程；
2. 画出它的图象；
3. 分别求出它的图象和 x 轴、 y 轴的交点坐标。

（本题13分）


解 1. $y = x^2 - 6x + 5 = x^2 - 6x + 3^2 - 3^2 + 5$
 $= (x-3)^2 - 4,$

顶点坐标是 $(3, -4)$ ，对称轴方程是 $x = 3$ ，

2. 画出它的图象如图。

x	3	4	5	6
y	-4	-3	0	5

3. 令 $y = 0$ ，得



$$x^2 - 6x + 5 = 0$$

解得 $x_1 = 1, x_2 = 5,$

$\therefore$ 图象与 x 轴的交点坐标是 $(1, 0)$ 和 $(5, 0)$.

令 $x = 0$, 得 $y = 5,$

$\therefore$ 图象与 y 轴的交点坐标是 $(0, 5)$.

八、一只船以20浬/小时的速度向正东航行，起初船在A处看见一灯塔B在船的北45°东(即北偏东45°)方向，一小时后，船在C处看见这个灯塔在船的北15°东(即北偏东15°)方向，求这时船和灯塔的距离CB。(12分)

解 如图 $\angle BAC = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ,$

$$\angle BCA = 90^\circ + 15^\circ = 105^\circ,$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \angle B &= 180^\circ - (45^\circ + 105^\circ) \\ &= 30^\circ \end{aligned}$$

又 $AC = 20$ (浬) 由正弦定理得

$$\frac{BC}{\sin 45^\circ} = \frac{20}{\sin 30^\circ}$$


$$\therefore BC = 20 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \div \frac{1}{2} = 20\sqrt{2} \quad (\text{浬})$$

答：船在C处看见灯塔时，和灯塔的距离CB为 $20\sqrt{2}$ 浬，约等于28.28浬。

九、有一个圆内接三角形ABC， $\angle A$ 的平分线交BC于D，交外接圆于E，求证 $AD \cdot AE = AC \cdot AB$.

证明 连结EC，在 $\triangle ABD$ 与 $\triangle AEC$ 中，

$$\therefore \angle 1 = \angle 2, \angle B = \angle E,$$




$$\therefore \triangle ABD \sim \triangle AEC,$$

$$\therefore \frac{AB}{AE} = \frac{AD}{AC}$$

$$\therefore AD \cdot AE = AC \cdot AB.$$

十、当 m 取哪些值时，直线

$y = x + m$ 与椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 有一个



交点？有两个交点？没有交点？当它们有一个交点时，画出它们的图形。

$$\text{解} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1 & (1) \\ y = x + m & (2) \end{cases}$$

$$(2) \text{ 代入 } (1) \text{ 得 } 9x^2 + 16(x+m)^2 = 144$$

$$\text{整理, 得 } 25x^2 + 32mx + 16m^2 - 144 = 0$$

这个方程的根的判别式为：

$$\begin{aligned} \Delta &= (32m)^2 - 4 \times 25 \times (16m^2 - 144) \\ &= 64(16m^2 - 25m^2 + 225) = 576(-m^2 + 25) \end{aligned}$$

(1) 当 $\Delta = 0$ 时，二次方程有两个相等的实数根，

$$\text{即 } 576(-m^2 + 25) = 0, \quad -m^2 + 25 = 0$$

$\therefore m = \pm 5$ ，这时，直线与椭圆有一个交点。

(2) 当 $\Delta > 0$ 时，二次方程有两个不相等的实数根，

$$\text{即 } 576(-m^2 + 25) > 0, \quad -m^2 + 25 > 0$$

$\therefore -5 < m < 5$ ，这时，直线与椭圆有两个交点。

(3) $\Delta < 0$ 时，二次方程没有实数根。

$$\text{即 } 576(-m^2 + 25) < 0, \quad -m^2 + 25 < 0$$

$\therefore m > 5$ 或 $m < -5$ ，这时直线与椭圆没有交点。

(4) 画出图形

$$-y = x + m$$

参考题:


I (1) 求函数

$$f(x) =$$

$$\begin{cases} x^2 \sin \frac{\pi}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

的导数

(2) 求椭圆



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ 绕 } x \text{ 轴旋转而成的旋转体的体积}$$

解 (1) 当 $x \neq 0$ 时

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2)' \sin \frac{\pi}{x} + x^2 \left(\sin \frac{\pi}{x} \right)' \\ &= 2x \sin \frac{\pi}{x} + x^2 \left(\cos \frac{\pi}{x} \right) \left(-\frac{\pi}{x^2} \right) \\ &= 2x \sin \frac{\pi}{x} - \pi \cos \frac{\pi}{x} \end{aligned}$$

当 $x = 0$ 时

$$f'(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{x^2 \sin \frac{\pi}{x} - 0}{x - 0}$$

$$= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} x \sin \frac{\pi}{x} = 0$$

$$\begin{aligned} (2) V &= \int_{-a}^a \pi y^2 dx = 2\pi \int_0^a b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx \\ &= 2\pi b^2 \left(x - \frac{x^3}{3a^2}\right) \Big|_0^a = 2\pi b^2 \left(a - \frac{a^3}{3a^2}\right) \\ &= \frac{4}{3} \pi ab^2 \end{aligned}$$

I (1) 试用 $\varepsilon - \delta$ 语言来叙述“函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续”的定义。

(2) 试证明若 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续, 且 $f(x_0) > 0$, 则存在一个 x_0 的邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 在这个邻域内, 处处有 $f(x) > 0$ 。

证明 (1) 定义: 若 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义, 且对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总可以找到 $\delta > 0$, 使只要 $|x - x_0| < \delta$, 就有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, 则说 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续。

证明 (2) $\because f(x_0) > 0$, $\therefore$ 存在一正数 p , 使得 $f(x_0) > p > 0$ 。又由于 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 故对 $\varepsilon = p$ 总可找到 $\delta > 0$, 使只要 $|x - x_0| < \delta$ 就有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ 。即 $f(x_0) - \varepsilon < f(x) < f(x_0) + \varepsilon$ 。

因此, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $f(x) > f(x_0) - p > 0$

证毕。

上海市 (理科)

一、化简 $\left(\frac{a}{a+b} - \frac{a^2}{a^2+2ab+b^2}\right) + \left(\frac{a}{a+b} - \frac{a^2}{a^2-b^2}\right)$

$$\begin{aligned}\text{解 原式} &= \frac{a \cdot (a+b) - a^2}{(a+b)^2} + \frac{a \cdot (b-b) - a^2}{(a+b)(a-b)} \\ &= \frac{ab}{(a+b)^2} \cdot \frac{(a+b)(a-b)}{-ab} = \frac{b-a}{a+b}.\end{aligned}$$

(2) 计算 $\frac{1}{2}Lg25 + Lg2 - Lg\sqrt{0.1} - Log_29 \times Log_32$

$$\begin{aligned}\text{解 原式} &= Lg\sqrt{25} + Lg2 - Lg10^{-\frac{1}{2}} - \frac{Lg9}{Lg2} \times \frac{Lg2}{Lg3} \\ &= Lg5 + Lg2 + \frac{1}{2} - 2 \\ &= 1 + \frac{1}{2} - 2 = -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(3) $\sqrt{-1}$ 记作 i , 验算 i 是不是方程

$$2x^4 + 3x^3 - 3x^2 + 3x - 5 = 0 \text{ 的解.}$$

解 $\because i^{-1} = i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1,$
 $\therefore$ 将 $x = i$ 代入方程左边 $= 2 - 3i + 3 + 3i - 5 = 0,$
 故 i 是方程 $2x^4 + 3x^3 - 3x^2 + 3x - 5 = 0$ 的解.

(4) 求证
$$\frac{\sin(\frac{\pi}{4} + \theta)}{\sin(\frac{\pi}{4} - \theta)} + \frac{\cos(\frac{\pi}{4} + \theta)}{\cos(\frac{\pi}{4} - \theta)} = \frac{2}{\cos 2\theta}$$

$$\begin{aligned}
 \text{证左边} &= \frac{\sin(\frac{\pi}{4} + \theta) \cdot \cos(\frac{\pi}{4} - \theta) + \cos(\frac{\pi}{4} + \theta) \cdot \sin(\frac{\pi}{4} - \theta)}{\sin(\frac{\pi}{4} - \theta) \cdot \cos(\frac{\pi}{4} - \theta)} \\
 &= \frac{\sin(\frac{\pi}{4} + \theta + \frac{\pi}{4} - \theta)}{\frac{1}{2} \sin 2(\frac{\pi}{4} - \theta)} = \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{2} \cdot \sin(\frac{\pi}{2} - 2\theta)} \\
 &= \frac{1}{\frac{1}{2} \cos 2\theta} = \frac{2}{\cos 2\theta} = \text{右边}.
 \end{aligned}$$

二、题目与文科同，读者参阅文科答案。

三、已知圆A的直径为 $2\sqrt{3}$ ，圆B的直径为 $4 - 2\sqrt{3}$ ，圆C的直径为2，圆A与圆B外切，圆A与圆C外切， $\angle A = 60^\circ$


求 (1) BC的长

(2) $\angle C$ 的度数。

解 $AB = \frac{2\sqrt{3}}{2} + \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} = 2,$

$$AC = \frac{2}{2} + \frac{2\sqrt{3}}{2} = 1 + \sqrt{3},$$

$$\angle A = 60^\circ.$$



由余弦定理，得

$$\begin{aligned}
 BC^2 &= AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \times \cos 60^\circ \\
 &= 4 + (4 + 2\sqrt{3}) - 2 \times 2 \cdot (1 + \sqrt{3}) \times \frac{1}{2} \\
 &= 8 + 2\sqrt{3} - 2 - 2\sqrt{3} = 6
 \end{aligned}$$

$$\therefore BC = \sqrt{6}.$$

由正弦定理, 得

$$\sin C = \frac{AB \cdot \sin A}{BC} = \frac{2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$\therefore \angle C_1 = 45^\circ, \quad \angle C_2 = 135^\circ$ (不适合方程, 舍去).

答: BC 的长为 $\sqrt{6}$, $\angle C = 45^\circ$

四、正六棱锥 $V-ABCDEF$ 的高为 2cm , 底面边长为 2cm ,

- (1) 按 $1:1$ 画出它的视图.
- (2) 求它的侧面积.
- (3) 求它的侧棱和底面的夹角.

解 (1) 视图如右 (印制时已缩小了比例)

(2) 设底面中心为 O , 过 O 作 $OH \perp AB$, 连 VH ,

$$\therefore OH = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3},$$

$$VH = \sqrt{2^2 + (\sqrt{3})^2}$$


$$= \sqrt{4+3} = \sqrt{7},$$

$$\therefore s_{\text{正六棱锥侧}} = \frac{1}{2} L \cdot P = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{7} \cdot 6 \times 2 = 6\sqrt{7} (\text{cm}^2).$$

(3) 在直角三角形 VOA 中, $VO = AO = 2$,

$$\therefore \angle VAO = 45^\circ.$$

五、解不等式组
$$\begin{cases} 16 - x^2 \geq 0, \\ x^2 - x - 6 > 0. \end{cases}$$



在数轴上把它的解表示出来。


$$\text{解 由 } \begin{cases} 16 - x^2 \geq 0, \\ x^2 - x - 6 > 0. \end{cases}$$

$$\text{得 } \begin{cases} x^2 \leq 16, \\ (x-3)(x+2) > 0. \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} -4 \leq x \leq 4, \\ x-3 > 0, \\ x+2 > 0. \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} -4 \leq x \leq 4, \\ x-3 < 0, \\ x+2 < 0. \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} -4 \leq x \leq 4, \\ x > 3, \\ x > -2. \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} -4 \leq x \leq 4, \\ x < 3, \\ x < -2. \end{cases}$$

$$\text{故 } 3 < x \leq 4 \quad \text{或} \quad -4 \leq x < -2.$$



六、已知定点 $A(-4, 0)$, $B(4, 0)$, 一动点 $P(x, y)$ 与两定点 A, B 的连线 PA, PB 的斜率的乘积为 $-\frac{1}{4}$, 求 P 点的轨迹方程, 并把它化成标准形式, 指出这是什么曲线。

解 直线 PA 的方程为 $y - 0 = k_1(x + 4)$,

$$\text{即 } y = k_1(x + 4) \dots \dots \dots (1)$$

直线 PB 的方程为 $y - 0 = k_2(x - 4)$,

$$\text{即 } y = k_2(x - 4) \dots \dots \dots (2)$$

$$(1) \times (2) \quad y^2 = k_1 k_2 (x + 4)(x - 4)$$

$$\because k_1 k_2 = -\frac{1}{4}$$

$$\therefore P \text{ 点的轨迹方程为 } y^2 = -\frac{1}{4}(x^2 - 16),$$

$$\text{即 } \frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{2^2} = 1 \text{ (这是椭圆).}$$

七、等腰梯形的周长为60，底角为 60° ，问这梯形各边的长为多少时面积最大？

解 作 $AE \perp BC$, $DF \perp BC$.

设 $AB = DC = x$ ，则 $AD + BC = 60 - 2x$,

$$AE = AB \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}x,$$

由梯形面积公式得：

$$S_{\text{梯形}} = \frac{1}{2}(AD + BC) \cdot AE$$

$$= \frac{1}{2}(60 - 2x) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}x$$


$$= 15\sqrt{3}x - \frac{\sqrt{3}}{2}x^2$$

$$\because a = -\frac{\sqrt{3}}{2} < 0$$

$\therefore s$ 有最大值

$$AB = CD = x = -\frac{b}{2a} = -\frac{15\sqrt{3}}{2 \times (-\frac{\sqrt{3}}{2})} = 15,$$

$$BE = FC = 15 \cdot \cos 60^\circ = 15 \times \frac{1}{2} = 7.5,$$



$$AD = \frac{30 - 2 \times 7.5}{2} = 7.5$$

$$BC = 60 - 2 \times 15 - 7.5 = 22.5$$

答：这梯形各边长为 $AB = CD = 15$, $BC = 22.5$, $AD = 7.5$ 时，其面积最大。

八、当 k 为何值时，方程组

$$\begin{cases} x - \sqrt{y-2} = 0 & \dots\dots\dots(1) \\ kx - y - 2k - 10 = 0 & \dots\dots\dots(2) \end{cases}$$

的两组解才相同，并求出这组解。

解 由(1) 得 $y = x^2 + 2 \dots\dots\dots(3)$

将(3)代入(2)得

$$kx - x^2 - 2 - 2k - 10 = 0,$$

$$\therefore x^2 - kx + 2k + 12 = 0$$

$\therefore$ 两组解相同，

$$\therefore \Delta = (-k)^2 - 4 \times 1 \times (2k + 12) = 0$$

$$\text{即 } k^2 - 8k - 48 = 0,$$

$$(k-12)(k+4) = 0,$$

$$\therefore k_1 = 12, \quad k_2 = -4.$$

$$\text{当 } k = 12 \text{ 时，原方程组变为 } \begin{cases} x - \sqrt{y-2} = 0 & \dots\dots(4) \\ 12x - y - 34 = 0 & \dots\dots(5) \end{cases}$$

$$\text{解之，得 } \begin{cases} x = 6, \\ y = 38 \end{cases}$$

$$\text{当 } k = -4 \text{ 时，原方程组变为 } \begin{cases} x - \sqrt{y-2} = 0 & \dots\dots(6) \\ -4x - y - 2 = 0 & \dots\dots(7) \end{cases}$$

解之，得 $\begin{cases} x = -2, \\ y = 6. \end{cases}$ (经检验，是增根)

$\therefore$ 当 $k=12$ 时，方程组有两组相同的解： $\begin{cases} x = 6, \\ y = 38 \end{cases}$

附加题：

九、如图所示，半圆 O 的直径为 2， A 为直径延长的一点，而且 $OA=2$ ， B 为半圆周上任意一点，以 AB 为一边作等边 $\triangle ABC$ ，问 B 在什么位置时，四边形 $OACB$ 的面积为最大，并求出这个面积的最大值。

解 设 $\angle BOA = \theta$ ， $\because OB=1, OA=2$

$$\therefore S_{\triangle BOA} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB \cdot \sin \theta$$

$$S = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 \times \sin \theta = \sin \theta.$$


在 $\triangle BOA$ 中，

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2 \times OA \cdot OB \cdot \cos \theta$$

$$= 2^2 + 1^2 - 2 \times 2 \times 1 \times \cos \theta$$

$$= 5 - 4 \cos \theta.$$

$\because \triangle ACB$ 是等边 $\triangle$ ，



$$\therefore S_{\triangle ACB} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin \angle BAC$$

$$= \frac{1}{2} (5 - 4 \cos \theta) \cdot \sin 60^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} (5 - 4\cos\theta).$$

$$\therefore S_{\text{四边形BOAC}} = \sin\theta + \frac{\sqrt{3}}{4} (5 - 4\cos\theta)$$

$$= 2\left(\frac{1}{2} \cdot \sin\theta - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos\theta\right) + \frac{5\sqrt{3}}{4}$$

$$= 2 \cdot (\sin\theta \cos 60^\circ - \cos\theta \cdot \sin 60^\circ) + \frac{5\sqrt{3}}{4}$$

$$= 2 \cdot \sin(\theta - 60^\circ) + \frac{5\sqrt{3}}{4}$$

当 $\theta - 60^\circ = 90^\circ$ 时, S 有最大值.

即当 $\theta = 150^\circ$ 时, $S_{\text{四边形BOAC}} = 2 + \frac{5\sqrt{3}}{4}$ (最大面积).

十、已知曲线 $y = x^2 - 2x + 3$ 与直线 $y = x + 3$ 相交于 $P(0, 3)$, $Q(3, 6)$ 两点. (1) 分别求出曲线在各交点的切线斜率. (2) 求曲线与直线围成的面积.

解 $y = x^2 - 2x + 3$,

$$y' = 2x - 2$$

当 $x = 0$ 时, $y' = -2$,

$\therefore$ 曲线在 $(0, 3)$ 点的切线斜率为 -2

当 $x = 3$ 时, $y' = 4$,

$\therefore$ 曲线在 $(3, 6)$ 点的切线斜率为 4 .

(2) 令 $y_1 = x^2 - 2x + 3$, $y_2 = x + 3$

$$\therefore S = \int_0^3 (y_2 - y_1) dx$$

$$= \int_0^3 [x + 3 - (x^2 - 2x + 3)] dx$$

$$= \int_0^3 (-x^2 + 3x) dx$$

