

清·劉常彥

撰

醫 學 全 書



醫學全書 · 解題

清·劉常彥撰。成書於乾隆六十年（公元一七九五年）。

劉常彥，號凜齋。麻城（今屬湖北）人。

此書九卷，今收錄卷一與本草藥相關之『藥性總義』、『藥引秘旨』、『服藥應忌』、『用藥秘旨』諸章節，後錄『藥性賦』。

今據清·光緒五年（公元一八七九年）述古堂刊本影印。

（劉國堂）



醫學全書

藥性總義

凡藥酸屬木。入肝。苦屬火。入心。甘屬土。入脾。辛屬金。入肺。鹹屬水。入腎。此五味之義也。

凡藥青屬木。入肝。赤屬火。入心。黃屬土。入脾。白屬金。入肺。黑屬水。入腎。此五色之義也。

凡藥酸者能瀉能收。苦者能瀉能燥。堅甘者能補能和。能緩辛者能潤能散。能橫行鹹者能下能喫。堅淡者能利竅能滲泄。此五味之用也。

凡藥寒熱溫涼氣也。酸苦甘辛鹹味也。氣爲陽味

爲陰氣厚者爲陽中之陽。薄者爲陽中之陰。味厚者爲陰中之陰。薄者爲陰中之陽。氣薄則發泄。表厚則發熱。溫燥味厚則泄。降薄則通。利竅滲濕辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲陰。鹹味涌泄爲陰。淡味散泄爲陽。輕清升浮爲陽。重濁沉降爲陰。陽氣出上竅。陰味出下竅。清陽發腠理。濁陰走五臟。清陽實四肢。濁陰歸六腑。此陰陽之義也。

凡藥輕虛者浮而升。重實者沉而降。味薄者升而生。象氣薄者降而收。象氣厚者浮而長。象夏味厚者春氣薄者降而收。味厚者可升可降。酸鹹無升。辛甘無降。寒無浮。熱無沉。此升降浮沉之義也。李時珍曰：升者引之以降。寒以酒則浮而上至頭項。物之中有根升者引之以消降。生升熟降者是升降在物亦在人也。

凡藥根之在土中者半身以上則上升。半身以下則下降。雖一藥而根稍各別。用之或差服亦因效。藥之爲枝者達四肢。爲皮者達皮膚。爲心爲幹者內行臟腑質之輕者上入心肺。重者下入肝腎。中空者發表。內實者攻

## 醫學全書

### 藥義卷一

五

裏枯燥者入氣分。潤澤者入血分。此上下內外。各以其類相從也。

凡藥色青味酸氣燥性屬木者。入足厥陰肝。足少陽膽經。肝與膽相表裏。膽爲甲木。肝爲乙木。色赤味苦氣焦性屬火者。皆入手少陰心。手太陽小腸經。心與小腸相表裏。小腸爲丙火。丁水爲色黃味甘氣香性屬土者。皆入足太陰脾。足陽明胃經。脾與胃相表裏。胃爲己土。脾爲戊土。色白色白味辛氣腥性屬金者。皆入手太陰肺。手陽明大腸經。肺與大腸相表裏。大腸爲庚金。肺爲辛金。色黑色黑味鹹氣腐性屬水者。皆入足少陰腎。

### 醫學全書

樂經卷一 六

足太陽膀胱經。腎與膀胱相表裏。膀胱爲壬水。腎爲癸水。凡一臟配一腑。府皆屬陽。故配甲丙戊庚壬。臟皆屬陰。故配乙丁己辛癸也。十二經中手厥陰心包手少陽三焦經無所主。其經通于足厥陰肝經。厥陰主血。諸藥入肝經血分者。併入心包。少陽主氣。諸藥入膽經氣分者。併入三焦。命門相火。散行於膽。三焦心包絡。故入命門者。併入三焦。此諸藥入諸經部分也。

藥有相須者。同類而不可離也。如黃柏知母。破故紙胡桃之類。相使者。我之佐使也。相惡者。奪我之能也。相畏者。受

彼之制也。相反者。兩不相合也。相殺者。制彼之奪也。此異同之義也。

肝苦急。血燥故急。急食甘以緩之。肝欲散。木喜散。急食辛以散之。以辛補之。以酸泄之。以散爲補。以斂爲泄。心苦緩。緩則散。急食酸以收之。心欲喫。急食酸以喫之。以酸補之。按水能剋火。然心以下交於腎爲補。取旣濟之義也。以甘渴之脾苦濕。急食苦以燥之。脾欲緩。舒和急。急食甘以緩之。甘以補之。苦以渴之。肺苦氣上逆。火旺。急食苦以渴之。肺欲收。急食酸以收之。以酸補之。以辛泄之。腎苦燥。急

## 醫學全書

### 藥經卷一

七

食辛以潤之。腎欲堅。堅固則無枉蕩之患。急食苦以堅之。以苦補之。以鹹渴之。此五臟補渴之義也。

風淫于內。治以辛涼。佐以苦甘。以甘緩之。以辛散之。風屬木。辛屬金。金能勝木。故治以辛涼。過辛恐傷真氣。故佐以甘緩之。木喜潤。辛甘益氣也。木性急躁。達故以辛散之。熱淫于內。治以鹹寒。佐以甘苦。以酸收之。以苦發之。水勝火。故治以鹹寒。甘勝鹹燥。火過而以火利竅滯濕。故收之。熱結故以苦發之。熱淫于內。治以苦熱。佐以酸淡。以苦燥之。以淡泄之。濕爲土氣。水能制土也。火利竅滯濕。火淫于內。治以鹹冷。佐以苦燥。濕淡能利竅滯。水能制土也。

以酸收之。以苦發之。相火畏火也。故治以寒冷而升發之也。燥淫于內。治以苦溫。佐以甘辛。以苦下之。燥屬金。苦屬火。能勝金。故治以苦溫。以辛潤之。甘能緩。辛能潤。苦能下。故以爲佐也。寒淫而堅腎泄中。有能補也。此六淫主治各有所宜。故藥

性宜明而施用貴審也。

人之五臟應五行金水木火土。金生水。水生木。木生火。火生土。土生金。子母相生。經曰。虛則補其母。實則瀉其子。又曰。

### 醫學全書

#### 藥經卷一 八

子能令母實。如腎爲肝母。心爲肝子。故入肝者。併入腎與心。肝爲心母。脾爲心子。故入心者。併入肝與脾。心爲脾母。肺爲脾子。故入脾者。併入心與肺。脾爲肺母。腎爲肺子。故入肺者。併入脾與腎。肺爲腎母。肝爲腎子。故入腎者。併入肺與肝。此五行相生。子母相應之義也。

酸傷筋。筋縮。辛勝酸。辛屬金。酸屬木。金克木。故曰勝木。苦傷氣。火氣屬金。苦屬火。火勝木。故曰勝木。甘屬土。土能勝水。水能勝火。故曰勝火。水屬木。木能勝土。故曰勝土。辛傷皮毛。辛屬火。火屬金。故曰勝金。火散。苦勝辛。苦屬火。辛屬土。土能勝水。水能勝火。故曰勝火。

目鹹傷血。鹹能甘勝鹹。目屬土。鹹屬水。故曰勝。此五行相  
克之義也。相克者金克木。水克火。火克金也。酸走筋。筋病  
母多食酸。筋得酸則拘。掣收引益甚也。苦走骨。骨  
病母多食苦。骨得苦則陰益甚重而難舉也。甘走  
肉。肉病母多食甘。肉得甘則壅氣。膩腫益甚也。辛  
走氣。氣病母多食辛。氣得辛則散。而益虛也。鹹走  
血。血病母多食鹹。血得鹹凝滯而口渴也。鹹能滲泄津液  
此五病之所禁也。

藥之爲物。各有形性氣質。其入諸經有因形相類

### 醫學全書

#### 藥經卷一 九

者。如連翹似心而入心。蕩  
枝似翠丸而入腎之類。有因性相從者。如屬木  
屬水者。入腎。謂者。走血。分燥者。入氣。  
分本天者。親上。求地者。親下之類。有因氣相求  
者。如氣香入脾之類。有因質相同者。如藥之頭入頭  
者。焦入心之類。有因皮行皮。又如紅花蘇木  
汁似血而入血。分之類。自然之理。可以意得也。

藥有以形名者。人參。狗脊之類是也。有以色名者。  
黃連。朱參。丹參。元參之類是也。有以氣名者。豨莶。  
香薷之類是也。有以味名者。甘草。苦參之類是也。有以  
時名者。夏枯。半夏。冬青。欵冬之類是也。有以能名

者何首烏骨碎補之類是也。

凡藥火製四煅煨炙炒也。水製三浸泡洗也。水火共製二蒸煮也。酒製升提薑製溫散入鹽走腎而軟堅用醋注肝而收斂童便製除劣性而降下米泔製去燥性而和中。乳製潤枯生血蜜製甘緩益元陳壁土製藉土氣以補中州。麵煨麪製抑酷性勿傷土。脢烏豆甘草湯瀆並解毒致令和平。羊酥豬脂塗燒咸滲骨容易脆斷去穰者免脹去心者除煩此製治各有所宜也。

醫學全書

藥引卷一

十

藥引秘旨

劉常彥撰

湯之有引如舟之有楫故湯劑必須置引如發散取汗用薑棗必須引之分兩與藥等分宜用鮮薑溫中用煨薑解脹用薑皮消痰用薑汁調營益衛用大棗補氣益血用龍眼肉瀉火安神用燈心草表症用葱葉裏証用葱莖健脾止瀉用蓮肉止痢瀉便用石蓮子治風病用桑葉治濕病用桑枝保胎用陳苧根安胎用鮮苧汁抑脾用鮮荷葉疎土用枯荷根補心用新小麥止汗用浮小麥清熱解

煩用青竹葉利水渴火用淡竹葉消瘀通經用赤糖止痛溫中用飴糖安中益脾用陳壁土止嘔和胃用山黃土消瘀用蓮藕節止血用側柏葉止嘔用柿蒂定呃用箬蒂涼大腸用柿霜消風痰用竹瀝鴻寶火用竹茹退虛熱用童便補元陽用人參益真陰用秋石去風舒筋用黃松節安魂定魄用金銀鱗定喘用銀杏肉療痢用扁豆花補火壯陽用胡桃蜀椒緩宮止帶用艾葉蛇床虛煩用粳米欽熱渴用蘆根汁潤火嗽用梨汁止外血用金墨。

## 醫學全書

藥引卷一  
十一

療崩漏用陳棕灰止火瘡用烏梅肉治赤痢用紅麴醫白痢用煨姜治帶濁用韭菜子甯癆嗽用枇杷葉探吐用甜瓜蒂達生用青葱莖療黃病用針砂頭狂用鐵錫水潤腸用松子仁療疝用荔枝核通人乳汗用陳通草片發麻瘋汗用紫背浮萍治傷寒心煩不眠用雞子黃療傷寒咽喉疼痛用猪膚湯藥引多端難以備陳今以常用者聊錄數則舉一反三其爲良工乎。

陶隱居名醫別錄合藥分劑法則

**凡言剉如麻豆大者**與古咬咀同意古之制也古

豆大煎之使藥水清飲於腸中

則易升易散今人以刀剉之

中

**凡言銖者**十黍爲一銖每銖約今四分一厘七毫

筋六銖爲一分四分爲一兩十六兩爲一

兩古云三兩卽今之二兩古云二兩卽

四銖爲一兩古云六銖爲一六卽今之二錢半也二十

錢半也今之六

也

**等分者**謂諸藥皆同一樣

平分多少分兩也

**凡丸散云刀圭者**十分方寸七之一

准如梧桐子大也

**方寸七者**作七正方一寸抄散取不落下

方

七者爲度五七者卽今之五銖錢量

**五字者**卽以一錢邊抄

之不落爲度

**撮者**四刀圭也如四

梧桐子大也

**藥以升合分者**謂藥有虛實輕重不得筋爾則以

升平之十撮爲一勺爲一合十合爲一升上徑一寸下徑六分升八分內散藥物放

抑之正爾微動令平爾

○李時珍曰古之一升卽今之二

合半也

**凡云巴豆若干枚者**粒有大小當去心皮核

去穰畢以五

**枳實若干枚者**錢准一枚

去穰畢以五

**棗大小三枚**准一枚

去穰畢以五

**凡荳蔻子一升者**四兩

爲正

**凡蛇床子一升者**三兩半

爲正

## 醫學全書

### 分門卷一

十一

凡地膚子一升者。

四兩爲正。九兩爲重。不可稱准者取平升爲正。

凡兔絲子一升者。

九兩爲正。凡子各有虛實輕

乾薑一累者。

以一兩爲正。

半夏一升者。

洗畢稱五兩爲正。

凡蜀椒一升者。

三兩爲正。

凡吳萸一升者。

五兩爲正。

凡桂一尺者。

到去粗皮重五錢爲正。

甘草一尺者。

二兩爲正。

凡某草一束者。

三兩爲正。

凡煎湯藥。

初欲微火令小沸。其水數依方多少。大約藥二十兩。用水一斗者。煮取四升。以此爲准。然利湯欲生。少水而多取汁。補湯欲熟。多水而少取汗。服湯宜小沸。熱則易下。冷則嘔涌。

凡云分再服三服者。

要合勢令相及。并視人之強弱羸瘦。病之輕重爲之進退增減。不必局於方說。則活潑潑地也。

凡藥云如細麻者。

即胡麻也。不必扁扁畧畧相稱耳。

醫學全書

分劑卷一

十三

棗粟亦然。

云如火麻子者。准三細。

如胡豆者。即今青斑豆也。以二大麻豆准之。

如小豆者。即今之赤小豆也。以三大麻豆准之。

如大豆者。以二小豆准之。

如梧桐子者。以二大豆准之。

如彈子大及雞子黃者。以四十梧桐子准之。

凡方云蜜一觔者。有七合也。

猪膏一升者。有一升半合也。

醫學全書

分門卷一

古

## 醫學全書

## 服藥禁忌

服甘草

忌猪肉  
菜海菜

黃連

忌黃連  
冷水

服蒼耳

忌豬肉  
米泔

桔梗

忌馬肉  
豬肉

仙茅

忌牛肉  
牛乳

半夏

忌羊肉  
菖蒲

牛膝

忌牛肉

陽起石

雲母  
忌羊血

商陸

忌犬肉

吳茱萸

忌猪心

丹砂

空青  
輕粉

補骨脂

忌諸血

地黃

何首烏  
並

細辛

忌一切血  
葛根

藜蘆

忌狸肉

荆芥

忌驥肉  
及河豚

紫蘇

天門冬  
骨并

丹砂

龍

**巴豆** 忌野猪肉  
蘆薈或生薑

**蒼朮** 白朮 忌雀肉  
葛菜 桃李

**溥荷** 忌鯪肉  
蘆薈或冷水

**麥門冬** 忌鯽魚  
稻米

**當山** 忌生葱  
生菜

**附子** 馬頭天雄 忌豉汁  
胡椒

**牡丹皮** 忌蒜  
忌莧菜

**厚朴** 草麻 忌炒豆  
威靈仙

**鰲甲** 忌生葱  
生菜  
**當歸** 忌蕷茜  
忌蕷茜  
**凡服藥不可雜食肥** 猪犬肉油膩羹臘臘陳臭  
**諸物并不可多食** 生蒜胡荽生葱諸果諸滑滯之  
**物不可見死尸** 產婦淹穢等事

醫學全書

藥品卷一  
七

## 諸獸毒

獸破尾。鹿豹文。羊獨角。羊六角。羊心。孔有  
白羊頭黑。墨羊頭白。白馬頭黑。曝肉不燥。肉不沾土。  
馬蹄夜日。犬懸肉蹄肉。米甕肉中肉。肝有黑色。肉多星。

## 諸鳥毒

鴨目白者。雞有四距。白鳥元首。元鳥白首。  
烏足不伸。卵有八字。烏四距六趾者皆有毒。

## 醫學全書

獸毒卷一

三

## 諸魚毒

魚目有瞬。目能開合。腦中連珠。魚無腮者。  
二目不同。腹下丹字。鱉目白者。額下有骨。  
蝦煮不彎。蝦白鬚者。蟬腹下毛。兩目相同。

## 諸果有毒

桃杏雙仁及果未成核者俱有毒。五月食未成核  
者之果令人發瘡癩及寒熱。秋冬果落地惡蟲綠  
食者食之久漏。

## 諸肉毒