

辨傷寒發黃例第十一

發黃溼熱交併。民多病瘴。瘴者。單陽而無陰也。太陰脾土溼熱所蒸。色見於外。必發身黃。溼氣勝則如薰黃而晦。熱氣勝則如橘黃而明。傷寒至發黃。熱勢已極。且與畜血症大抵相類。但小便不利爲黃。小便自利爲畜血。又有內傷陰症。亦有發黃者。須當明辨之。不可混作溼熱而治。一切發黃。設或寸口無脉。鼻中冷氣。與夫形如烟煤。搖頭直視。環口鰲黑。舉身發黃。此皆真臟絕也。瘀熱在裏。但頭汗出。到頸而還。身無

汗渴飲水漿。小便不利。此爲痰熱在裏。因汗不越。必發黃。其色如橘子色之黃明也。大便不通者。茵陳湯。小便不利者。茵陳五苓散。○濕熱發黃。一身盡痛。發熱口渴。小便不利。色如熏黃。暗而不明也。用茵陳五苓散。大便實者。茵陳湯。

寒溼發黃者。病人身疼。發熱而黃。頭疼鼻塞而煩。其脉大。自能飲食。腹中和。無病。病在頭中。寒濕用瓜蒂散。搐鼻中。取黃水出。則愈。或用神朮湯。加麻黃。茵陳。微汗之。溼家發黃。一身盡痛。不能轉側。身熱色如薰黃。

黃。小便不利。茵陳五苓散。小便自利。朮附湯。身煩疼。
麻黃湯加蒼朮。○痞氣發黃。病人心下滿硬。按之不
痛者是也。宜半夏瀉心湯。加茵陳枳實。小便不利。宜
茵陳五苓散。加山梔。蓋痞消則黃自退也。○結胸發
黃。病人心胸滿硬。按之痛。或手不可近。大陷胸湯。加
茵陳。蓋結去則黃自退也。○畜血發黃者。其人身黃。
脉沉結。小腹滿硬。小便自利。大便黑色。其人如狂。此
爲畜血在下焦。用桃仁承氣湯下之。蓋血下則黃退
也。○內傷寒發黃者。其人脾胃素虛。或食寒涼生冷。

之物或傷食結搏停滯不散。中州變寒而發黃也。或嘔吐。或腹滿。或腹痛。或自利。小便短少者。宜調中湯加茵陳。或理中湯加枳實。茵陳。青皮。陳皮。草果。逆冷。脉沉。加附子。溫之而愈也。○陰症發黃者。其人兩丁脉沉細遲。肢體逆冷。肉上粟起。或氣嘔悶。舌上白胎而滑。遍身發黃。或時煩燥。面赤。或時欲投泥水中。或欲坐井中者。此陰黃也。輕用理中。加茵陳。重用四逆湯。加茵陳。○凡治陰黃。須用熱湯溫之。或以湯盛盆中。將病人坐於上。以布蘸熱搭其黃上。乃愈。○凡

黃如合麴相似。淫熱瘀血。証發黃者。則多有之。其內傷寒發黃。陰証發黃者。則間或有之也。經云。脉沉。渴欲飲水者。必發黃。陽明病。無汗而小便不利。心中懊惱者。必發黃。○又被火劫。額上微汗出。小便不利。心中懊惱者。必發黃。○大抵身熱煩渴。無汗。小便不利者。必發黃也。

茵陳湯

茵陳

上

梔子

中

大黃

下

水燈心煎服。○若小便利。如皂角針灰汁色。

狀則黃從小便出也。

梔子升麻湯

治發黃面目悉黃如金小便濃汁少。諸藥不効者。

茵陳

上

山梔

中

黃芩

中

大黃

中

柴胡

上

升麻

下

龍胆

下

人弱大便實去大黃加木通猪苓。○水澄心

煎服

龍膽湯

治傷寒時氣瘀血發黃

草龍膽

上

生犀角

中

升麻

下

茵陳

下

加山梔木通黃連○水燈心煎服○天便實者加大黃

得効方

治發黃身目悉黃如金色小便如濃煮栢汁諸藥不効者

茵陳

黃連

山梔

黃芩

黃栢

柴胡

甘草

龍胆

升麻

木通

滑石

大便秘實加大黃。○虛弱加人參。○目睛黃倍加龍胆草。○水燈心煎服。

茵陳犀角湯

治時氣發黃并發斑者

茵陳

上

龍胆草

中

犀角

升麻

下

山梔

上

黃連

上

木通

中

黃柏

中

共搗爲細末。每服二錢。真牛乳一鍾。水一鍾。

煎。

茵陳五苓散

治溼熱發黃。渴飲水漿。小便不利者。

茵陳

白朮

中

茯苓

中

猪苓

澤瀉

中

官桂

下

小便赤澁。加木通。黃柏。山梔。滑石。去。仕。○身

熱。加柴芩。去桂。○目睛如金。加龍胆。早黃連。

去桂。○渴。加天花粉。去桂。○水煎服。

一方

煩渴不寧。心燥發黃。小便不利者。以辰砂益元

散調茵陳五苓散二三錢乃効。

瓜蒂散

治寒濕發黃

瓜蒂

五分

毋丁香

五分

黍米

三分

赤豈

三分

右爲細末。於鼻中搐之。口噙水。鼻中黃水出。乃愈。

茵陳四逆湯

治陰黃脉沉遲厥冷腰以下自汗。

附子

上

茵陳

上

乾姜

上

虛弱加人參○水煎服

茵陳茱萸湯

治陰黃腹痛或脉伏不出

吳茱萸

上當歸中

附子下

水通下

乾姜

中

茵陳

上

人參

中

水燈心煎服

茵陳理中湯

治陰黃腹痛或自利者及內傷寒發黃者

茵陳

上

白朮

中

乾姜

下

人參

下

小便不利合五苓散○脉沉足冷加附子下

○內傷生冷之物發黃者。本湯去人參。加枳實。青皮。陳皮。草薢。木香。砂仁。○水姜煎服。

擦黃法

用茵陳一把。姜半片。搗爛。縣裹。週身擦之。最効。
此爲良法。

辨傷寒發狂例第十二

傷寒發狂最爲惡候。其例多般。要在明辨治之。陽盛發狂者。陽盛則四肢實。實則登高而歌也。此傷寒熱毒入胃。併入於心。遂使神不寧而志不定。始得少臥不安。妄語悲歎。甚則登高而歌。棄衣而走。踰垣上屋。罵詈叫喊。不避親疎。大渴欲飲。獨陽亢盛。重陽著狂。此神明之亂。皆非素所能爲。乃病之使然也。一切發狂奔走。勢不可遏者。須於病人處生火一盆。用醋一碗。傾於火上。其煙衝入病人鼻內。仍將姜汁噴於病

人頭面身體手足即安。方可察其陽狂陰燥。用藥若病初起。頭疼發熱。惡寒體痛。表症皆除已後。熱邪傳裏。大渴飲水。目赤唇焦。舌乾齒燥。狂妄不寧。脉來洪數有力。大便實者。急宜大承氣下之。不大下之。何能止也。如熱勢輕。未可大下者。宜加減三黃石膏湯治之。但見舌卷囊縮。難治。間有可生。亦宜急下。不可緩也。與陰症囊縮者。大不侔矣。若發狂直視。便溺自遺。與夫汗後大熱。脉躁疾。狂言不能食。或也。陽明經病。欲作汗而狂者。病人欲食。小便反不利。大便自調。骨

節痛。翕然如有熱狀。奄然發狂。濺然汗出而解。此水不勝土。穀氣與汗共併。故發狂。脉緊者。則汗出而愈也。○若畜血發狂者。傷寒六七日。或八九日。其人發狂。脉沉數。乃熱在下焦。小腹硬滿而痛。或身黃。小便自利。以其有畜血也。宜桃仁承氣湯下。盡黑物則愈。熱輕者。喜忘如狂。脉微身黃。唇痿舌青。口燥。或但漱水而不欲嚥者。又無寒熱。小便自利。大便黑色。此亦畜血証也。輕用犀角。地黃湯。甚者。桃仁承氣湯下。血則愈。○若太陽不解。熱結膀胱。其人如狂而血自下。

者愈。若外不解與桂枝湯外已解內不消但小腹急結。或硬痛滿。小水自利大便黑亦畜血証也。桃仁承氣湯。此三者雖如狂未至于狂也。○驚狂者傷寒脉浮無汗。醫以火逼取汗必驚狂臥起不安。宜桂枝救逆湯。調辰砂末。溫病發狂者乃冬月伏寒所化。至春時因溫氣而發也。表症在者芩蘇散合羌活冲和湯。加柴葛若半表半裏者小柴胡湯。若脉大胸滿多痰發狂者小柴胡加枳桔瓜蒌山梔升麻吐之。若脉浮數壯熱而不得汗出者宜六神通解散汗之。若表裏

俱實熱盛者。宜三黃石膏湯主之。○若邪熱傳裏。燥渴譫妄。大便秘實者。當用大承氣湯下之。○若熱病發狂者。乃冬月伏寒所化。至夏月因炎暑而發其熱。勢比之溫病尤加盛也。○若發表用神朮湯加芎蘇。○若發狂無汗。脉數大者。六神通解散。汗之熱甚者。三黃石膏湯主之。裏熱燥渴譫妄。大便秘實。脉洪實者。大承氣下之。

一切熱病發狂。切不可掩閉床帳。務用揭開。放入爽氣。良久。隨用銅鏡按在心胸間。熱勢稍退。即除。若傷