

193471



醫學故事通俗叢書

基本館藏

麻疹的故事

蘇 珊 著



上海新亞書店印行



有著作權

不得翻印

醫學故事通俗叢書
癩疹的故事

(全一冊)

人民幣 2.400 元

一九五一年五月初版

著作者 蘇 珊

發行者 新亞書店

代表人 陳 邦 楨

上海：河南中路 159 號

7156
41
212
¥ 5.00

前記

麻疹，在我國一般都稱做「出痧子」，或叫做「出瘡子」；病起來，是先有發熱，接着臉上和身上，就生出許多紅的疹子來。

這是一種流行在小孩子身上的傳染病，也可說是一種專門侵犯兒童的急性發疹傳染病，更是一種傳染力極強的濾過性病毒流行病，它的踪跡，遍佈了全世界。

在上海，一年四季都在流行着，以冬天和春天流行最多，幾乎每天都有；一到嚴冬，感染麻疹的幼兒及兒童，就格外增多起來。

我們隨便詢問一位老年人，他或她，都會回答你：「從小已發生了這個病！」也可見這病在我國流行的廣泛和普遍了。

從表面上看起來，成年人似乎不容易傳染，或者不會被傳染。其實，絕對大多數都在幼時已經患過本病，享有了完全的免疫性，所以在成人時

不再患此病了。

依照統計，麻疹約有百分之八十七，發生於十五歲以下的兒童；其中的約半數，又爲不滿五歲的兒童。但是，不到四個月的嬰兒，卻有顯著的免疫力，很難感染本病，患過本病一次以後，大抵都可以獲得了終身的免疫力，第二次再發病的很少。

我國一般無醫學常識的人，還是根據過去中醫的說法，根本不認爲這個病，是一種有危險的疾病。甚至於多少家庭中的孩子患了病以後，也不去求醫，自己會用土法治療。因此，冤枉斷送了生命的很多。我們常聽老年人說起，這個病是不重要的，只須避避風，房間裏用了紅色的窗簾，或在燈罩上用了紅布或紅紙包裹了，就不妨事啦；根本也不知道是一種傳染病，更談不上什麼預防了。

這個病，在中國，因不屬於最危險的傳染病，所以並未列入「法定傳染病」。但是，蘇聯卻是將它列入法定傳染病之一的，也可見蘇聯對於此

病的重視了。

我們相信，流行很廣泛的麻疹，是能用預防的方法加以控制的；一面，對於不必要的併發症的減少，和死亡率的減少，都有幫助；所以，我們站在「公共衛生」的立場，依照「預防為主」的政府政策的原則下，對於這種流行廣泛的疾病，非加以預防不可！

怎樣預防麻疹呢？

請聽我講述「麻疹的故事」吧！

故事的内容，是參考左列的資料寫成的：

——婦嬰衛生七卷一期：傅積仁著：「麻疹的預防」

——科學廣場三十一期：田同著：「嚴冬談麻疹」

——人民科學新二期：吳鎮宇著：「會不會是瘰子呢？」

——民本出版公司婦幼衛生手冊：宋杰著：「兒童常見的急性傳染病

及其預防」

高鏡朗著：「兒童傳染病」卷三第四章：「麻疹」
——「婦幼衛生展覽會彙刊」第九部：「麻疹的預防」
謹此申明，並向原作者致謝。

一九五一年二月一日夜，蘇珊記於上海。

193471

39177

5

47156

441

目錄

前記

一 李二弟會不會出痧子呢？

二 出痧子不會有多大危險嗎？

三 痧子是可以傳染的！

四 感染麻疹病毒後的症狀

五 紅色的疹子和討厭的併發症

六 麻疹護理的重要

七 特殊病變的急救常識

八 麻疹的預防常識

九 不受醫師勸告的結果

十 麻疹的類種和發疹過程


三一 二九 二二 一九 一六 一三 一〇 六 三 一 一

一 李二弟會不會出痧子呢？

這兩天來，李二弟沒有到我家中來玩，聽說是病了。我很喜愛這孩子，特地到她家裏去探望，恰巧碰見她的媽媽李大嫂，我連忙招呼說：「好幾天不見了，聽說你家二弟身體不好，是生的什麼病吓？」

李大嫂點頭說：「是呀，他前日白天還是好好的，到黃昏時候突然發起高熱來，精神不大好，還有點咳嗽；也許是流行性感冒，但是吃了點傷風藥，卻一點也不見效果！」

我關心地問：「噢，發熱已經兩天了嗎？這樣說來，會不會是痧子呢？現在的季节，正是痧子流行的時候啊！」



附圖一：黃昏時，李大嫂發現二弟精神不好，還有點咳嗽。

李大嫂自語着：「對了，會不會是痧子呢？」卻又問我：「可是，蘇先生，怎樣才能確定是痧子呢？」

我告訴她：「現在，發熱還不過第三天，要確定是不是出痧子，的確不是十分容易的。可是，出痧子的時候，有幾種現象，倒是很明顯的；我家兩個孩子，新近先後出過痧子，所以我略爲懂得一點。我倒要問你：除了發熱和咳嗽以外，二弟的眼睛，是不是水汪汪而多眼淚眼屎？而且很怕見亮光？鼻涕多嗎？還有，在她嘴巴裏面頰內面靠近大齒的地方，有沒有細小的白斑點？」

李大嫂想了一會，說：「這種種現象，倒確是有的！今天我爲了怕她生白喉，還看過她的喉嚨，發現了她的嘴裏，有些白斑；這是昨天所沒有的！」

我思索半響，猜測地說：「有了這些現象，痧子的可能性就更大了；因爲痧子在經過了十天左右的潛伏期後，最初發生的，就是眼睛鼻子方面

和發熱咳嗽等現象，從發熱第二天或第三天起，嘴巴裏就生出白斑，這是痧子的特殊症狀。」

李大嫂焦急地問：「那末，以後呢？」

我回答：「大概在開始發熱後三、四天，痧子的紅疹，就會發出來；先從耳朵根後面開始，逐漸發到面部、全身和四肢。」

李大嫂肯定地說：「給你一說，那一定是痧子了；今天她耳後頭髮根處，和額角上，真的有幾顆紅疹呢！」

二 出痧子不會有多大危險嗎？

出我意料的，李大嫂的焦急神情，頓時在面部消失了，很泰然的說：「既然我家的二弟是出痧子，我也好放心了；反正痧子是小孩的常事，祇要窩得暖一點，是不會有多大危險的！」

李大嫂還告訴我自己的經驗：「我在八歲的時候，也出過痧子，只是

睡在門窗緊閉的房屋內，一點也不通風，這個病只有避風最爲要緊；同時還用了櫻桃核與棉紗線泡開水代茶吃，既不請醫生來看，也未用過其他什麼藥品，結果呢，這病也自然地好了！」

我連忙警告她：「可是，你也得小心，痧子往往會引起其他種種嚴重的合併症呢？」

李大嫂有些不信：「痧子，會引起什麼病吓？」

我簡單地說：「好像肺炎呀、中耳炎呀、痢疾呀、假膜性咽喉炎呀，都可以隨着痧子併發；還能併發白喉和猩紅熱，甚至可轉變爲肺癆病呢！」

接着我又叮囑說：「要防止這些病症，必須隨時注意衛生；用硼酸水洗洗眼睛，漱漱口，眼睛雖然不能直接見光，但是空氣和陽光，還是要注意調節的；把房間緊閉得一點也不透風，這種老方法是不對的！咳嗽利害時，可以吃一點止咳藥水；受冷固然不好，發熱很高而窩得太熱，也不是

好辦法。

「還有飲食方面，營養也是十分重要，而必須加以照顧的；不要爲了痧子而『忌口』，假若營養不良，一方面使痧子本身不容易很順利的痊癒，一方面經過了大約一星期的病程，而痧子逐漸退去後，更會因身體衰弱，而引起其他毛病；譬如俗語所說的『痧癆』，就是因爲痧子而引起的結核病發作呀！此外，也能發生心臟衰弱、走馬疳、結核性肋膜炎等病，不幸的都可死亡呢！」

李大嫂聽得有些着急起來：「那末，蘇先生，有人勸我二弟是出痧子的話，趕快打配尼西林針，確實有效嗎？」

我搖着頭答：「許多人往往不管三七二十一，替出痧子的病人打配尼



附圖二：把房間緊閉得一點也不透風，這種老方纔是不對的！

西林針，實際上倘若沒有肺炎等合併症，痧子本身是不可能，也是不應該打配尼西林針的。它非但沒有好處，有時往往反而有害。」

三 痧子是可以傳染的！

緊接着我又很鄭重的說：「此外，還有一點要牢記：痧子是可以傳染的！所以，家裏有了出痧子的小孩，應該使他不要和其他的小孩接觸。」李大嫂又着急起來：「那末，我家新生出才兩個月的小毛頭，也有傳染的危險了！還有，我八歲的大女兒，雖然以前已經出過一次痧子，但也容易傳染的，那可怎末辦？」


我微笑着說：「那倒不一定，大凡新生嬰兒在四、五個月以內，因為有得自母體的抵抗力，所以比較不容易傳染；已經出過的人，通常也不會再出痧子；不過，這兩種情形，也往往有例外，所以還須小心預防。」我又加重語氣說：「預防總比不防好，而且，預防在發病以前，總比

治療在發病以後，更爲安全而經濟。」

我正和李大嫂談着，想不到李大哥已完全在旁邊聽到了我們的談話，插嘴進來說：「對啦！我常聽人說，現在人民政府的衛生政策，是以『預防爲主』，聽你如此一解釋，我們都明白過來了，並且一定要好好地照辦，還要把我們所了解的，輾轉告訴給我的許多親戚朋友鄰居們，讓大家都注意預防！」

我又叮囑說：「李大哥，你們的二弟已經出了痧子，治療還是很重要的，趕快請個醫生來診斷一下才好。」

李大哥聳聳肩說：「不錯，我馬上就走，趕快請位醫生來看看！」說完，李大哥就匆匆地出門去了。



附圖三：李大哥聳聳肩說：「我馬上就走，趕快請位醫生來看看！」

李大嫂繼續問我：「爲什麼痧子能傳染呢？」

我解釋道：「我們所叫的痧子，也有人叫做瘡子，但醫生卻稱爲麻疹。這種傳染病，是由一種看不見的、事實上確實存在的、醫學上叫做濾過性病毒所傳染；這種濾過性病毒，比其他的一切病菌還微小，小到連顯微鏡也瞧不見；可是，這種病毒，卻存在於病人的鼻涕、咽喉分泌物、以及初病時的血液裏。各種分泌物常作飛沫狀，散佈在空氣裏，健康而無免疫力的人碰到了，就有被傳染上這病的可能。」

李大嫂奇怪起來：「既然連顯微鏡也瞧不見的東西，怎能知道它的存在呢？」

我舉個例子說：「爲了證明這種病毒的存在，有人曾用痧子病人的鼻涕，接種到猿的身上去，結果，這猿也生了同樣的病症。這些病毒，並且還可以在雞胚膜上培養生存呢！」

李大嫂又問：「那末，爲什麼嬰兒初離母體，倒不怕這些病毒的傳染

呢？」

我再仔細解釋：「因為胎兒在母體內時，母體中既存的免疫力，能由胎盤及臍帶中輸予胎兒，出生以後，由母體中所獲得的免疫力，漸漸消失，所以從出生第四、五個月以後，就有生這病的機會了。」

李太嫂自語着：「這樣說，這種病，孩子傳染的可能性比較大。」

我點着頭：「患這病的人，以一歲到五歲之間的小兒爲最多，五歲以上，顯著的減少，成人更少了。而病的嚴重性，也是孩子愈小，就愈嚴重。」

我又補充說：「這種情形，世界上到處一樣；在上海，我曾經訪問過某醫院，一九四九年度中所收治的麻疹病人的情形，也是如此；據他們統計：一歲以下的三十二人，一歲的四十四人，兩歲的四十九人，三歲的三十五人，四歲的二十九人，五歲到九歲的共三十九人，十歲以上的共二十五人。」

四 感染麻疹病毒後的症狀

我和李大嫂正談着的時候，李大哥已領着金醫師到來；我本來和金醫師很熟悉，但這時不容許我們閒談，大家點點頭招呼過後，金醫師就匆忙地隨着我們踏進病孩的房中。

這時候，二弟的發熱很高，金醫師做完體溫的測量以後，搖搖頭說：「熱度已到了攝氏四十度三，但現在還不能確定是不是麻疹。」

金醫師又仔細檢查了二弟的鼻腔、咽喉、和各器官，都有發炎現象；眼結膜也有炎症，不但發紅，而且有分泌物，怕見亮光；鼻涕不斷流出，接連的打噴嚏，和咳嗽；金醫師自語着：「這孩子的確是感染了麻疹，而且這病的潛伏期至少已在十天以上了！」

李大嫂問着：「什麼叫潛伏期？」

金醫師解釋道：「一個健康而無免疫力的人，在接受了麻疹的濾過性