

重修政和經史證類備用本草

重修政和經史證類備用本草卷第十四

增補

成都唐

慎微

續證類

類

續證類備用本草卷第十四

救校勘



木部下品總九十九種



一十八種神農本草經

白字

七種名醫別錄

墨字

二十一種唐本先附

注云唐附

一十七種今附

百醫家嘗用有效注云今附

九種新補

一種新定



二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

巴豆

蜀椒

目葉崖椒續注

皂莢

鬼皂莢續注

訶梨勒

隨風子附唐附

柳華

葉實子汁附

棟實

即金鈴子也根附皮續注

椿木葉

樗木附唐附樗白皮續注

郁李人

附根

莽草

無食子

附唐

黃蘗根

附今

雷丸

櫨

斛音若皮附唐附

白楊皮

附唐

桄榔子

附今

蘇方木

附唐

樺樹皮

葉山樺續注

桐葉

花梧桐皮油續注

胡椒

附唐

釣樟根皮

樟材續注

千金藤

附今

南燭叔葉

附今

無患子

附今

梓白皮

附葉

橡實

唐附櫟樹皮續注

石南

附實

木天蓼

唐附子續注



黃環

益智子

附今

搜

搜

疏

疎

鼠李

椰子皮

漿附今附

枳

止音

棋

唐附

小天蓼

附今

小藥

附唐

莢

附唐

紫荊木

附今

紫真檀

烏臼木

唐附子續注

南藤

附今

鹽麩子

樹白皮根白皮今附藥上穗子續注

杉材

附杉菌

接骨木

附唐

楓柳皮

附唐

赤爪

側紋切

木

附唐

樺木皮

附今

榼藤子

附今

榷實

藥荊

唐附子續注

扶移木

補新

木鼈子

附今

藥實根

釣藤

藥華

蔓椒

感藤

補新

赤檉木

今附即三春柳是也

突厥白

附今

賣子木

附唐

婆羅得

附今



甘露藤新補

大空唐附

椿莢新定

水楊葉唐附

楊櫨木唐附

欖子新補

楠材

柘木新補

柞木皮新補

黃櫨新補

梭櫨子皮附新補

木槿新補

堯花本在草部今移

二十六種陳藏器餘

枳櫨木

楸木皮

沒離梨

柯樹皮

敗扇

松根

櫟下灰

榔桐皮

竹肉

桃竹笋

鬻子桐子

馬瘍木

木細辛

百家筋

檮木皮



刀鞘

笑樹

丹桂木皮

結殺

杓

車家雞棲木

檀

石荊

木黎蘆

爪蘆

諸木有毒

戎州巴豆



巴豆味辛溫生溫熟寒有大毒主傷寒溫瘧寒熱破

癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩練五藏六腑

開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱症邪物殺蟲

魚療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺班貓

毒可練餌之益血脉令人色好變化與鬼神通一名巴

椒生巴郡川谷八月採陰乾用之去心皮荒花爲之使惡藁草畏大

黃黃連蘼蘼陶隱居云出巴郡似大豆最能瀉人新者佳用之皆去

心皮乃秤又熬令黃黑別搗如膏乃和丸散爾道方亦有練餌法服

之乃言神仙人吞一枚便欲死而鼠食之三年重三十斤物性乃有

相耐如此爾唐本注云樹高丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二月葉漸

凋至四月落盡五月葉漸生七月花八月結實九月成十月採其子

三枚共蒂各有殼裹出眉州嘉州者良今陳藏器本草云巴豆主

癥瘕疰氣痞滿腹內積聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大

者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四邊不得有損

使吞之以飲壓令下少間腹內熱如火痢出惡物雖痢不虛若久服

亦不痢白膜破者棄之生南方樹大如圍極高不啻一丈也呂氏

等謹按藥性論云巴豆使中其毒黃連汁大豆汁解之忌蘼蘼醬

豉冷水得火良殺班貓蛇虺毒能主破心腹積聚結氣治十種水腫

痿痺大腴能落胎**日華子**云通宣一切病泄壅滯除風補勞建脾開胃

消痰破血排膿消腫毒殺腹藏蟲治惡瘡息肉及疥癩丁腫凡合丸

散炒不如去心膜煮**圖經**曰巴豆出巴郡川谷今嘉眉茂州皆有

五度換水各煮一沸**圖經**曰巴豆出巴郡川谷今嘉眉茂州皆有

生青後漸黃赤至十二月葉漸凋二月復漸生至四月舊葉落盡新

葉齊生即花發成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃

類白豆蔻漸漸自落即收之二房有三瓣一瓣有實一粒一房共實三粒也

戎州出者殼上有縱文隱起如線一道至兩三道彼土人呼爲金線巴

豆最爲上等

它處亦稀有**雷公云**凡使巴之與豆及剛子須在子細認勿誤

色黑若剛子顯小似棗核兩頭尖巴與豆即用剛子勿使凡修事巴

豆敲碎以麻油并酒等可煮巴豆了研膏後每脩事一兩以酒麻

油各七合

盡爲度**聖惠方**治中風口喎巴豆七枚去皮爛研喎左塗右

心須更即便正洗去**又方**治牙疼用巴豆一粒煨至黃熟去殼用

藥并頻抽掣中指**外臺秘要**文仲方主唯腹大動搖水

豆在內以蓋子合之用綿

裹隨患處左右塞耳中

九十枚去心皮熬令黃杏仁六十枚去皮尖熬令黃

二味搗丸如小豆大水下丸以利爲度勿飲酒

人小兒風癢癰癰心迷悶方巴豆二兩

槌破以水七升煮取三升以帛染拭之

又方治寒癖宿食久飲不

千金

升清酒五升煮三日三夜研令大熟合酒微火煎
之九如胡瓦大每服一九水下欲吐者服二丸
者巴豆去皮針線
穿燕入喉中牽出

千金翼
治小兒身腫并手足腫兼癰癧巴豆
五十枚去皮心以水二升煎取一升

用綿於湯中
隨手拭之
經驗方
鄭樞侍御傳治氣痢巴豆二兩去皮心熬細
研取熟豬肝和九空心米飲下量力加減

服之牛肝尤佳如食
素人以蒸餅丸服
又方
治耳卒聾巴豆一粒蠟裏
針刺令通透用塞耳中
又方
治箭

骨不可拔取巴豆微熬與蜣螂同研塗所傷處斯須痛定微痒忍之
待極痒不可忍便撼動箭鏃即拔之立出夏侯鄆云初在潤州得方

箭鏃出後速以生肌膚傳之說者云兼治瘡鄆得方後
至洪州旅舍主人妻患背瘡呻吟鄆遽用此方試之愈
勝金
治喉

候風巴豆兩粒紙緊角可通得入鼻用刀子切
斷兩頭殼子將針穿作孔子內鼻中久即差
十全方
治疥瘡

粒火炮過黃色去皮膜右順手研如麵入酥少許膩粉少許同研勻
爪破以竹篦子點藥不得落眼裏及外腎止如熏刺着外腎以黃丹

塗甚
初虞方
治藥毒秘効巴豆去皮不出油馬牙消
等分合研成膏冷水化一彈子許服差
賈相公

進過牛經牛有卒疫動頭打肋者以巴豆兩
箇去皮擣末生油二兩淡漿水半外灌之差

蜀椒



施州
崖椒



蜀椒

蜀椒味辛溫大熱有毒主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚
死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘡大風汗不
出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風
邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服之頭不白
輕身增年開腠理通血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作
膏藥多食令人乏氣口閉者殺人一名巴椒一名唐音藟音

生武都川谷及巴郡八月採實陰乾

杏人爲之使畏款冬

陶隱居

云出蜀都北

部人家種之皮肉厚腹裏白氣味濃江陽晉原及建平間亦有而細赤辛而不香力勢不如巴郡巴椒有毒不可服而此爲一名恐不爾又有秦椒黑色在中品中凡用椒皆火微熬之令汗出謂爲汗椒令有勢力椒目令別入藥用不得相雜

唐李時

云椒目味苦寒無毒主

水腹脹滿利小便今椒出金州西城者最善

臣禹錫等謹按爾雅疏

云椒者大椒之別名郭云今椒樹叢生實大者名爲檓詩唐風云椒

聊且陸機云椒樹似茱萸有針刺葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以爲香今成皋諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒

少毒熱不中合藥也可著飲食中又用蒸雞豚最佳香東海諸島上

亦有椒樹枝葉皆相似子長不圓甚香其味似橘皮島上獐麋食此

椒葉其肉自然作椒橘香

藥性論

云蜀椒使畏雄黃又名陸撥有小

毒能治冷風頑頭風下淚腰痛不遂虛損留結破血下諸石水能治

嗽主腹內冷而痛除齒痛

又云

椒目使治十二種水氣味苦辛有小

毒主和巴豆昌蒲松脂以蠟溶爲筒子內耳中抽腎氣虛耳中如風

水鳴或如打鍾聲之聲卒暴聾一日一易若神驗

日華子

云漢椒破

藏結開胃治天行時氣溫疫產後宿血治心腹氣壯陽療陰汗暖腰

膝縮小便淋目主膀胱急

又云

椒葉熱無毒治賁泄伏梁氣

及內外腎釣并霍亂轉筋和艾及葱研以醋湯拌晷並得

圖經

曰蜀椒生武都川谷及巴郡今歸峽及蜀川陝洛間人家多作園圃種之高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑可煮飲食甚辛香

四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓皮紫赤色八月採實焙乾此椒江淮及北土皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳服食方單服椒紅補下宜用蜀椒也韋宙獨行方治諸瘡中風者生蜀椒一升取少麴合搜裹椒勿令漏氣分作兩裹於煆灰火中燒熟及熱出之刺頭作孔當瘡上罨著使椒氣射入瘡中冷則易之須臾瘡中出水及遍體出汗即差施州又有一種崖椒彼土人四季採皮入藥云味辛性熱無毒主肺氣上喘兼欬嗽并野薑蓂末酒服錢匕甚効忌搯下又有蔓椒條云生雲中川谷及丘家間採莖根煮醱酒陶隱居云俗呼爲膠似椒薰音薰小不香耳今亦無復分別或云即金椒是也薰子出閩中江東其木似檉莖間有刺子辛轉如椒主遊蠱飛口及腹冷南人淹藏以作果品或以寄遠吳越春秋云越以甘蜜丸攪與薰同報吳增封之禮然則薰之相贈尚矣

雷公去

一名南椒凡使須去目及開口者不用其椒子先須酒拌令濕蒸從已至午放冷密蓋除向下火四畔無氣後

取出便入礬器中

食療

云溫粒大者主上氣咳嗽久風濕痺又患齒痛醋煎含之又傷損成瘡中風以麴裹

作銀蝕灰中炮之使熟斷開口封其瘡上冷易熱者三五度易之亦治傷損成弓風又去久患口瘡去開口者以水洗之以麴拌煮作粥空心吞之三五匙飯堅之再服差又椒溫辛有毒主風邪腹痛痺寒溫中去齒痛堅齒髮明目止嘔逆滅癰生毛髮出汗下氣通神去老益血利五藏治生產後諸疾下乳汁久服令人氣喘促

聖惠方

治

熱取涼睡有她入口中挽不出用力破
她尾內生椒三二粒裹著須臾即出
外臺秘要 治瘡腫生椒
末麵釜下土

米之以大 **千金方** 有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜
醋和傅之 疼悶不得眠取生椒擇之令淨以布帛裹著

九囊令厚半寸須臾熱氣
大通日再易之取消差
肘後方 治金瘡中風蜀椒量瘡口大小
用麴作餛飩糖火中炮令熟開

一孔當瘡上掩之引風出
可作數枚以差替換之妙
又方 她毒以閉口椒
并藥擣傅之止
孫真人 云十月

食之損氣傷
心令人多忘
又方 治心腹俱痛以布裹椒薄
注上火熨令椒汗出良
斗門方 治腹內虛

顏用生椒擇去不折者除其黑子用四十粒以漿水浸經一宿盡令
口合空心新汲水下去積年冷痰藏肺久服則能駐顏黑髮明目令

人思飲
食妙
勝金方 治好食生茶用椒末不限多少
以糊丸如梧子大茶下十九
深師方 治手足

裂椒四合水煮之去滓漬之半食頃出
令燥須臾復浸乾塗羊豬腦極妙
姚和衆 治小兒水瀉如疳
椒一分去目為末

酥調之少少傅
腦上日可三度
譚氏 治小兒水瀉椒紅散及人年五十已上患瀉
用椒二兩醋二升煮醋盡慢火焙乾為末

器貯之每服二錢
上酒或米飲下之
又方 治漆瘡漢椒
湯洗之即愈
援神契 椒薑禦瘟
補益聰明
衍義

曰蜀椒須微炒使汗出又須去附紅黃殼去殼之法先微炒乘熱入
竹筒中以搜春之播取紅如未盡更揀更春以盡為度凡用椒須

如此其中子謂之椒目治盜汗尤功將目微炒擣為極細末用半錢匕以生猪上脣煎湯一合調臨睡服無不效蓋椒目能行水又治水蠱



猪牙皂莢

皂莢

皂莢味辛鹹温有小毒主風痺死肌邪氣風頭淚出利九

竅殺精物療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明

目益精可為沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如猪

牙者良九月十月採莢陰乾柏實為之使惡麥門冬畏空青人參苦參陶隱居云今處處有

長尺二者良俗人見其皆有蟲孔而未嘗見蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾其蟲狀如草葉上青蟲莢微欲黑便出所以難見爾但

取青莢生者看自知之唐本注云此物有三種猪牙皂莢最下其形

曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二寸者鹿大長虛而無潤若長

六七寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好呂禹錫等謹按藥性論

云皂莢使主破堅癥腹中痛能墮胎又曰將皂莢於酒中取盡其精

於火內煎之成膏塗帛貼一切腫毒兼能止疼痛陳藏器云鬼皂莢

作浴湯去風瘡疥癬殺蟲去衣垢沐髮長頭生江南澤畔如皂莢高

一二尺同華云皂莢通關節除頭風消痰殺勞蟲圖經曰皂莢

治骨蒸開胃及中風口噤入藥去皮子以酥炙用出雍

州川谷及魯鄒縣今所在有之以懷孟州者為勝木極有高大者此

有三種本經云形如猪牙者良陶注云長尺二者良唐注云長六寸

圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好今醫家作踈風氣丸煎多用長

皂莢治齒及取積藥多用猪牙皂莢所用雖殊大抵性味不相遠九

月十月採莢陰乾用張仲景治雜病方欬逆上氣唾濁但坐不得卧

皂角丸主之皂莢拊末一物以蜜丸大如梧子以棗膏和湯服一丸日

三夜一服崔元亮海上方療腹脹滿欲瘦病者猪牙皂角相續量長

一尺微火煨去皮子搗篩蜜丸大如梧子欲服藥先喫煮羊肉兩臠

呷汁三兩口後以肉汁下藥十丸以快利為度覺得力更服以利清

水即停差後一月已來不得食肉及諸油膩又治熱勞以皂莢長一

尺續成者亦可須無孔成實者以土酥一大兩微微塗於火上緩炙

之不得令酥下待酥盡即搗篩蜜丸如梧子大每日空腹飲下十五

九漸增至二十九重者不過兩劑差其初生嫩葉芽以為蔬茹更益

人核中白肉亦入治肺藥又炮核取中黃心嚼餌之治膈痰吞酸又

米醋熬嫩刺針作濃煎以傳瘡癰有奇効

雷公云

凡使須要赤膩肥并不蚰者然用新汲水浸一宿了用銅刀削上龜

皮用酥反覆炙酥盡為度然出槌之去子擣篩皂莢一兩酥二分子收得揀取圓滿堅硬不蛀者用瓶盛下水於火畔煮待泡熟剥去硬皮一重了取向裏白嫩肉兩片去黃其黃消人腎氣將白兩片用銅刀細切於日中乾用

聖惠方

治時氣二日頭痛煩

熱用皂角燒作灰為末非時新汲水一中盞生薑汁蜜各少許和二錢服之先用暖水淋浴後服藥須臾汗出愈

外臺秘

要

治卒中風口喎以皂角五兩去皮為末以三年大醋和右嚼塗左左嚼塗右乾更傳之差

又方

齧齒方擣皂角夫皮

炙為末塗齒上吐之

又方

溺死一宿者尚活擣皂角紙裹內下部須臾出水即活

千金方

齧鼻炙皂角末如小

豆以竹管吹入鼻中

又方

鬼魔不悟皂莢末刀圭起死人

又方

難產吞皂角子二枚立差

肘後方

卒腫滿身面共用皂角剥炙令黃剉三升酒一斗漬合器煮令沸服一升日三服頻作

又方

小兒身上惡瘡先以皂角水洗

拭乾以少油麻擣爛傳焦即差

經驗方

治食氣遍身黃腫氣喘食不得心腎滿悶不蛀皂角去皮及子塗好醋炙令焦為末

一錢七巴豆七枚去油膜二件以淡醋及研好墨為丸如麻子大每服三九食後陳橘皮湯下日三服隔一日增一丸以利為度如常服

消酒

梅師方

治霍乱轉筋皂莢末吹一小豆入鼻中得嚏便差

又方

治卒外腎偏疼皂莢和皮為末水調

傳之良 **孫真人** 治咳嗽皂莢燒研碎

又方 治大小便不通開格不

三錢 **又方** 傷寒無問陰陽神驗方以皂角一挺肥者燒令赤為末以水五合和頓服陰陽傷寒以酒和服

又方

立通 治腰脚不覆地取子一千二百箇淨洗令乾少酥熬令香為末蜜丸如梧子大空心以蔗漿子酸棗子湯下三十九

又方 治

死以末 吹鼻中 **又方** 治誤食物落鼻中及入

又方 人好麗以末吹鼻中

斗門方

治卒頭痛以皂角末吹入鼻中令嚏則止

簡要濟眾

治中風口噤不開涎潮吐方用皂角一挺去皮塗猪脂炙令黃

色為末每服一錢匕非時溫酒服如氣實脉盛調二錢

博濟方 治

比如牙開不開用白梅揩齒口開即灌藥以吐出風涎差

十全方 治

英水并惡水入口內熱痛不止以皂莢子燒存性一分

沙糖半兩 先殺研皂子令細續入沙糖勻和如膏含之

疼用猪牙皂角鹽等分燒為末揩疼處良

靈苑方

治急喉閉遂巡不救方以皂莢去皮子生半兩為末每服少許以飭頭點

腫處更以醋調藥末厚傳項

孫尚藥

治卒中風昏昏若醉形體憎下須更便破少血出即愈

口角似利微有涎出斯須不治便為大病故傷人也此證風涎潮於上膈痺氣不通宜用救急稀涎散猪牙皂角四挺須是肥實不細削去黑皮晉鑿一兩光明通瑩者二味同搗羅為細末再研為散如有

患者可服半錢重者三字匕溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀