

杏苑生春

卷之八



新刻太醫院發刻醫家必究本死生春卷之八

太醫院史 紹庄 徐文元 發刻

醫正 活絡 芮 經 彙集

太醫院醫官雲林 龔廷賢 校正

秣陵後學 文麓 紀夢德 訂正

金陵書坊 蔣氏 石渠閣 梓

○疔腫

夫疔瘡者。以其瘡形如疔。蓋之狀是也。其種有麻子疔。狀如黍米稍黑。四邊微紅極痒。有石疔。皮肉相連。色如黑豇甚硬刺之。不入肉微痛。有雄疔。其狀炮頭黑靨。四畔仰炮。聚起有水。色黃大如錢孔。形高。有雌疔。其色稍黃。向裏靨。四面炮聚起。心凹色

赤形如錢孔。有火疔。其瘡頭黑。靨如湯火燒灼。四邊有煙漿。又如赤粟。有爛疔。其狀稍黑。有白痂。潰有膿水。大如匙面。有三十
六疔。其狀頭黑。浮起。形如黑荳。四邊起赤色。今日生一。明日生
二。及至十數。若滿三十六。藥所不能治。未滿其數。可治也。有蛇
眼疔。頭黑皮浮。形如小荳。狀似蛇眼。大體硬實。有鹽膚疔。大如
匙面。四邊皆赤。有黑粟粒起。有水洗疔。大如錢形。瘡頭裏黑。靨
有汁出。有刀鏹疔。其狀濶如薤葉。長一寸。左則肉黑。如燒烙。有
浮漚疔。其瘡體曲圓少許。不合長而狹。如薤菜。內黃外黑。黑處
刺之不痛。黃處刺之痛。有牛拘疔。其狀肉色頗起。指不破。然雖
有十三種名狀。皆不離於氣客經云。或食甘肥過度。不惜酒色。
邪熱蓄積而生。其初生也。頭凹腫痛。青黃赤黑。無復定色。其瘡
先痒後痛。或先寒後熱。或熱定則寒。四肢沉重。心驚眼花。或煩

躁悶亂或增寒頭痛或嘔吐心逆以鍼刺瘡不痛無血是其候
經曰膏粱之變足生大疔此之謂也如針不痛其人眼黑或見
火光者不可治也凡療之法皆刺瘡心至痛處又刺四邊十餘
下令血出去血敷藥藥力得入鍼孔中則佳若不達裏藥力不
到又有口中頰邊舌上有赤黑如珠子瘡上按之殍痛應心者
乃是秋冬寒毒久結皮膚中變作此瘡不急療之日夜根長流
入諸脉數道如箭入身顫掉不已更不慎口味房室无石湯火
麻鐵噴怒愁恨之類然不旋踵經五六日不瘥心神昏昧口乾
心煩嘔吐不定但在手足頭面胸背骨節間最急餘處稍緩治
之宜早倘遲毒氣入腹則煩悶恍惚似醉如此者三二日死矣
有發於手足生黃泡其中或紫黑色有一條如紅線直上急用
鍼於紅線止處刺出惡血後以蟾酥乳香膏瘡上貼之鍼而病

者。知痛出血爲好。否則入腹攻心。必致危困。不可治也。但秋深多有此症。治之勿緩可也。

○脉症捷言

經云。脉浮而熱。身體無熱。形之嘿嘿。胸中微燥。定發惡毒。

又云。脉微而遲。反發熱。弱而數。反振寒。當發症腫。

脉之沉實。其症發於內之外者。

脉之浮數。其症發於外之內者。

凡毒初生。便覺壯熱惡寒。拘急頭痛。精神不寧。煩燥欲飲冷者。

毒必深也。如起居平和。飲食如常者。毒必淺也。

凡惡瘡初生。如頭似粟。微有痛癢。畏觸破之。卽熨展。

凡疔瘡。用鍼刀刺破頭。用蟾酥敷之。再以藜蘆野菜莎酒。搗攪

汁飲之。醉睡覺。卽痛定熱除。不必去。疔自愈。或用紫梗菊

花連根葉搗酒攪汁飲之亦効。

山茨孤磨酒服之取微汗更妙。

凡諸毒瘡痛不可忍者宜以黃連黃芩爲君。詳上下根稍以壯經之藥爲佐。

〔病〕疔瘡初起以千金托裏散主之。方見七卷內。

〔病〕惡瘡發熱煩燥外無焮赤痛深在內乃邪氣沉於裏也故先疎通以絕其源必以黃連等之類。

〔方〕黃連湯

黃連

當歸

芍藥

木香

檳榔

黃芩

薄荷

桔梗

甘草

連翹

大黃

各等分

右咬咀水煎熟。論患之上下食之先後服之。

〔治〕一切惡疔初覺增寒疼痛以赤芍藥湯主之。方見五卷內。

病惡瘡焮腫在外邪既外顯熱則內行或汗或托裏以防入內

爲患也

方荆防敗毒散

荆芥 防風 人參 羌活 獨活 前胡

柴胡 桔梗 枳殼 茯苓 甘草 川芎

右咬咀水煎熟溫服

病若形質實脉洪滑有力疔腫焮關便閉以五和大黃湯

方五和大黃湯

大黃 升麻 黃芩 朴硝

右咬咀用水煎熟溫服

病瘡毒作渴不問腫潰但脉數發熱者宜竹葉等之類

方竹葉黃耆湯



蒼竹葉

地黃

麥門冬

黃芪

當歸

川芎

芍藥

人參

甘草

半夏

石膏

黃芩

右咬咀水煎熟不拘時服

〔治〕疔毒始發必先當頭灸之以開其戶。次詳所發分野屬何經。脈則內用所屬經藥引經以發其表。外刺所屬之經俞穴以泄其邪。

〔病〕太陽經一切諸瘡。夫瘡由濕熱而生。法當清理濕熱。為是經云。風能勝濕。寒能勝熱。故用防風。防已等。以疎濕。諸苦寒以勝熱。佐人參等。理氣理血。以瀉火也。

〔方〕黃連消毒飲

防風 二錢

羌活 一錢

防已 七分

獨活 一錢

黃芩 一錢

桔梗 七分

黃柏 一錢

連翹 一錢

知母 一錢

人參 一錢

橘紅 八分

黃芪 一錢

川歸 二錢

生地 一錢

蘇木 七分

甘草 六分

右咬咀用水二升煎一升半或用酒煎亦可。

治疔瘡始覺能令速消以黃連消毒湯主之。

方見七卷內。

治疔腫魚精瘡煩渴拘急肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂坐臥

不寧大小便閉澀以漏蘆湯治之。

方漏蘆湯

漏蘆

白欬

黃芩

麻黃

枳實

升麻

白芍藥

甘草節

朴硝

各一錢

大黃

二錢氣虛減半

右咬咀用水煎熟空心服

治疔瘡煩躁作渴以竹葉黃芪湯主之。方見本卷前。



治疔瘡毒攻心腹嘔吐惡心以護心散主之

方見七卷內

疔瘡諸癰一切無名腫毒初起增寒壯熱甚者頭痛拘急狀

似傷寒一日至四五日者二三劑以衰其毒輕者則內

消散若至六七日不消宜服真人活命飲後服托裏消毒

散調理

方連翹散毒散

柴胡

桔梗

羌活

川芎

茯苓

枳殼

前胡

獨活

連翹

金銀花

防風

荊芥

薄荷

甘草

各等分

右咬咀生薑煎瘡在上食後服在下食前如熱甚并痛甚加

黃連黃芩○如大便秘不通加大黃芒硝下之

病一切疔腫不問陰陽虛實善惡腫潰大痛或不痛然當服於



未潰之先與初潰之時如毒已大潰更不宜服初用此劑大勢已退然後隨症調治其功甚捷誠仙方也

〔方〕真人活命飲

穿山甲

三大片切碎以蛤粉炒過

天花粉

甘草節

乳香

白芷

赤芍藥

貝母

各一錢

防風七分

沒藥

當歸尾

酒洗一錢

陳皮

錢半

金銀花三錢

皂角刺

五分

右咬咀一劑用好酒一鍾半以紙密封灌口勿令泄氣煎至

一鍾隨瘡上下以分飢飽溫服能飲酒者服後再飲三五

盃忌酸薄酒鐵器服後少臥覺痛定回生神功浩大不可

億度再看症加減○在背俞倍皂角刺○在腹募倍白芷

○在胸次加瓜蒌仁二錢○在四肢倍金銀花



病

一切疔疽六七日未消者服此藥瘡未成即消已成即潰能壯氣血固脾胃使毒氣不得內攻膿毒易潰肌肉易生切勿不可早用生肌之藥恐毒氣未盡反增潰爛如有瘡口便也

方托裏消毒散

黃芪

鹽水炒

天花粉

各二錢

防風

當歸

酒洗

川芎

白芷

桔梗

炒

厚朴

薑製

穿山甲

炙

皂角刺

炒各一錢

金銀花

陳皮

各三錢

右用水酒各一鐘煎至七分在上食後在下空心二服後只

用水煎服

病

一切疔腫瘡毒才間已成未成但欲痛者以槐花酒散之



花○槐花四五兩微炒黃。乘熱入酒二鍾煎十餘沸去渣熱服。

未成者一二服即消已成者三二服即愈。

治一切疔瘡等毒及喉閉乳鵝不問已潰未潰者。

方金銀花酒

金銀花連莖葉搗爛取汁半鍾和熱酒半鍾溫服甚者不

過三五服可保無虞如秋冬無鮮者以收下乾者用水煎

熟和酒服

治疔瘡癰背癰瘰癧痔瘡。

方鐵桶膏

蕎麥稈灰淋二碗熬至一碗下

血竭

乳香

沒藥各三分

爲末入汁內再熬去半碗取下待冷入

黃丹八分

雄黃八分

硃砂

好石灰

八錢



右爲極細末。其一處放藥汁內攪勻成膏。磁器收貯。用三稜針刺破。將藥入內。直送深入到底。不三四次全愈。

○癰癧

夫癰癧皆由恚怒氣逆。憂思過甚。風熱邪氣內搏於肝。蓋怒傷肝。肝主筋。故令筋畜結而腫。其症多生於頸腋之間。結聚成核。初如荳粒。後若梅核。或在耳後。連及頤頰。至缺盆在鎖字骨陷中。皆爲癰癧。手少陽三焦經主之。或在胸及胸之側。皆爲馬刀瘡。足少陽膽經主之。二經多氣少血。癰癧者。指其累累相連。歷歷三五枚。久久不消。漸漸長大。按之則動而微痛。不增寒壯熱。惟午後微有熱。或夜間口乾。飲食少思。四肢倦怠。是以堅而不能潰。上而不能合。有風毒者得之於風。熱毒者得之於熱。氣毒者得之於氣。乃風熱邪氣蘊結乃成。皆由氣血不足。徃徃變爲

勞者經云。此不繫膏粱丹石之變。因虛勞氣鬱所致。宜補形氣。調經脉。則未成者自消。已成者自潰。若不詳經絡。血脉多少。脉症受病之異。卒用牽牛斑蝥。及流氣飲。十宣散。則血氣已損。而實虛虛之禍。如指諸掌。脉陳靡升而症缺內。

治瘰癧和血通經服之自消以玉燭散。

方玉燭散

當歸

菊葉

川芎

芒硝

熟地黃

黃芩

各一錢

甘草

五分

大黃

看人虛實加減

右以咀用生薑二片水煎熟空心溫服

方懷抱杞瘰癧流注或四肢患腫肉色不變或日晡熱或潰

而不飲以益氣養榮之劑

方益氣養榮湯

黃芪蜜炙

人參

白朮

炒各一錢五分

當歸

酒洗

川芎

白芍

酒炒

生地黃

陳皮

香附

貝母

各一錢

柴胡

地骨皮

桔梗

炒

甘草

炙各五分

右咬咀一劑水煎食遠服

如有痰加橘紅。刺痛加青皮。或木香。○午後有熱或頭

微眩加酒炒黃柏。○膿水清倍參芪當歸。○女人有鬱氣

胸膈不利倍香附貝母。○月經不調加牡丹皮當歸。

〔病〕瘰癧為七情所發以五香連翹湯主之。方見七卷內。

〔病〕有瘡結硬如石或在耳下或至缺盆中動之無根名曰馬刀

或有上或於脇下皆手足少陽經中及瘰癧在頰或至頰

車堅而不潰或足陽明經中所出或二症瘡破膿流並以

散腫潰堅湯治之



〔方〕散腫消堅湯

黃芩

酒炒一半八錢

草龍胆

酒洗炒四次

桔梗

瓜蒌根

酒洗

黃蘗

酒炒

知母

昆布

各五錢

柴胡

一錢

甘草

炙

三稜

酒洗

桔梗

連翹

各三錢

乾葛

白芍藥

當歸鬚

黃連

酒炒各二錢

海藻

炒

升麻

各五錢

右件咬咀每貼一兩煎去渣食後熱服於臥處神足在昌頭低垂每含一口作十次嚥服服畢依常安臥取藥在膈上停故也另攢半料作細末煉蜜爲丸如棗豈大每服百餘丸用此藥汁留一口送下

〔治〕癰癰宜先用益氣養榮湯數十服後服此

〔方〕內消散