

南沙席 世臣 鄭客校

脾臟方 凡十類

脾臟脈論第一論一首

論曰脾主意脾臟者意之舍意者存憶之志也為諫議大夫並四臟之所受心有所憶謂之意意之所序謂之志因志而存變謂之思因思而遠慕謂之慮因慮而處物謂之智意者脾之臟也口脣者脾之官脾氣通於口口和則能別五穀味矣故云口為戊舌脣為己循環中宮上出頤頰次候於脣下迴脾中榮華於古外主肉內主味脾重二觔三兩扁廣三寸長五寸有散膏半觔主裹血溫五臟神名俾俾主臟營一意秩祿號為意臟隨節應會故曰脾臟營營舍意在氣為噫在液為涎脾氣虛則四肢不用五臟不安實則腹脹溼洩不利脾氣虛則夢飲食不足得其時則夢築壘蓋屋脾氣盛則夢歌舞體重手足不舉厥氣客於脾則夢邱陵大澤壞屋風雨凡脾臟象土與胃合為腑其經足太陰與陽明為表裏其脈緩相於夏王於季夏脾者土也敦而福敦者厚也萬物衆色不同故名曰得福者廣也萬物懸根住莖其葉在龍蜎斐蟠動蛟蟻喘息皆蒙土恩德則為緩恩則為遲故令太陰緩而遲尺寸不同酸鹹苦辛大妙而生互行其時而以各行皆不羣行盡可常服土寒則溫土熱則涼土有一子名之曰金懷挾抱之不離其身金乃畏火恐熱來薰遂棄其母逃於水中水為金子而藏火神閉門塞戶內外不通此謂冬時土失其子其氣衰微水為洋溢浸清其地走擊皮膚面目浮腫歸於四肢愚醫見水直往下之虛脾空胃水遂居之肺為喘浮肝反畏肺故下沉沒下有荆棘恐傷其身避在一邊以為水流心衰則伏肝微則沉故令脈伏而沉上醫遠來一作占因轉孔穴利其漫便遂通水道甘液下流停其陰陽喘息則微汗出正流肝著其根心氣因起陽行四肢肺氣停喘息則安腎為安聲其味為鹹倚坐毋敗冷臭如腥土得其子卽成為山金得其母名曰邱矣四時之序逆順之變異也然脾脈獨何主脾脈者土也孤臟以灌四傍者也其善者不

可得見惡者可見惡者何如其來如水之流者此謂太過病在外如鳥之喙者此謂不及病在中太過則令人四肢沉重不舉不及則令人九竅壅塞不通名曰重強 脾脈來而和柔相離如雞蹠地曰平長夏以胃為本脾脈來實而盈數如雞舉足曰脾病脾脈來堅銳如雞之喙雞一如鳥之距如屋之漏如水之流曰脾死 真脾脉至弱而乍疎乍散^作色黃青不澤毛折乃死 長夏胃微濡弱曰平弱多胃少曰脾病但代無胃曰死濡弱有石曰冬病石甚曰令病 脾臟營營含意愁憂不解則傷意意傷則悶亂四肢不舉毛悴色夭死於春 足太陰氣絕則脈不營其口脣口脣者肌肉之本也脈弗營則肌肉濡肌肉濡則人中滿人中滿則脣反脣反者肉先死甲爲乙死木勝土也 脾死臟浮之大緩按之中如覆杯絮絮狀如搖者死六月季夏建未也坤未之間土之位脾王之時其脈大阿阿而緩曰平反得浮大而洪者是心之乘脾母之歸子為虛邪雖病易治反得微濤而短者是肺之乘脾子之乘母為實邪雖病自愈反得弦而長者是肝之乘脾木之冠土為賊邪大逆十死不治反得沉濡而滑者是腎之乘脾水之凌土為微邪雖病即瘥 右手關上陰絕者無脾脈也若少氣下利腹滿身重四肢不欲動善臥刺足太陽明治陽 右手關上陰實者脾實也若腸中伏伏如堅狀大便難刺足太陰治陰 脾脈長長而弱來疎去概一作再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡足太陰脈也 脾脈急甚為瘓瘕微急為膈中滿食飲入而還出後沃沫緩甚為瘓厥微緩為風瘓四肢不用心慧然若無疾大甚為擊仆微大為脾疝氣裏大膿血在腸胃之外小甚為寒熱微小為消輝滑甚為癩瘕微滑為蠱毒蛇腸鳴熱濤甚為腸癩微濤為內瀆多下膿血 脾脈搏堅而長其色黃病少氣其與而散色不澤者當病足骭腫若水狀黃脈之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風 扁鵲曰脾有病則色痿黃實則舌本強直虛則多僻善吞注利其實若陽氣壯則夢飲食之類 脾在聲為歌在變動為噫在志為思思傷脾精氣升於脾則飢音主長夏病變於音者取之經恐懼而不解則傷精精傷則

閉十日不已死。冬人定夏晏食病在脾日暎慧平旦甚日中持下晡靜云日中持者經也。假令脾病東行若食雉兔肉及諸木果實得之不者當以春時發得病以甲乙日也。凡脾病之狀必身重善飢足痺不收素問作善肌肉痿足不收甲行善瘞脚痛虛則腹滿腸鳴飧泄食不化取其經足太陰陽明少陰血者脾脈沉之而濡浮之而虛苦腹脹煩滿胃中有熱不嗜食食而不化大便難四肢苦瘞時不仁得之房內月使不來來而頻併脾病其色黃飲食不消腹苦脹滿體重節痛大使不利其脈微緩而長此為可治宜服平胃丸瀉脾丸茱萸丸附子湯春當刺隱白冬刺陰陵泉皆瀉之夏刺大都季夏刺公孫秋刺商邱皆補之又當灸竈門五十壯背第十一椎百壯邪在脾胃肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善飢陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛陰陽俱有餘若俱不足則有寒有熱皆調其三里有所擊仆若醉飽入房汗出當風則傷脾脾傷則中氣陰陽離別陽不從陰故以三分候死生脾中風者翕翕發熱形如醉人腹中煩重皮肉瞶瞶而短氣也脾中寒脾水者其人腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難脾脈者善噦四肢急一作實體重不能衣收一作跌陽脈浮而澀浮則胃氣強澀則小便數浮澀相搏大便則堅其脾為約脾約者其人大便堅小便利而反不渴脾氣弱病利下白腸垢大便堅不能更衣汗出不止名曰脾氣弱或五液注下青黃赤白黑寸口脈弦而滑弦則為痛滑則為實痛即為急實即為踊痛踊相搏即胸脇搶急跌陽脈浮而澀浮即胃氣微澀即脾氣衰微相搏即呼吸不得此為脾家失度寸口脈雙緊即為入其氣不出無表有裏心下痞堅跌陽脈微而澀微即無胃氣澀則傷脾寒在於膈而反下之寒積不消胃微脾傷穀氣不行食已自噫寒在胸膈上虛下實穀氣不通為閉塞之病寸口脈緩而遲緩則為陽衝氣長遲則為陰榮氣促一云不足榮衝俱和剛柔相得三焦相承其氣必強跌陽脈滑而緊滑即胃氣實緊即脾氣傷得食而不消者此脾不治也能食而腹不滿此為胃氣有餘腹滿而不能食心下如飢此為胃氣不行心氣虛也得食而滿者此為脾家不治病人鼻下平

者冒病也微赤者病發輝微黑者有熱青者有寒白者不治脣黑者胃先病微燥而渴者可治不渴者不可治臍反出者此為脾先落一云先終 凡人病脈已解而反暮微煩者人見病者差安而強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈

一云

桃李

起見於外脹滿嘔泄腸鳴四肢重足脛腫厥不能卧是王肌肉損色黃也 脾之積名曰痞氣在胃管腹大如盤久久不愈病四肢不收黃痺飲食不為肌膚以冬壬癸日得之肝病傳脾脾當傳腎腎通以

冬王王者不受邪脾復欲還肝肝不肯受因留結為積故知痞氣以冬得之 脾病其色黃體青失溲直視脣反張爪甲青飲食吐逆體重節痛四肢不舉其脈當浮大而緩令反弦急其色當黃而反青者此是木之冠土為大逆十死不治 宮音人者主脾聲也脾聲歌其音鼓其志愁其經足太陰厥逆陽明則榮衛不通陰陽翻祚陽氣內擊陰氣外傷傷則寒寒則虛虛則舉體消瘦語音沉澀如破鼓之聲舌強不轉而好咽唾口噤脣黑四肢不舉身重如山便利無度甚者不可治依源麻黃湯主之方在卷中別 又言聲憂懼

舌本卷縮此是木冠土陽擊陰陰氣伏陽氣起起則實實則執執則悶亂體重不能轉側謳聲拖聲氣深不轉而心急此為邪熱傷脾甚則不可治若脣雖萎黃語言若轉可治 脾病為瘧者令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出恒山丸主之方見別 若其人本來少於瞋怒而忽反常瞋怒無度正言而鼻笑不答於人此脾病聲之候也不盈旬月禍必至矣陰陽之疾經絡之源究尋其病取其所理然後行治萬無遺一也 黃為脾脾合肉黃如鯪腹者吉脾主口脣脣是脾餘其人土形相見於上宮黃色大頭圓面美肩背大腹好股脰小手足多肉上下相稱行安地舉足心平好利人不喜權勢喜附人耐秋冬不耐春夏春夏感而生病主足太陰敦敦然脾應月月有虧盈脾小大隨人脣大小上脣厚下脣薄無膀胱斷脣缺破此人脾不正揭聳脣者則脾高高則實實則熱熱則李脇痛滿脣垂而大不堅者則脾下下則虛虛則危危則寒寒則身重不能行步脣堅者則脾堅堅則臟安安則不病脣上下好者則脾端正端正則脾胃和

陰陽則前治陰後治陽陽則實熟陰則虛寒主外熱主內凡人死生休否則臘神而變形於外人脾前
病脣則焦枯無潤若脾前死脣則乾青白漸縮急齒噤不開若天中等分墓色應之必死不治看色厚薄
決判賒促賒則不盈四百日內促則旬朔之間脾病少愈而卒死何以知之曰青黑如拇指屬黑見顏頰
上此必卒死脾絕十二日死何以知之口冷足腫腹熱臍脹泄利不覺其出時一曰死面青目黃者五日
死病人著牀心痛氣短脾竭內傷百日復欲起傍徨因坐於地其亡倚牟能治此者可謂神良又面黃
目赤不死黃如枳實死吉凶之色在於分部霏霏而見黑黃入脣必病不出其年其穴在鼻上當兩眼是其部位也若年
上不應三年之內禍必應也季夏土脾脈色黃主足太陰脈也其脈本在中封前上四寸之中應在背
輪與舌本中封在內踝前一寸大筋裏宛宛中脈本從中封上四寸是也其脈根於隱白隱白在足大指
端內側是也其筋起於足大指之端內側上結於內踝其直者上結於膝內輔骨上循陰股結於脾聚
於陰器上腹結於臍循腹裏結於腸散於胸中其內者著於脊其脈起於足大指之端循指內側白肉
際過核骨後上內踝前廉上膕內循脛骨後交出厥陰之前上循膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈俠咽
連舌本散舌下其支者復從胃別上膈注心中合足陽明為表裏陽明之本在屬兌足趺上大指間上三
寸骨解中也同會於手太陰其足太陰之別名曰公孫去本節後一寸別走陽明其別者入絡腸胃主
脾生病實則胃熱則腹中切痛痛則陽病陽脈反大於寸口三倍病則舌強筋轉卵縮牽陰股引髀痛
腹脹身重飲食不下煩心心下急注脾脾病虛則胃寒寒則腹中鼓脹脹則陰病陰脈反小於寸口一倍
病則泄水不能卧而煩強立股膝內痛苦筋折紐之紐之者脈時緩動也發動甚者死不治四季之
月各餘十八日比為四季之餘日主脾胃黃肉隨病也一作內其源從太陰陽明相格節氣相移三焦寒
濕不調四時鬪格而起則臟腑傷疴隨時受虧陽氣外泄陰氣內伏其病相反若腑虛則陰邪所加頭重
頸直皮肉強痹若臟實則陽疫所傷蘊而結核起於喉頭之側布毒熱於皮膚分肉之中上散入髮際下

貫顧顚隱隱而熱不相斷離故曰黃肉隨病也。扁鵲曰爻肝脾二腑主治丹毒四時隨病當依源補瀉虛實之病皮肉隨熱則須鎌破薄貼方咒促治疾無逃矣。

脾虛實第二

論一首

灸法一首

方二十三首

印

脾實熱

右手關上脈陰實者足太陰經也病苦足寒脛熱腹脹滿煩擾不得卧名曰脾實熱也。

瀉熱湯

治舌本強直或夢歌樂而體重不能行方

前胡

桔梗

龍膽

細辛

芒硝

各三

杏仁

四

元參

大青

各二

苦竹葉

切一

右九味

㕮咀以水

九升

煮取

三升

分三服

食後服

行義

土為萬物之母職司敷化之功序列最卑所關最鉅五臟六腑寒熱相移而木邪乘土尤為數

見所以瀉熱湯專用大青龍膽前胡杏仁以清肝熱內動之風桔梗細辛元參苦竹以祛沃土外蒸之

濕或夢歌樂可卜胃氣之充舌強體重拘是脾家之實實熱交併得不以芒硝蕩熱存陰為務耶

射干煎方

主治同前

射干

八兩

大青

三兩

石膏

作一升

赤蜜

一升

右四味

㕮咀以水

五升

煮取

一升

分三服

五合去滓下蜜煎取二升分三服

行義

射干苦寒有毒而能解毒為喉痹咽痛專藥舌本強直亦宜用之以其能破宿血散結氣也大

青解心下熱毒瀉肝膽實火正所以祛心胃之邪熱石膏治心下逆氣舌焦不能息腹中堅痛肢體沉重

赤蜜主心腹邪氣止痛解毒且能安五臟和百藥較瀉熱湯補瀉攸分不可不辨

治脾熱面黃目赤李脣滿方

半夏

母薑

各八

枳實

梔子

桔梗

芒硝

各三

細辛

五兩

白朮

杏仁

各四

生地黃

淡竹葉

切各一升

右十一味

㕮咀以水

九升

煮取

三升

去滓下芒硝

分三服

行義

肝開竅於目目赤面黃李脣滿痛皆木邪乘土之候故以枳木苓半健脾運濕杏仁細辛下氣

泄滿淡竹梔子化熱清肝母薑從治虛陽地黃逆調血熱芒硝開闢實邪之去路也前瀉熱湯治脾

協肝威故宜祛熱瀉實此主土承木制故宜養正除邪兩不移易之定法

赤黑自退堅腫自和 赤小豆雞子清皆能散血解毒不獨治脾橫赤腫傷寒餘毒發頭亦不出此

四肢寒熱腰疼不得俛仰身黃腹滿食嘔舌根真矣第十一椎上及左右各一寸五分三處各七壯
脾胃俱實 右手關上脈陰陽俱實者足太陰與陽明經俱實也病苦脾脹腹堅檣脅下痛胃氣不轉大
便難時反泄利腹中痛上衝肺肝動五臟主喘鳴多驚身熱汗不出喉痹精少名曰脾胃俱實也

三黃瀉熱湯方

大黃 麻黃 黃芩

各四兩

杏仁 赤茯苓

甘草 橘皮

芒硝 澤瀉

各三兩

右九味

㕮咀以水九升煮取三升去滓內大黃煮兩沸去滓下芒硝分三服

衍義

大黃芒硝瀉裏熱麻黃杏仁瀉表熱黃芩甘草瀉半表半裏熱茯苓澤瀉瀉不表不裏熱使從

水道滲泄橘皮佐麻黃杏仁引領裏熱從元府開發也此方治熱從內發故可表裏兼攻非若傷寒之

邪那未傳裏不可輕用裏藥之禁

大黃瀉熱湯

治脾胃厥逆大腹中熱切

舌強腹脹身重食不下心注脾急痛方 大黃

切水一升甘

草酸

三澤瀉 茯苓

黃芩 細辛

芒硝

各二兩

橘皮一兩

右八味㕮咀以水七升煮取三升三合去

滓下大黃更煎二沸去滓下芒硝分三服

衍義

前方治脾胃俱實熱邪上逆而見喘鳴身熱汗不出等證故以麻杏開發肺氣使裏熱從表分

解此主濕熱內盛故無取於麻杏但易細辛一味開通經脈使熱悉從二陰開泄更一佐使而功用不
殊前心臟門中大黃瀉熱湯彼治心勞口舌生瘡故用施仁桂心通草石膏大棗以導上炎之火此治
脾胃厥逆故用細辛茯苓橘皮以通伏匿之熱其硝黃芩澤瀉甘草蕩滌實執之用一也

治脾熱腸痛熱滿不歇目赤不止口脣乾裂方

石膏

一斤碎

生地黃

汁赤蜜

各一升

淡竹葉

切五升

右四味先

以水一斗二升煮竹葉取七升去滓澄清下石膏煮取一升五合去滓下地黃汁煮兩沸次下蜜煎取
三升細細服之

衍義

此取竹葉石膏湯中二味俱以竹葉清心解煩石膏清胃化熱為目赤脣乾之專藥生地黃汁以和腸痛蜂蜜以滋脾熱專取赤者使從內火開泄也

治脾熱偏一邊痛胸滿脇偏脹方 茯苓 橘皮 澤瀉各一兩 芍藥 白朮各四兩 人參 桂心各一兩 石膏一兩 半夏六兩 生薑切桑根白皮各一兩 右十一味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分二服若須利下加芒硝二兩佳

衍義

胸脇為氣分脹痛為實熱而偏著一邊又非全盛可擬故以半夏薑橘滌除痰氣參苓白朮匡輔藥力殊非補虛之謂若偏著在左則有桂心芍藥可治偏著在右則有石膏桑皮可治左之右之無不宜之故無分於左右也

脾虛冷 右手關上脈陰虛者足太陰經也病若泄注腹滿氣逆霍亂嘔吐黃疸心煩不得卧腸鳴名曰脾虛冷也

治虛脹脇痛肩息有時發作悉補之方 五加根皮 丹參 橘皮各一斤 地骨皮 乾薑 白朮各八錢 地黃 芍藥 附子各五兩 猪棲根皮 二斤 桂心 桔梗各四兩 甘草三兩 大棗五十枚 右十四味㕮咀以酒四斗漬五七日服七八合加至一升日再服

衍義

脇滿脹痛喘鳴肩息實證居多此可以知為虛脹耶以脈辨之必關上虛微無力始可定以為虛設見泄注腹滿氣逆等證又為虛中挾冷之象當非實滿之比此方專主虛脹故用薑桂木附椒根加皮溫散肝脾腎三經及肺氣之脹逆自息芍藥地黃丹參地骨滋養肝脾腎三陰及心包之血脢痛自和桔梗橘皮甘草大棗疏肺氣運脾津并和逆滿之氣也

橘柳散

治脾寒飲食不消勞倦氣脹噫滿憂恚不樂方 橘柳八枚皮子並用 人參 茯苓 陳麴 蕺蘖 厚朴 白朮

吳茱萸

各二兩

右八味治下篩食後酒服二方寸七日再服一方用橘皮一兩半

溫脾丸 治久病虛羸脾氣弱食不消善噫方 黃連 大黃 茯苓

子 當歸 陳鞠 大黃 黃連 各一 右十一味為末蜜丸如梧子大每服十五丸空腹酒服日三

行義 溫脾反用三黃專為真火式微不能消磨宿食蘊積於中而熟蒸於上非用三黃之苦寒標撥

上盛則更桂薑附入胃先助上熱何能直達下焦又恐寒熱相梧更須細辛當歸調和經府血氣然後
類蘖藉辛溫之力得以消導恬不顧慮虛羸竟行辛烈峻攻者正恐病勢糾纏他時愈難攻擊也

麻豆散 主脾氣弱不下食餌此以當食方 大豆黃卷二升 大麻子二升 磬右二味治下節飲和服一

合日四五任意多少

衍義

大豆黃卷本經治濕痹筋攣膝痛取其入脾逐濕入肝祛風入腎除寒三者去而脾氣安矣麻子仁本經有補中益氣之功南陽有通調脾約之用先哲辟穀方多用之故脾氣弱不下食者以之

久服無傷中之害

脾胃俱虛 右手關上脈陰陽俱虛者足太陰與陽明經俱虛也病苦胃中如空狀少氣不足以息四逆

寒泄注不已名曰脾胃俱虛也

治腹脹善噫食則欲嘔泄澼溏下口乾四肢重好怒不欲聞人聲忘誤喉痹補之方 黃連一兩 禹餘糧

二兩 白朮

乾薑

各三

大麻子

五兩

桑白皮

八兩

大棗

二十

右七味㕮咀以水一斗二升煮取三升分

四次服

衍義

此即旋覆代赭石湯對於傷寒汗下後心下痞鞕噫氣不除用代赭之重以降逆氣旋覆薑半
以逐痰水人参甘草大棗以助胃氣行藥力此治脾虛腹脹善噫詳方下等證脾胃雖虛種種皆挾熱

象故用禹餘糧之重以鎮攝卽代赭石降逆之意黃連之苦以去熱卽半夏滌痰之意白朮之甘以健
脾卽人參助胃之意麻仁之潤以滋津卽甘草和中之意桑皮之淡以泄肺卽旋覆開結之意乾薑

之辛以配黃連卽生薑佐半夏之意太棗乃脾家專味也藥雖變易而立法未常少離南陽先師繩墨治脾胃俱虛苦飢寒痛方 人參 當歸 桂心 茯苓 桔梗 芎芢各三 厚朴 甘草 橘皮 吳茱萸各二

白术 五兩 麥蘖一升右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升分三服

行義

飢極寒痛中氣虛寒可知故用參苓术甘補氣芎歸和血萸桂溫中朴蘖橘梗以司運化之力

白术 散

治脾胃俱虛冷方 白术 厚朴 人參 吳茱萸 茯苓 麥蘖 陳鞠 芎芢各三 右八味治下節酒服方寸匕食後服日三一方加大腹橘皮

行義

此取前方七味除去歸桂甘桔橘皮易入陳鞠以助麥蘖之消運功效與前不殊

平胃丸

凡身重不得食食無味心下虛滿時時欲下喜卧者皆鍼胃脫太倉宜服建中湯及此方 否

仁

桂五十丹參三兩 苦參 元參 茅蘚各二 芎芢 桂心各一右七味為末蜜丸如梧子大酒服五丸

日三以知為度

行義

脾與胃以膜相連脾虛合用溫補反用苦寒辛胃寧不礙脾氣之益困乎祇緣中氣不能健運宿食積聚於胃而蘊熱是不得不用苦寒以散食積之火丹參苦參元參茅蘚本經皆治腹中寒熱積聚杏仁下氣開結芎歸理血中氣桂心辛溫散結以激發諸苦寒之性又須先鍼胃脫太倉然後用藥急則治標之法也若中無積聚又當用建中湯取膠餽稼穡之甘引領桂中之辛溫以補脾胃虛寒也

又方

治丈夫小兒食實不消胃氣不調或溫壯熱結大小便不利者有病冷者服露宿丸熱藥後當進

此丸調胃方

露宿丸見後十六卷 冷積熱門 大黃 二兩 小草 甘草 芎藥 芎芢 茅蘚各一 杏仁一枚 右

七味為末蜜丸如梧子飲服五丸日三一歲小兒二丸漸加之

翼方無杏仁有菖蒲當歸乾薑 茯苓麥門冬細辛為十三味

此丸調胃方

胃脣痛冷積熱門 大黃 二兩 小草 甘草 芎藥 芎芢 茅蘚各一 杏仁一枚 右

七味為末蜜丸如梧子飲服五丸日三一歲小兒二丸漸加之

翼方無杏仁有菖蒲當歸乾薑 茯苓麥門冬細辛為十三味

此丸調胃方

胃脣痛冷積熱門 大黃 二兩 小草 甘草 芎藥 芎芢 茅蘚各一 杏仁一枚 右

七味為末蜜丸如梧子飲服五丸日三一歲小兒二丸漸加之

翼方無杏仁有菖蒲當歸乾薑 茯苓麥門冬細辛為十三味

行義

脾氣不運胃氣不調當分虛實冷熱如身無壯熱大小便利者為冷積當與露宿丸烏附桂心礬石攻之或溫壯熱結大小便不利者為熱積或服露宿丸反增壯熱便閉當用大黃草蘚攻積破結

論曰凡病宿食在上脘當吐之脈數而滑者實也有宿食不消下之愈胃中有澼食冷物卽痛不能食有腹中宿食不化寸口脈緊者如轉索左右無常脾胃中有宿食不消寸口脈浮而大按之反濇尺中微而濇故知宿食

大麴蘖丸 主消穀斷下溫和又寒冷者常服不患霍亂方 大麥蘖 麴各一附子 乾薑 當歸
人參各三 赤石脂一兩 桔梗 女萎各二兩 吳茱萸 皂莢各五 蜀椒二兩 烏梅一枚 右十三味為末蜜
酢中半漬梅一宿蒸三斗米下去核搗如泥和藥蜜和搗二十杵服十九日三下其者加龍骨阿膠艾
谷三兩

大麴蘖丸用人參薑附椒萸一派辛溫佐麴蘖以溫中消導專取皂莢以通闢竅破堅積逐風
痰其性過烈且有薑附等藥助長其勢不得不以參歸桔梗女萎和之女萎專主風寒灑灑霍亂泄利
驚癲寒熱石脂烏梅收澀藥力雖猛峻十九不為過也

消食斷下丸 寒冷者常服之方 麴 大麥蘖各一 吳茱萸四兩右三味為末蜜和服十五丸如梧子
日三服

衍義 於大麴蘖丸中採取三味惟用吳茱萸之溫中以助麴蘖之消導也

乾薑散 治不能食心音眞然忘食方 乾薑 法麴 蜀椒 政 大麥蘖各一右五味合治下薛食
後服三方寸七日三以能食為度

衍義 於消食斷下丸中加乾薑以助蜀椒乾政以解胸中毒熱惡氣胃氣清則心氣安矣

消食丸 治數年不能食方 小麥蘖 麴各一 乾薑 烏梅一枚 右四味為末蜜和服十五丸日再
加至四十九寒在胸中及反胃翻心者皆瘥

衍義

於乾薑散中除去椒豉加烏梅以收斂津氣

鞠摩丸

主消穀能食除腸中水氣臚脹方 法翹 麥蘖 杏仁 酒五右三味治下節食後酒服一合

日三

衍義

氣下則水散杏仁下氣鞠摩消穀腸胃清肅而臚脹除矣

脾勞

第三論 一首 方二首

論曰凡脾勞病者補肺氣以益之肺旺則感於脾是以聖人春夏養陽氣秋冬養陰氣以順其根本矣肝心為陽肺腎為陰逆其根則伐其本陰陽四時者萬物之終始也

半夏湯

治脾勞實四肢不用五臟乖反腹滿肩息氣急不安承氣泄實熱方 半夏宿薑

各八錢
白木

杏仁各三兩 橘皮 芍藥各四兩 竹葉升一大棗枝二十右九味㕮咀以水一升煮取三升分四服

衍義

脾勞津耗則濁氣逆滿不安故以橘半苓木滌痰宿薑大棗安半杏仁竹葉泄熱芍藥收斂

陰氣與前消食丸中烏梅酸收同意

消食膏酒

治脾虛寒勞損氣脹噫滿食不下通噫方 豬膏三升宿薑升五吳茱萸一升白朮一斤右

四味搗茱萸白朮等二味細細下篩為散內膏汁中煎取六升溫清酒一升進方十七日再

衍義

白朮益脾茱萸溫中宿薑通神明止噫氣豬膏以滋虛勞津血清酒以行萸朮性味也

肉極

第四論 一首 方六首

論曰凡肉極者主脾也脾應肉肉與脾合若脾病則肉變色又曰至陰遇病為肌痹肌痹不已復感於邪內舍於脾體廢淫淫如蟲走其人身上津液脫腠理開汗大泄鼻端色黃是其相也
凡風氣藏於皮膚肉色則敗以季夏戊己日傷於風為脾風脾風之狀多汙陰動傷寒寒則虛虛則體重怠惰四肢不欲舉不嗜飲食食則咳嗽則右脇下痛隱隱引肩背不可以動轉名曰厲風裏虛外實若陽

須決之若入六腑五臟則半死矣。扁鵲曰肉絕不治五日死何以知之皮膚不通外不得泄凡肉應足太陰太陰氣絕則脈不營其肌肉口脣者肌肉之本也脈不營則肌肉濡肌肉濡則人中滿人中滿則脣反脣反氣盡則肉先死甲爲乙死木勝土使良醫妙藥終不治也。

解風辨湯 治肉熱極肌辨淫淫如鼠走身上津液脫腠理開汗大泄爲脾風風氣藏於皮膚肉色敗鼻見黃色麻黃止汗通肉方 麻黃 防已防風一作 枳實 細辛 白朮各三兩 生薑 附子各四兩 甘草 桂心

石膏八兩各二兩

右十味㕮咀以水九升煮麻黃去沫下諸藥煎取三升分三服

衍義 以肉極熱而內火招風腠理不固故用麻黃石膏發越脾氣附子細辛搜逐陰邪枳實防已滌痰祛濕甘草白朮通攝津液桂心生薑開通經絡以于風辨之出路而汗自止矣

西州續命湯 治肉極虛熱肌辨淫淫如鼠走身上津液開泄或辨不仁四肢急痛方 麻黃 生薑各三兩 當歸 石膏各二兩 芎菊 桂心 甘草 黃芩 防風 芪藥各一兩 杏仁四枚 右十味㕮咀以水九升先煮麻黃去沫下諸藥煮取三升去滓分四服日再

衍義 繢命爲風辨身體不能自收正虛風中之首藥乃古今錄驗方中除去人參加入黃芩謂之西州續命更參小續命中芍藥防風二味并以生薑易乾薑卽小續命中除去附子防已專力開發風辨以無脾虛喘乏故無取於人參以無腎虛逆冷故無取於附子以無下體疼重故無取於防已也

越脾湯

治肉極熱則身體津液脫腠理開汗大泄厲風氣下焦脚弱方見七卷風毒脚氣門

衍義

發越脾氣以泄其熱則身體自安腠理自和津液自斂烏有汙泄之患乎卽有厲風腳弱得麻

黃之開發石膏之化導甘草之平調烏有營衛不和之患乎脚氣本門未嘗不藉此分解風毒也

石南散 治肉極熱則體上如鼠走或如風辨脣口壞皮膚色變主諸風大病方 石南三十克 薯蕷

芍

藥甘草一作

天雄 桃花一作桃仁

甘菊花各一兩

黃芪 真珠各十克

山茱萸一兩

石膏二兩

升麻各十克

萎蕤各一兩

右十二味治下篩酒下方寸匕日再食後服

衍義

方中石南山茱萸祛風逐濕為開痹之專藥天雄石膏宣通寒熱升麻黃芪職司開合真珠菊

花清理虛陽薯蕷姜炭解散風熱芍藥桃仁調和營血所謂血行風自滅也

大黃芪酒 治肉極虛寒為痹風陰動傷寒體重怠惰四肢不舉關節疼痛不嗜飲食虛極所致方 黃

芪 桂心

巴戟天

石斛

柏子仁

澤鴻

茯苓

乾薑

蜀椒

各三兩

防風

獨活

人參

各二兩

天雄

芍藥 附子

烏頭

茵芋

半夏

細辛

桔梗根

白朮

黃芩

山茱萸

各一兩

右二十

三味咬咀絹袋貯以清酒三斗漬之秋冬七日春夏三日初服三合漸漸加微醉為度日再

衍義

烏附天雄薑桂椒辛力開寒痹茵芋防獨井祛風毒參苓芪木振發元神餘皆滋培津液化導

風熱之佐使耳

治肉極虛寒卒中風口噤不能言四肢緩縱偏攣急痛注五臟恍惚喜怒無常手腳不隨方 獨活 茵

芋 黃芩

各三兩

甘草

防風

芍藥

苦窮

麻黃

葛根

各二兩

人參一兩

烏頭

三枝 右十一味咬咀以水一斗竹瀝四升合煎取四升分四服日三夜一

衍義

茵芋專攻毒風然須麻葛防獨為前導烏頭力開寒痹獨賴芍藥參甘以助長蓄芩竹瀝疏

通經絡卽風痱緩縱亦必以行經滌痰為務也

肉虛實第五論一首 方二首

論曰夫肉虛者坐不安席身危變動肉實者坐安不動喘氣肉虛實之應主於脾若其臟腑有病從肉生熱則應臟寒則應腑

五加酒 治肉虛坐不安席好動主脾病寒氣所傷方

五加皮

枸杞皮

各二兩

乾地黃

丹參

各八石

膏

石斛

杜仲

洛一乾薑

四兩

附子

二兩

右八味咬咀以清酒三斗漬三宿一服七合日再

脇痛肩息有時發動方大同小異有時發動亦火性不常之候也

牛夏湯 治肉實坐不安席不能動作喘氣主脾病熱氣所加關格除喘方 半夏宿薑各八杏仁兩
細辛 橘皮各四 麻黃一兩 石膏七兩 射干二兩 右八味㕮咀以水九升煮取三升分三服須利下加

芒硝三兩

行義 肉虛則宜溫養肉實則宜溫散實乃肌表之盛故借越婢青龍射干麻黃等法以麻杏細辛開泄肺氣蓋半橘皮滌除胃濕射干解散內結石膏化導標熱裏氣通而表氣鬆實從外解之法也

秘澀第六

論一首 方四十四首
十六法十五首

論曰有人因時瘥後得閉澀不通遂致天命大不可輕之所以備述雖非死病凡人不明藥餌者枳手待覽深可痛哉單複諸方以虞倉卒耳凡大便不通皆用滑膩之物以通之也凡候面黃者卽知大便

難

麻子仁丸 跌陽脈浮而澀浮則胃氣強澀則小便數浮澀相搏大便則堅其脾為約脾約者其人大便堅小便利而不渴也 麻子仁二升 松實 呎藥各八杏仁三升 大黃 厚朴各一右六味為末蜜丸如梧子大飲服五丸日三漸加至十九丸

無杏仁
附外臺

衍義

此卽陽明例中跌陽脈浮而澀浮則胃氣強澀則小便數浮澀相搏大便則難其脾為約麻仁

丸主之喻嘉言曰成注謂胃強脾弱脾不為胃行其津液大謬若果脾弱則當補矣何謂麻仁丸中反

用大黃厚朴枳實乎仲景言胃強原未言脾弱况其所謂胃強正是因脾之強而益強約者省約也脾氣過強將三五日胃中所受之穀省約為一二彈丸而出全是脾土過燥至令胃中之津液日漸乾枯所以大便為難設脾氣弱則當泄矣豈有反難之理相傳謂脾約者不能約束胃中之水何以反能約束胃中之穀歟在陽明例中凡宜攻者惟恐邪未入胃大便勿鞭又恐初鞭後溏不可妄攻若欲攻之

先與小承氣湯試其轉失氣者方可攻皆是驗其脾氣之弱故爾躊躇若夫脾約一證在太陽已當矣更何待之陽明耶此尚論篇中已得其髓無庸復贅

治關格大便不通方

芒硝

烏梅

桑白皮各五

芍藥

杏仁

麻仁三兩

大黃八兩

右七味㕮咀

以水七升煮取三升分三服

一本無烏梅加枳實乾地黃各二兩

行義

關格危證不為急通命懸呼吸故於麻仁丸中削去枳實厚朴之繹緩易入芒硝以峻攻又恐

津隨藥脫卽以烏梅斂之用桑根皮者通泄肺氣於下取其有利水之功也讀古人方須要識當時立

方緩急之用方不失先哲垂誨後世之心印此方端為實熱暴關涓滴不通者設設久病陰虛肝腎不能司開合之權而漸致閉拒有時滴澀者亟為峻補真陰通調氣化尚恐難為既稿之榮況可硝黃漫

施乎嘗觀成無己註傷寒吳鶴臯攻醫方不過閉戶造車若夫折衝妙用梓匠未之聞也惟許宏釋內

臺趙以德衍金匱深得先聖之奧善開學人心眼近世喻嘉言稍知追宗二君之谿徑耳

治大便閉澀不通神方

猪羊膾

不拘以筒灌

三合許令深入卽出矣不盡須臾更灌

一方加冬葵子

汁和之亦妙○又方

椒豉湯

五升加猪膏三合

灌之佳臨時不下卽用之○又方

白蜜煎成如人

指大深內穀道佳或加鹽三錢七無灰濃酒半盞練如上法

猪膽導法廣之以羊膽總取寒滑以泄燥熱可無分於彼此更加葵子汁以助滑澤之義 椒取竈達

效能逐穢然非猪膏不能助潤下之力

蜜煎導法潤而不寒無傷津液加以鹽酒兼能潤下和

血

三黃湯

治下焦熱結不得大便方

大黃

黃芩二兩

甘草一兩

梔子一枚

右四味㕮咀以水五升煮

取一升八合分三服若大朗加芒硝二兩

行義

此於伊尹三黃湯中以梔子甘草之輕劑易去黃連之苦寒使速分利陰陽不致重味傷犯中