

宏濟堂醫書叢刊



宏濟堂醫書叢刊卷之六

備用各方小引

前卷諸方林立更編此集者何也補遺也病勢初中未三傳互異用藥正復不同有一方可兼治數病者有一病須兼用數方者方畧務期大備採輯本不嫌多也茲將各症應用主方先後次序一併揭出內服外敷交相濟輕重緩急可類推耳此蓋不憚加詳使醫人得之爲標準卽病人檢書披閱臨時自有把握免爲庸醫所悞此書出版瘡瘍其有瘳矣

錄者謹識

陳少江校定



摘選華佗中藏經

葶藶散

治白疔憎寒喘急昏冒

葶藶

大黃各一兩

桑白

茯苓各二兩

檳榔七粒

郁李仁

漢防己各三錢

共爲末每服二錢

蜜水調下以疎下惡物爲度

鉛霜散

取白疔

鉛霜一分

膽礬

粉霜各一錢

蜈蚣一條

共爲細末先刺令出血入

藥米心大以醋麪餅封口可愈

二黃散

治赤疔

黃連

大黃各一兩

爲末生蜜丸如梧子大每服卅丸溫水送以利爲度

杏仁貼

取赤疔

杏仁七个

生用嚼爛漱之令津滿口吐出綿濾取汁入

輕粉少許



調勻鴿翎或鷄翎掃

巴豆丸 治黃疔

巴豆 七个去心膜 青州棗 七个

去核以巴豆內之麪裏煨通赤研末以礪砂

醋作麪糊爲丸如綠豆大每服五丸重者十丸米飲下以利爲度

黃蘗散 取黃疔

黃蘗 一兩 鬱金 半兩 爲末鷄子清調鷄翎掃上

兔絲散 治黑疔

兔絲子 菖蒲 等分爲末酒浸取汁掃疔上

神效乳香膏 治一切瘡腫生肌止痛

芝麻油 四兩 黃丹 兩半 乳香 二分 羊同骨髓 四兩 麝香 少許另研候膏將冷方入攪勻

右藥入磁器內文火熬成膏用棉濾過加黃蠟半兩入丹收膏磁罐



貯藏

車螯散

治惡瘡發背

車螯燒

蘆壳

黃柏

甘草

等分爲末先用

青鹽

薄荷

園茶

樓葱合煮漿水洗瘡後以唾調藥塗女用男睡男用女睡以赤水出爲度

白散子

治背瘡取下毒氣次用清涼膏貼

白附子

大香附子

各五錢

薑製夏

一錢

黑牽牛

二兩

半生半炒

大甘遂

一分

全

大麥慢火炒候赤黃色去麥

右藥共爲末每服二錢以蜜酒調下

續飲溫酒一二杯候患處痛刺微下三五次瀉下惡物卽瘥

甘遂一分疑是錢字

清涼膏

治發背先服白散次貼此膏

川當歸二兩

白芷

木別子肉

白芨

芍藥

黃柏

白斂

各一兩

乳香

別研

膩粉

各少許

白膠香

少許

黃丹

五兩

用淨麻油

十兩

煎上七味



候枯去渣入槐柳枝各七寸再煎少頃去枝油老入丹方加乳膠粉攪勻收貯

車螯丸

治發背癰疽金石藥毒

紫背車螯大者鹽泥因濟火煨通紅放冷處俟火氣退取出研爲極細末置地上一宿消去火毒以甘草膏子丸如梧子大每服三五十九甘草湯日進三服第三日當下惡物方用膏藥貼

白膏藥

貼背瘡

寒水石火煨通紅入磁器中封密沈井中一宿取出研極細以蠟月猪脂和膏稀稠得所自瘡赤盡處塗闊一指許再以薄紙作花留孔貼瘡頂漸次赤退卽敷近裏圓至愈而止

更甦膏

治一切惡瘡

南星一个

巴豆五个去壳

麝香五分

半夏七个

爲細末取蠟月猪脂

成膏如不痛瘡先以針刺破候忍痛處以乳汁同調貼之

定命丸

治遠近一切惡候漏瘡

雄黃

乳香各一分

巴豆廿一枚去皮

右研如粉入麪粉三錢水和丸如小

麥內入瘡中上用乳香膏貼

忍冬酒

解諸癰毒

忍冬藤鮮者四五兩乾者只用兩許搗大生甘草節一兩二味入砂鍋內

以水二鐘煎至一鐘再入無灰酒一鐘煎數沸去渣分三服重者晝

夜兩劑至大小便通利爲度

銀花酒

治一切癰疽發背疔瘡喉痺等症

銀花藤葉搗爛取汁半鐘和熱酒半鐘溫服

槐花酒

治癰疽熱毒最妙

槐花

四五兩

炒微黃乘熱入酒二鐘煎十餘沸去渣熱服未成癰者

服可化已成者亦可服槐花治濕熱功效頗大惟胃寒者不宜

蒲公英酒

治乳癰乳吹不問已成未成

公英一握搗爛入酒半鐘取酒溫服渣貼患處

遠志酒

能托散諸毒治女人乳癰尤效

遠志不拘多少米泔浸洗搥去心每服三錢用好酒一鐘調少頃澄清飲

渣敷患處

牛膝酒

治楊梅風毒腰痛

牛膝

川芎

羌活

五加皮

杜仲

甘草

地骨

薏仁各一兩

生地黃

十兩

海桐皮

二兩

右藥作粗末帛裹入無灰酒浸二七日夏



月三五日每服一杯日三五次

桑枝煎 大治口渴

嫩桑枝細切一升炒以水三升煎一升日服一兩劑抱朴子云療風痺乾
燥臂痛四肢拘攣



南京中医药大学图书馆版权所有

諸瘡備用門

透骨搜風散

治楊梅瘡

透骨草

白花陰乾

生脂麻

羌活

獨活

小黑豆

紫葡萄

槐子

白糖

六安茶

核桃肉

各錢半

生薑

三片

棗

三枚

水煎露一宿空心

服蓋被取汗避風半日

楊梅一劑散

按此方分兩太重疑係古人分兩每兩合近秤只二錢半用者酌之

蜜麻黃

一兩

威靈仙

八錢

大黃

七錢

羌活

白芷

皂刺

穿山甲

炙研

銀花

蟬退

各五錢

防風

三錢

山羊肉

一斤

河水煮熟

取清湯二碗同酒一碗將藥合入煎至碗令患者空心將羊肉淡食令飽隨後服藥服畢蓋被出汗避風

芎歸飲

治廣瘡結毒

川芎 當歸 金銀花 天花粉 防風 薑製夏 貝母 海蛸去皮水飛

白芷各兩 南星薑汁製兩半 右藥爲末用土茯苓一觔米泔浸竹刀去皮

杵爛不犯鐵器放砂鍋內入水四碗用竹箸量定淺深再加水四碗煎去半餘水四碗將各藥末投入再加水四碗煎至水四碗止濾去渣一日服盡忌鹽及一切毒物粥飯只宜淡食輕者一料重者兩料可愈 一方每日調入八寶丹分二

八寶丹方

眞犀黃 梅片各一錢 血珀 珍珠 辰砂各二錢 飛滑石四錢

飛麪八錢 滴乳五錢 爲細末

杏霜散 治結毒

杏仁霜甘粒去皮尖 輕粉二錢 番木鱉煨存性 兒茶煨各三錢 膽礬三分

梅片一分 共研極末用鵝膽或豬膽調敷

楓蘆膏 治結毒膿水淋漓

楓子肉四兩

萆麻仁二兩

杭粉二兩

花椒五錢

甘石二錢

輕粉一錢

共爲細末加麻油搗成膏用油紙攤貼先用花椒甘草湯煎

洗貼藥三日一換五六次愈

珠螺散 治魚口下疳

珍珠

梅片

製乳香

象牙末

兒茶各三分

宮粉

牆上白螺螄壳

各一兩

全入銀罐內煨紅研

右藥共研細末磁瓶收貯上

藥時先用米泔水煎開入雄黃末三錢淋洗患處拭乾糝藥

水螺散

治下疳

土墻上白螺壳煨灰一錢

梅片

牛黃各五厘

五倍子灰二分

燈草灰

甘草灰 黃柏灰 兒茶各五分 輕粉四分

右藥共末極細上藥時先

以皮硝湯洗再用土茯苓湯洗拭搽藥

紅衣散 治下疳

大紅絨一錢

鳳退衣燬五分

血竭一錢

鐵繡一分

梅片三分

右藥共爲

極細末敷

艾靈丸 治頭面結毒

蘄艾一兩

川椒八錢

麻黃三錢去節

川芎二錢

茯苓二兩白

豬頭骨天靈蓋五錢火煨存性

右研極細末蒸餅爲丸如綠豆大飯後白湯

下三錢三四日瘡口乾躁不臭爲驗服至瘡平方止

皂黃湯 治楊梅結毒

豬牙皂三錢

皂角子七个研碎

僵蠶

蟬退各三个

生大黃錢半

土茯苓

生甘草 各三錢

煨山甲 三片

右藥用河水二碗酒一碗煎至

一碗不拘時服二服三服以瀉爲度瀉時勿聞臭氣忌口

搜風解毒湯

治楊梅結毒

土茯苓

一兩

白蘚皮

銀花

苡仁

木瓜

小木通

各五分

皂角子

四分

煎服

氣虛加人參

血虛加當歸

忌口戒房事

化毒散

治楊梅結毒

生大黃 二兩

灸山甲

歸尾 各五錢

僵蠶 炒三錢

蜈蚣 一條炙黃

爲末

每服二錢溫酒調下日二服

結毒紫金丹

龜板

放炭火上炙用白酒漿塗再炙以焦爲度研末淨二兩

硃砂

石決明

各六錢

石決大者煨紅童便淬一次爲末和勻爛米飯爲丸如麻子

大每服一錢 土茯苓湯送

升麻解毒散 治全

升麻 皂角各四錢 土茯苓一斤 水八碗煎四碗分四次一日服盡每次

炖熱加香油三茶匙和勻量病上下飯前後服瘡生頂上加白芷咽

內加桔梗胸腹加白芍肩背加羌活下部加牛膝

歸靈內托散 治同

人參 木瓜 白朮土炒 金銀花 防己 花粉 白鮮皮

薏仁各一錢 當歸 熟地 酒芍 川芎各一錢 土茯苓二兩 威靈仙六分

甘草五分 煎服下部加牛膝元氣虛者倍參歸毒氣盛者倍銀花加公

英外以 麥冬去心五錢 薏仁五錢 土茯苓二兩 煎湯代茶

金蟬脫壳酒 治同



醋酒 五斤

大蝦蟆 一个

土茯苓 五兩

浸酒內瓶口封嚴重湯煮二炷

香取出待次日飲以醉爲度無論冬夏蓋煖取汗爲效飲酒次日隨量飲之酒盡瘡愈又治結毒筋疼痛諸藥不效者更妙服酒後禁風及房事五辛毒物油膩魚腥一切勿食

翠雲散

治全

輕粉

石膏

煨各一兩

膽礬

銅綠

各五錢

共研極細末濕瘡乾糝乾瘡

公猪膽調濃點每日三次斑痕自退

鵝黃散

治全

輕粉

石膏

煨

黃柏

炒

等分

右藥三味共爲細末乾糝患處卽可

生疔

五寶丹

治九種楊梅結毒

琥珀

透明血色者用甘草水煮過三分半

珍珠

用豆腐包蒸三分半

硃砂

透明者三分半

鍾乳石

用木香甘草各一錢同煮乾三分半

飛羅麴

炒過三分半

冰片

半分

臨時加右藥俱爲細末磁罐收貯聽用

服法每日用土茯苓成塊者一斤洗淨用石敲碎入水二升煮汁四碗收磁器內將渣入水四五碗煮汁二碗并前汁爲一日之用病在上加水香二錢在下加牛膝一兩與土苓同煎病人不得另飲茶湯但將茯苓時時飲之飲湯半鐘加五寶丹二厘飲一鐘加四厘體壯者可加五六厘一日內服盡在上飽服在下飢服忌茶酒并一切發風動氣諸物外貼清涼膏若舊有輕粉等毒藥後便發出輕者六七服重者十服可愈

銀鉛散

治梅瘡癰漏年深者並效

土茯苓

五兩

銀花

一兩

皂刺

花椒

牛蒡

鬱金

當歸

各五分