

戊

證
治
理
會

趙
伯
寅
藏

從治理會卷之五

女科用藥法

月經常度論

經水

經行不止

經閉不通

崩漏

帶下

血分水分

求嗣

產前

惡阻

胎動

胎漏

胎痛

子腫

子氣

子煩

子懸

子癰

子淋

小便不通

附結胞

大小便不通

尿血

不語

臟燥怨傷

欲墮

附逐月保胎

小產

難產

交骨不開

胞衣不下

盤腸產

產門不閉

子宮不收

死胎方論

證治理會卷五

十二經氣血

多血多氣經須記

大腸手經足經胃

少血多氣有六經

三焦胆腎心脾肺

多血少氣心包絡

膀胱小腸肝所異

女科用藥法

加減四物湯 本方

川芎

黃歸

白芍

熟地

血崩有血加生地

蒲黃炭各一加阿膠艾各一

崩中玄血過多血臍虛冷加膠艾

芥穗止血妙

血崩淋漓不斷加炮附子赤石脂



赤白帶下加桑附肉桂

一加藁本丹皮續斷
一加桑附白芷

便血及帶下加荆芥地榆

大便秘加桃仁大黃

血痢加阿膠黃連

一加膠艾厚朴

口乾煩渴加麥冬乾葛天花粉烏梅

大渴煩躁加人參知母實玄人參加石膏

目暴赤作翳痛加防己防風羌活胆州

血氣痛五心紅加肉桂烏梅

冷氣痛四肢厥加良薑乾姜之胡索

腹中氣塊痛加木香

腹中血塊痛加蓬稜肉桂

乾漆炒

血虛腹痛微汗惡風加黃桂倍白芍

臍中虛冷腹痛腰脊間痛加川棟延胡黃桂

筋骨肢節痛及頭痛按之加防薤黃芩細辛

背脊勞堅加知母地骨皮柴胡黃芩或詔銀柴胡

血風勞加荆芥柴胡

虛煩不得眠加人參竹葉冬仁麥冬

心氣不足恍惚加遠志酸棗仁辰砂麥冬

氣虛無力加白朮陳皮黃芪人參

血氣不調加吳茱萸甘桂補下之加乾薑甘桂

虛寒脈微目汗短氣加乾薑附子

虛寒狀如傷寒加人參甘州柴胡防風

虛汗不止加牡蠣麻黃根蜜炙黃芪

發熱心煩不得卧加黃連梔子連仁伏神黃冬

潮熱加前胡乾薑人參黃芪

發寒熱加乾姜丹皮芍藥柴胡

身壯脈躁於昏煩加柴胡黃芩

因虛生風倍川芎加柴胡防風風虛眩暈加秦元羌活

血虛心腹痞痛不可忍去玄地黃加乾姜

以有敗血歸用上帝或作下帝芍藥用赤地黃用生一

云加蓬朮桂枝漆或漆枳仁紅花

加減八物湯按八物能即八珍乃四物湯

經事欲行脛腹絞痛去血滿也四物湯加延胡苦

棟炒黑枳柳桃仁木瓜紅辰肉桂

傷寒汗下後飲食減少氣血俱虛四物湯加炙

芪白朮茯苓甘草

欲保胎氣令人有子四物加砂仁四炙子加半名

八珍湯君臣佐使四物占參苓飲相合名補心湯參

參飲乃附後

參苓飲附

人參 紫參 前胡 半夏 桔梗

葛根

枳壳

茯苓

陳皮

甘草

四肢腫痛不能舉動四物養本名半湯主之

諸痛有濕共四物与白朮相半加茯苓川山甲天麻

各流濕潤燥四物理中湯名半

治痿結四物与調胃承氣湯各半名玉獨散

加味道遙散

本方附

黃歸

芍药

白朮

茯苓

甘草

柴胡

厚荷

煨姜

加丹桅

名加味道遙散

散

蒼朮盛加地骨皮知母

咳嗽加五味子紫苑

吐痰加貝母半夏瓜蒌渴加麦冬天麻粉

久瀉加炒黑乾姜身痛加羌活防風川芎

吐血加阿膠生地丹皮自汗加炙芪桑仁

左脇腹血塊加三稜莪朮桃仁紅花

右腹氣塊加木香枳櫟

經閉不通加桃仁紅花蘇木

小腹痛加延胡索吳附胸中結加炙連山梔

飲食不消加山楂神曲心驚悸加酸棗遠志

手顫掉加防風荆芥薄荷

氣脹胸膈痞悶加枳實青皮吳附

怒氣傷肝眼目昏花加胆州黃連白蘞薤仁槐子
治婦人骨蒸方以天冬十兩麦冬八兩並玄心為
末以生地三斤取汁熬膏為丸如梧子大每服
五十丸以逍遙散玄甘州煎湯送下

接道遠散治關血之標準也柴胡切勞傷往來寒熱
酒肝胆之火壯臟調經內公主血挫各經清氣白
木理脾行脇脘間血治脾氣虛熱往來黃歸治血
虛勞日晡潮熱以甘州能退火熱為有熟用酒脾
經之火並伐肝木生用酒血中有餘之血應荷清
陽玄經中血並茯苓澤利治痰嗽玄胞中之火

調經加減四物湯

經水過多加芍朮

經水暴下加芩芍

或五心煩或日晡潮熱加胡荽連翹地黃用生

經水淋瀝不斷加乾蓮房炒

經水臨行時小腹連腰作痛或先期或後期有瘀血加

香附莪朮延胡枳仁紅花木香

經水行後作痛氣血虛也加四君子扶元加乾姜

經已過三五日腹中綿綿走痛或此血行而滯氣

未盡行也加木香枳榔

經水不及期而行或血虛或用生地加芩芍連翹附

經水過期而行者瘦人多是血少倍當歸熟地加
黃芪甘州少佐桃仁以為生血之引肥人多是氣
虛挾痰阻滯升降也玄地黃加人參黃芪二陳同附
經水過期而紫黑成塊血虛有血也多作腹痛用
生薑加參附苓連延胡靈脂乳香後乳藥
有氣血俱虛者宜涼氣血加柴胡黃芩生地黃附
經水常過期而血色淡者痰多血少也用生地加
二陳

經水下乃黑豈汁加苓連

經水瀟少加葵夜紅夜血是熱難少而面色和只

倍加散歸地

經水微少漸不通手足酸疼肌膚潮熱脈微數

玄地黃川芎加澤蘭三倍甘州半

經水不通加桃仁紅花此證須細審有餘不足用

与桃仁紅花何干惟其

有積血不行方可用也經水不通陰虛血少小使滿而身伴痛加白朮牛

膝丹艾桃仁各附

經水適來適斷往來寒熱如瘧者加小柴胡湯或

先用小柴胡湯後以四物和之

經水行而身重脈數形暈加柴胡黃芩

胎前傷寒加減四物湯

傷寒表虛自汗而盜者加桂枝骨皮

傷寒表實無汗身重者加麻黃細辛

傷寒脇痛發熱加柴胡黃芩

傷寒發紅斑加升麻連翹

傷寒秘結氣逆加大黃枳實

傷寒汗後嗽痰不止加人參五味子

傷寒後汗虛痞加厚朴枳實

傷寒汗下後不得眠加枳實芍藥散

傷寒小便利加茯苓澤瀉木通

傷寒小使為血加炭存琥珀

傷寒汗下後血漏不止加阿膠艾葉生地

胎前加減四物湯

妊娠心腹痛加竹茹一丸 妊娠中濕加防風秦朮

胎動不安下血加艾葉炒阿膠炙

胎死腹中加黃桂白芷射干

產後加減四物湯

產後虛憊血氣煩悶加生地 氣逆而心澀加炭

產後志

產後惡露腹痛不止加桃仁紅花蘇木牛膝

產後寒熱往來加柴胡麥冬
產後傷風頭痛加

石膏甘草

產後血痢腹痛加槐花黃連
產後腹脹加枳壳

肉桂

產後諸證各隨以經以四物與仲景藥各半服之

神効

月經常變論

女子之經一月一行其常也或先或後或遲或塞其
病也復有變常不可不知有當行期只吐血衄血或
眼耳出血者是謂逆行有三月一行者是謂居經伏
名按季有一年一行者是謂避年有一生不行而受
胎者是謂暗經有受胎之後月一經行而產子女是
謂感胎伏名垢腹有受胎數月血忽大下而胎不墮
去謂之漏胎此雖似氣血有餘不足言而每異於常
矣又有經行一次即受胎生子後絕不來下次經行
復即有厚此亦謂之暗經