

補脾腎方保萬全嗚呼醫之關係皆是類也因錄此按用告
將來以見腫瘍潰瘍凡虛證未見而但無實熱壅滯可據者
便宜托補如此則其受益于不識不知有非可以言詒形容
者新按

腫瘍不足 二十六

汪太夫人年逾八十腦疽已潰發背繼生頭如粟米脉大無力
此膀胱經濕熱所致然脉大無力乃血氣衰也遂以托裏消
毒散數服稍可更加參芪之劑雖瘡起而作渴此氣血虛甚
以人參黃芪各一兩當歸熟地各伍錢麥冬五味各一錢數

服渴止而愈此不有臟腑能言氣血能告豈能省悟病者至死者歸於命深可哀也○又有患者氣虛素實或有痰不服補劑然不知膿血內潰氣血並虛豈不宜補余常治瘡陰用參芪大補之劑陽書敗毒之名與服之俱不中滿瘡亦隨效虛甚者尙加薑桂甚至附子未嘗有不效也

薛按

潰瘍二十七

立齋曰膿熟不潰者陽氣虛也宜補之○瘡肉不腐者宜大補陽氣更以桑木灸之○膿清或不斂者氣血俱虛宜大補○膿後食少無睡或發熱者虛也宜補之○倦怠懶言食少不

睡者虛也宜補之○寒氣襲於瘡口不能收斂或陷下不斂者溫補之○脉大無力或微瀦者氣血俱虛也峻補之○出血或膿多煩躁不眠者乃亡陽也急補之○凡膿潰而清或瘡口不合或聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者皆氣血俱虛也非補不可○凡膿血去多瘡口雖合尤當補益務使氣血平復否則更患他證必難治療也○又曰大抵膿血大泄當大補血氣爲先雖有他證以未治之凡癰疽大潰發熱惡寒皆屬氣血虛甚若左手脉不足者補血藥當多於補氣藥右手脉不足者補氣藥當多於補血藥切不可發表○大凡癰

疽全藉血氣爲王若患而不起或潰而不腐或不收斂及膿
少或清皆血氣之虛也俱宜大補之最忌攻伐之劑亦有膿
反多者乃氣血虛而不能禁止也常見氣血克實之人患瘡
者必腫高色赤易腐潰而膿且稠又易於收斂怯弱之人多
不起發不腐潰及難於收斂若不審察而妄投攻劑虛虛之
禍不免矣及患後更當調養若瘰癧流注之屬尤當補益也
否則更患他證必難措治慎之○又曰潰瘍氣屬氣血俱虛
固所當補若患腫瘍而氣血虛弱者尤宜預補否則雖潰而
不斂矣又凡大創之後氣血未復多致再發若不調補必變

爲他證而危或誤以瘡毒復發及行攻伐則速其不起深可爲戒也○又曰若瘡瘍腫焮痛甚煩躁脉大則辛熱之劑不但腫瘍不可用卽潰瘍亦可用也

太平聖惠方云凡癰疽膿潰之後脉微澁遲緩者邪氣去而真氣將復也爲易愈若脉來沉細而直者裏虛而欲變證也若膿血既去則當脉靜身涼腫消痛息如傷寒表證之得汗也若反發熱作渴脉洪數者此真氣虛而邪氣實也死無疑矣

潰瘍有餘二十八

潰瘍有餘之證其辨有四蓋一以元氣本強火邪本盛雖膿潰

之後而內熱猶未盡除或大便堅實而能食脈滑者此其形
氣病氣俱有餘仍宜清利不宜溫補火退自愈亦善證也一
以真陰內虧水不制火膿既泄而熱反甚脈反躁者欲清之
則正氣以虛欲補之則邪氣愈甚此正不勝邪窮敗之證不
可治也一以毒深而潰淺者其肌腠之膿已潰而根盤之毒
未動此乃假頭非真潰也不得遽認爲潰瘍而槩施托補若
誤用之則反增其害當詳辨也又有一種元氣以虛極似宜
補然其稟質滯濁肌肉堅厚色黑而氣道多壅者畧施培補
反加滯悶若此輩者真虛既不可補假實又不可攻最難調

理極易招怨是亦不治之證也總之潰瘍有餘者十之一二
故潰瘍宜清者少腫瘍不足者十常四五故腫瘍宜補者多
此亦以癰疽之危險有關生死者爲言故貴防其未然也至
若經絡浮淺之毒不過腫則必潰潰則必收又何必卷卷以
補瀉爲辨也觀者審之

一男子年逾三十腹患癰腫脉數喜冷齊氏云瘡瘍腫起堅硬
瘡疽之實也河間云腫硬木悶煩躁飲冷邪氣在內也遂用
清涼飲倍加大黃三劑稍緩次以四物湯加芩連山梔木通
四劑遂潰更以十宣散去參芪肉桂加金銀花天花粉斷之

彼欲速效自服溫補藥遂致肚腹俱腫小便不利仍以清涼
飲治之膿潰數碗再以托裏藥而愈○趙宜人年逾七旬患
發疽已潰焮腫甚痛喜冷脉實大便秘澀東垣曰煩躁飲冷
身熱脉大精神昏悶者皆臟腑之實也遂以清涼飲一劑腫
痛悉退更以托裏消毒藥三十餘劑而平若謂年高潰後投
以補劑實實之禍不免矣

薛按

潰瘍作痛

二十九

立齋曰膿出而反痛者虛也宜補之○脉數虛而痛者屬虛火
宜滋陰○脉數實而痛者邪氣實也宜泄之○脉實便秘而

痛者邪在內也宜下之○脉滑而痛者氣血虛寒也溫補之
○大抵瘡之始作也先發爲腫氣血鬱積蒸肉爲膿故多痛
膿潰之後腫退肌寬痛必漸減若反痛者乃虛也宜補之亦
有穢氣所觸者宜和解之風寒所逼者宜溫散之

丁蘭年二十餘股內患毒日久欲求內消診其脉滑數知膿已
成因氣血虛不潰遂刺之膿出作痛以八珍湯治之少可但
膿水清稀更以十全大補湯加炮附子五分數劑漸愈仍服
十全大補湯三十餘劑而痊○一僧股內患腫一塊不痛不
潰治以托藥二十餘劑膿成刺之作痛予謂腫而不潰潰而

反痛此氣血虛甚也宜峻補之彼云氣無補法予謂正氣不足不可不補補之則氣化而痛邪自除遂以參芪歸朮熟地黃治之兩月餘而平

薛按

潰瘍發熱

附惡寒三十

用手模熱有三法以輕手捫之則熱重按之則不熱是熱在皮毛血脉也重按之至筋骨之分則熱蒸手極甚輕手則不熱是邪在筋骨之間也不輕不重按之而熱是熱在筋骨之上皮毛血脉之下乃熱在肌肉也

仲景曰脉虛則血虛血虛生寒陽氣不足也○寸口脉微爲陽

不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒尺脉弱爲陰不足陽氣下
陷入陰中則發熱也

王氏曰病熱而脉數按之不鼓動乃寒盛格陽而致之非熱也
形證似寒按之而脉氣鼓擊於指下盛者此爲熱甚拒陰而
生病非寒也

東垣曰發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣或目痛鼻乾
但脉洪大按之無力者非白虎湯證也此血虛發躁當以當
歸補血湯主之又有火鬱而熱之證如不能食而熱自汗氣
短者虛也當以甘寒之劑瀉熱補氣如能食而熱口舌乾燥

大便難者當以辛苦大寒之劑下之以瀉火保水○又曰晝
則發熱夜則安靜是陽氣自旺於陽分也晝則安靜夜則發
熱煩躁是陽氣下陷入陰中也名曰熱入血室晝夜發熱煩
躁是重陽無陰也當亟瀉其陽峻補其陰

立齋曰脈浮或弱而熱或惡寒者陽氣虛也宜補氣○脈澀而
熱者血虛也宜補血○脈浮數發熱而痛者邪在表也宜散
之○脈沉數發熱而痛者邪在裏也當下之○午前熱者補
血爲主○午後熱者補氣爲主○左手脈小於右手而熱者
用血藥多於氣藥○右手脈小於左手而熱者用氣藥多於

血藥

發熱煩躁 三十一

王太僕曰大寒而甚熱之不熱是無火也當治其心大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止條忽往來時動時止是無水也當補其腎故心盛則生熱腎盛則生寒腎虛則寒動於中心虛則熱收於內又熱不勝寒是無火也寒不勝熱是無水也夫寒之不寒責其無水熱之不熱責其無火熱之不久責心之虛寒之不久責腎之弱治者當深味之

立齋曰瘡瘍發熱煩躁或出血過多或膿潰大泄或汗多亡陽

或下多亡陰以致陰血耗散陽無所依浮散於肌表之間而
非火也○若發熱無寐者血虛也用聖愈湯兼汗不止氣虛
也急用獨參湯○發熱煩躁肉瞤筋惕血氣俱虛也用八珍
湯○大渴面赤脉洪大而虛陰虛發熱也用當歸補血湯○
肢體微熱煩躁面赤脉沉而微陰盛發躁也用四君加薑附

作嘔 三十二

立齋曰喜熱惡寒而嘔者宜溫養胃氣○脉細腸鳴腹痛滑瀉
而嘔者宜托裏溫中○喜寒惡熱而嘔者宜降火○脉實便
秘而嘔者宜瀉火○若不詳究其源而妄用攻毒之藥則腫

有不能潰潰者不能斂矣雖丹溪曰腫瘍時嘔當作毒氣攻
心治之潰瘍時嘔當作陰虛補之殊不知此大槩之言耳况
今之熱毒內攻而嘔者十纔一二脾胃虛寒或痰氣而嘔者
十居八九故不可執以爲言也○又曰凡癰瘍腫赤痛甚煩
躁脉實而嘔者爲有餘當下之若腫硬不潰脉弱而嘔者乃
陽氣虛弱當補之若嘔吐少食者乃胃氣虛寒當溫補脾胃
若痛傷胃氣或感寒邪穢氣而嘔者雖在腫瘍當助胃壯氣
若妄用攻伐多致變證不治

薛氏樞要曰癰瘍作嘔不可泥於熱毒內攻而槩用敗毒等藥

○如熱甚熾痛邪氣實也仙方活命飲解之○作膿熾痛胃
氣虛也托裏消毒散補之○膿熟脹痛氣血虛也先用托裏
散後用針以泄之○熾痛似秘熱壅於內也內疎黃連湯導
之○若因寒藥傷胃而嘔者托裏健中湯○胃寒少食而嘔
者托裏益中湯○中虛寒滯而嘔者托裏溫中湯○肝木乘
脾而嘔者托裏抑清湯○胃院寒而嘔者托裏清中湯○
脾虛自病而嘔者托裏益黃湯○鬱結傷脾而嘔者托裏越
鞠湯○又曰大凡諸瘡作嘔若飲冷便秘是熱毒也黃連消
毒散解之○飲冷便實是胃火也竹葉石膏湯清之○懶食

飲湯是謂虛也補中益氣湯補之○大便秘實喜飲熱湯之
脾胃虛寒也六君加炮薑以溫之○常見脾胃虛弱者用前
散及心膈陰冷致嘔而痰舌生瘡乃腎水枯涸虛火炎上也
其證甚惡急用加減八味丸亦有得生者

熱毒作嘔證如劉貴患腹癰熾痛煩躁脈實作嘔河間云瘡瘍
者火之屬須分內外以治其本若脈沉實者先當疎其內以
絕其源又曰嘔噦心煩脈沉而實通膈木悶或皮肉不變邪
氣在內宜用內疎黃連湯治之然作嘔脈實毒在內也遂以
前湯通利二三行諸證悉去更以連翹消毒散而愈○金臺