

第三冊

濕淫病案
燥淫病案

全國名醫驗案類編

上海大東書局印行



北京中医药大学图书馆版权所有

當國代

名醫驗案類編目錄

初集 四時六淫病案

第四卷 濕淫病案

冒濕案 內科 毛鳳岡

傷濕兼寒案 內科 蕭琢如

中濕夾痰案 內科 何拯華

伏濕發瘡案 內科 沈奉江

伏濕腹痛案 內科 陳憩南

濕流關節案 內科 蕭琢如

濕痹案 內科 黃袞甫

濕痹腫喘案 內科 周小農



北京中医药大学图书馆版权所
1951

濕夾溢飲案 内科

何拯華

濕瘡案 婦科

劉榮年

三陰濕瘡案 内科

洪巨卿

濕瀉案 内科

葉鑑清

濕溫案 内科

葉鑑清

濕溫案 内科

王子達

濕溫案 内科

過允文

濕溫兼寒案 内科

何拯華

濕溫夾痰案 内科

周小農

濕溫轉虛案 内科

袁桂生

濕溫壞症案 内科

孫少培

濕熱頭痛案 内科

王經邦



濕熱痢案 內科

葉鑑清

濕熱痢轉休息案 內科

李竹溪

濕熱痢兼瘻案 內科

嚴紹岐

酒濕休息痢案 內科

孫少培

濕熱陽黃案 內科

陳憩南

濕腳氣案 內科

陳作仁

濕腳氣案 內科

葉鑑清

濕脚氣上衝案 內科

魏長焱

腳氣上衝案 內科

高虬雲

腳氣衝心案 內科

李伯鴻

當代全國名醫驗案類編

初集 四時六淫病案

第四卷 濕淫病案

○冒濕案 內科

〔病者〕毛子培，年三十一歲，住漕橋。

〔病名〕冒濕。

〔原因〕初夏淫雨纏綿，晴後濕氣上蒸，晨起冒霧而行，遂感其氣而發病。

〔症候〕頭重如裹，身熱無汗，遍體不舒，四肢倦懈。

〔診斷〕脈右浮緩而軟，左微弦而滯，舌苔薄白而滑，此濕氣蒙於皮毛而未傳。

經入裏。汪訥庵所謂輕則爲冒也。

毛鳳岡住常州



南京中医药大学图书馆版权

〔療法〕宣疏表濕爲首要。故以蘇藿苓皮爲君。辛散芳淡。以取微汗。蘭竹青箬爲臣。清芬淡泄。以化濕。佐以桂枝木微辛而淡。達其肢體。使以蔻殼助茯苓。以皮達皮也。

〔處方〕紫蘇葉

一錢

佩蘭葉

錢半

淡竹葉

錢半

青箬葉

錢半

白蔻殼

八分

藿香葉

錢半

先用浙苓皮

八錢

桂枝木

八分

煎湯代水

〔次診〕一劑而微微汗出。頭重肢懈均除。二劑而身熱退。遍體舒。惟胸中暑痞。口淡胃鈍。兼吐稀痰。溺亦短少。脈左弦象雖退。右尚緩滯。舌苔白轉微黃。治以辛通淡滲。二陳合四苓湯加減。

〔次方〕薑半夏

錢半

浙茯苓

四錢

猪苓

錢半

杜藿梗

二錢

新會皮

錢半

生苡仁

四錢

澤瀉

錢半

炒穀芽

二錢

〔效果〕連服三劑。胸寬胃健。小便暢利而痊。

廉按前哲倪松亭曰。治濕之道非一。當細察表裏上下。爲用藥之準的。如

濕氣在於皮膚者。宜用麻桂二尤。以表其汗。譬如陰晦。非雨不晴也。亦有
用羌防白芷等風藥以勝濕者。譬如清風薦爽。濕氣自消也。水濕積於胃
腸。肚腹腫脹者。宜用遂戟芫丑之屬。以攻其下。譬如水滿溝渠。非導之不
去也。寒濕在於肌肉筋骨之間。拘攣作痛。或麻痹不仁者。宜用薑附丁桂
之屬。以溫其經。譬如太陽中天。則濕自乾也。濕氣在於臟腑之內。肌腠之
外。微而不甚者。宜用朮蒼樸夏之屬。以健脾燥濕。譬如微濕以灰繆之。則
濕自燥也。濕熱在於小腸膀胱。或腫或渴或溺閉不通者。宜用二苓車瀉
之屬。以滲利之。譬如水溢溝澗。非疏通其竇。不達也。學者能於斯理玩熟。
則治濕之法。必中鵠矣。此案治冒濕輕症。毋須麻羌重劑。初方五葉桂苓。
清穩新穎。接方二陳四苓。剛剛恰好。

○傷濕兼寒案 內科

〔病者〕黃君。年三十餘。住本鄉南貨店。

蕭琢如佳湘鄉人
口山廿局

〔病名〕傷濕兼寒。

〔原因〕素因體肥多濕。現因受寒而發。醫藥雜投無效。改延予診。
〔症候〕手足遲重。遍身痠痛。口中淡。不欲食。懶言語。終日危坐。

〔診斷〕脈右緩左緊。舌苔白膩。此金匱所謂濕家身煩疼可與麻黃加朮湯也。

〔療法〕遵經方以表達之。使寒濕悉從微汗而解。

〔處方〕帶節麻黃

八分

川桂枝

七分

光杏仁

錢半

炙甘草

五分

杜蒼朮

一錢

〔效果〕連投二劑。諸症悉平而愈。

廉按此爲濕之屬表無汗者而設。蓋麻黃得朮雖發汗而不爲多汗。朮得麻黃行裏濕而並可行表濕止此一味加入所謂方外之神方法中之良法也。宜其一方卽愈。

● 中濕夾痰案

內科

何拯華

紹興同善局



北京中医药大学图书馆版权所
北京中医药大学图书馆版权所

【病者】施德培君年廿六歲業商住昌安門外直樂施村

【病名】中濕夾痰

【原因】素有痰飲適逢首夏乍晴乍雨晴則炎蒸雨則沉悶適感其氣而猝中

【症候】初起頭眩神倦繼卽忽然昏倒神識模糊不省人事痰響喉間狀類中風

【診斷】脈右沉小而滑左沉細濁舌苔滑白此卽類中門中之濕中也由濕濁與痰飲相搏上蒙清竅頓致痰潮壅塞雖云濕中實則痰中氣返則生不返則危矣

【療法】宣竅開痰爲首要故以蘇合香丸遠志菖蒲爲君開其竅以解語杏仁括蔞爲臣下其氣以降痰佐以戈半夏消痰中之飲使以皂角通上下之竅也

【處方】遠志肉

錢半去心

鮮石菖蒲

一錢半
熟沖一錢搓

戈半夏

一錢

光杏仁

三錢



皂角五分

拌炒括蔥仁四錢

蘇合香丸一顆研細

藥湯調服

【次診】一劑而咯痰出聲。二劑而神醒能語。惟神倦嗜臥。頭目眩暈。脈右沉緩兼滑。左微弦。此濕困脾陽而痰作眩暈也。治以豁痰定暈。倣東垣半夏天麻白朮湯加減。

【次方】竹瀝半夏

四錢
明天麻 錢半

枳殼 二錢

拌炒生於朮 錢半

抱木茯神

三錢
廣皮紅 一錢

遠志 一錢

生薏苡仁 四錢

白芥子 五分

拌搗括蔥仁 四錢

【三診】連投兩劑。眩暈雖止。而氣弱神疲。肢懈無力。咳嗽不爽。脈右浮滑沉弱。舌苔仍白而滑。治以益氣化痰。用六君子湯加竹瀝薑汁。

【三方】老東參

一錢

浙茯苓

三錢

薑半夏 三錢

炒廣皮 一錢

生於朮

錢半

清炙草 五分

淡竹瀝 兩瓢

生薑汁 半小匙

和勻同沖

【效果】連服四劑。諸症皆平。精神振作而瘥。

廉按濕爲陰邪，病發徐而不急。今忽狀如中風者，由濕阻肺氣，氣鬱則逆。挾素有之痰，飲堵塞其出入之清竅，故昏厥而不省人事。方用宣竅開痰，當然中肯。妙在蘇合香丸之辛香開達，宣氣通竅，故能奏速功。接方倣東垣法，三方用和劑，局方亦皆適當。

○伏濕發瘡案

內科

〔病者〕王君，年十八歲，住錫山東大街。

沈奉江

住無錫

〔病名〕伏濕發瘡。

〔原因〕其母寡婦，只此一子。病寒熱起伏，已歷三候。病勢轉劇，特來延診。

〔症候〕熱久不解，骨瘦支離，心胸煩悶，遍體不舒。

〔診斷〕脈細數苔薄膩，此伏濕未清，防有白瘡鬱於衛分也。

〔療法〕當輕宣氣分之濕，使氣暢，濕開。邪達衛分而解。

〔處方〕薄荷葉

八分

淨蟬衣

八分

牛蒡子

錢半

佩蘭葉

二錢

廣鬱金

二錢
生打

杜藿梗

二錢

飛滑石

三錢
包煎

猪苓

一錢

佛手柑

八分

鮮荷葉

一錢

【次診】連投兩劑始透白瘡細粒密佈色如枯骨。前哲謂氣液已竭余以爲久病初透而未足也。再宗前法加鮮茅根水蘆根各二兩煎湯代水。

【效果】一劑而遍體透足粒粒晶珠二劑而熱勢大退二三日能食稀粥調養

旬日而痊。

廉按白瘡小粒如水晶色者氣液未竭也其症多吉若瘡發枯白如骨者氣液已竭也其症多凶此案舌苔薄膩尙屬濕鬱衛分汗出不徹勢然其瘡初出雖如枯骨繼加茅蘆二根升津增液續發粒粒晶珠故能竟奏全功

○伏濕腹痛案

內科

【病者】張俊卿中學堂生年二十一歲澄海人住汕頭

陳憇南

金山脚
佳湖安

【病名】伏濕腹痛。

【原因】地近淫溼。暮春濕漲。婚後精氣空虛。遂襲人而不覺。

【症候】每日亭午卽臍中切痛。抵晚漸劇。氣急上逆。能坐不能臥。必嘔吐至鹹味出乃止。自春徂秋。百醫莫效。困甚。

【診斷】脈兩寸如平。右關緩細。尺弱。左關亦緩。尺濇。詳察脈症。的係濕氣傷腎。伏處於精室之中。所謂伏濕腹痛也。按腎之部位在脊骨十四椎左右。各一枚。其功用能將周身流入之血吸收。其敗濁之質向膀胱而排泄。今爲濕氣所傷。則瑪氏囊失職。致敗濁之質仍向周身流去。是以面目黧黑也。精室處膀胱之後。直腸之前。與腎貫通。是以痛在臍中也。衝脉寄居其間。濕伏於此。則衝亦病。書曰。衝脉爲病。逆氣裏急。所以氣急上逆。能坐不能臥也。病必午發者。因衝脉附麗於陽明。午爲陽明氣旺之時。欲藉此以攻除其所伏。故激動之而發也。吐出鹹味乃止者。以鹹爲

腎之本味吐出則伏邪亦洩。邪洩則衰。故痛止也。前醫不知其有伏邪。
徒取調氣止痛消導去積之套方。因循坐誤。致令元氣日虧。精血日耗。
兩尺脉之見弱且濇也。所幸病前半日猶能食飲。胃氣尚存。庶幾易治。

【療法】邪伏既久。邪正混爲一家。助正化邪。乃合理法。主用四物湯。補血活血。
爲君。枸杞北蓍。杜仲巴戟。生精益氣爲臣。茯神草薢。琥珀菖蒲分清導。
竅爲佐。紫河車。鹿茸。走精室壯腎陽爲使。三劑逐日水煎。午前服。

【處方】大當歸

二錢

甘杞子

三錢

正琥珀

一錢

研沖

川杜仲

三錢

酒川芎

錢半

生黃蓍

三錢

川菖蒲

二分

巴戟天

二錢

老熟地

三錢

川茯神

三錢

川萆薢

錢半鹽水製

杭酒芍

二錢

紫河車

四錢

北鹿茸

三錢酒製

【效果】二劑後通腹皆痛。三劑忽大痛不可忍。旋瀉下黑如墨者數次。翌日清晨復大瀉一次。病竟如失。後不再發。

廉接辨症詳明論理透澈參以新學更爲精鑿病原分析極清用藥亦切

實周到

○濕流關節案 內科

蕭琢如住湘鄉水
口山北局

【病者】商客徐君年四十餘住四川

【病名】濕流關節

【原因】端節前來鎮收賬冒雨而行鞋襪皆濕濕從下受而發難治不愈已十日矣。

【症候】兩脚骨節疼痛晝夜叫號跬步不能移惟飲食大小便如常。

【診斷】脈右沉緩左沉細濇舌苔淡白此卽金匱所謂太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名中濕是也。

【療法】通則不痛以疏通關節爲君與自製七節湯加減。

【處方】生黃芪二錢半

全當歸三錢

生白芍三錢

川芎

三錢

桂枝節 三錢

甘草節 一錢

桑枝節如指大 三箇 杉枝節 三箇

松枝節 三箇

蘇杆節 三箇

竹枝節 三箇

生淮牛膝 二錢

〔效果〕一劑知連服十劑平復如初

廉按濕者六淫之一也亦如中風傷寒自太陽始但風寒之太陽病病在

肌表濕之太陽病病在關節關者機關之室真氣之所過也節者骨節之交神氣之所游行出入者也今病濕則神真之氣爲濕邪所傷故關節疼痛而煩濕爲陰邪故脈沉而細濕不在外而在下下流兩脚關節皆筋脈交紐之處肝主筋而藏血血被濕阻阻遏氣道逼壓神經故爾劇痛與濕腳氣似同而實異與歷節風似異而實同方用自製七節湯以黃芪當歸白芍川芎爲君輔以桑枝杉枝松枝桂枝紫蘇竹枝皆用節即甘草亦用節取其以節入節且黃芪當歸桂枝白芍川芎甘草具黃芪五物當歸四逆兩方之功用紫蘇節則尤能行氣中血滯輔以桑杉松各枝節能使關

節中停蓄之風濕，一掃而空，至竹枝節氣味甘寒，恐有拒而不納，以之爲反佐，故於上症功效頗鉅。本方去牛膝，治兩手關節疼痛，猛不可當，亦多奏效，真獨出心裁之良方也。

●濕痹案 内科

黃袞甫
住金山
呂巷鎮

【病者】黃松林，年三十八歲，業農，住泖灣村。

【病名】濕痹。

【原因】初傷濕，繼受寒，寒濕相搏，遂致麻痺。

【症候】左足脛疼痛，伸屈不利，步履維艱。

【診斷】脈左沉遲，右稍弦，證脈合參，斷爲着痹。內經論痹症，每與中風相合。然風則陽受之，而痹則陰受之。痹者閉而不通之謂也。今寒濕客於下焦，屬陰，以陰遇陰，濕性膩，寒性遲，濕遇寒而凝結，愈力寒遇濕而壅閉，不宣不通，則痛；通則不痛。