

何論之匹諸方目錄

太陽陽明合方 計九方除重

陽明少陽合方 計六方除重

三陰及各症方 計三十九方除重通合三卷其得一百八方餘五方于論內見

尙論張仲景陽寒論陰陽六經諸方脉症後卷之四

西昌喻昌嘉言甫著

黎川陳守誠伯常重梓

太陽合陽明方

桂枝加葛根湯

桂枝湯加葛根

太陽病項背強几几反汗出惡風者主之。仲景原文

几几項背拘強之狀。

按後症葛根湯乃桂枝湯中加麻黃葛根也。其症無汗。故以麻黃發之。此症有汗。故去麻黃而曰桂

枝加葛根湯也。若有麻黃，則亦葛根湯矣。

葛根湯

桂枝湯加

麻黃

葛根

太陽病。項背強。几几。無汗惡風。葛根湯主之。原文

風寒傷經絡之經。則所過但痛而已。未至於強。風寒傷筋骨之筋。則所過筋急。強直而成剛。瘧瘧。瘧瘧。字之訛也。曰剛瘧。無汗之名也。本草云。輕可去實。葛根麻黃。形氣之輕者也。此以風寒表實。故加二物於桂枝湯中。

太陽與陽明合病者。必自下利。葛根湯主之。原文

太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根湯半夏湯主之原文

葛根加半夏湯

方見本湯

凡合病必自下利下利裏症也今之庸醫皆曰漏底傷寒不治仲景則以前方主之蓋以邪氣併於陽則陽實而陰虛陰虛故下利也以此湯散經中表邪則陽不實而陰氣平利不治而自止也惟明者知之其脉必弦而長

張云凡合病皆下利各從外症以別焉夫太陽病

頭項痛。腰脊強。陽明病。目疼鼻乾。不得卧。少陽病。胸脇痛。耳聾。凡遇兩經病症齊見。而下利者。合病也。然但見一症。便是不必悉具也。仲景不言脉症。止言太陽與陽明合病者。以前章所論包含以上之症。卽此理也。況各經之症。所見不一。難爲定論乎。

按合病者。三陽合病也。謂二陽經。或三陽經。同俱受邪。相合而病。故曰合病。此病之不傳者也。併病者。亦指三陽而言。併者。催併督併之謂。前病未解。後病已至。有逼相併之義。此病之傳者也。且如太

陽陽明併病一症。若併而未盡。是傳未過。尙有表症。仲景所謂太陽病不罷。面色赤。陽氣怫鬱在表。不得越。煩燥氣短是也。猶當汗之。以各半湯。若併之已盡。是謂傳過。仲景所謂太陽症罷。潮熱手足汗出。大便鞭而譟語者是也。法當下之。以承氣湯。是知傳則入府。不傳則不入府也。所以仲景論太陽陽明合病。止出三症。加前太陽陽明併病。則言其有傳變如此也。然此皆三陽病耳。與三陰無干。若與三陰合病。卽是兩感矣。所以三陰無合病例也。

梔豉湯

方見太陽中篇

發汗吐下後虛煩不得眠者主之

原文下六條同

懊者懊惱。懷者鬱悶。覩心中懊惱。煩煩懷懷。鬱鬱不舒。憤憤無奈。此又煩悶而甚者也。由下後表之陽邪乘虛內陷。鬱而不發。結伏於心胸之間。故如是。按梔子色赤味苦入心而治煩。香豉色黑味鹹入腎而治燥。

發汗若下之而煩熱胸中窒者主之

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲

解也宜主之

陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒少惡熱身重若發汗則燥心憤憤反讖語者主之。

煩者氣也躁者血也氣主肺血主腎煩躁俱在上者腎子通於肺母也故用梔子以治肺煩用香豉以治腎躁煩躁者懊惱不得眠也

或曰煩者心爲之煩躁者心爲之躁何煩爲肺躁爲腎耶夫心者君火也與邪熱相接上下通熱金以之而躁水以之而虧獨存火耳故肺腎與之合

而煩躁焉。此煩雖肺躁。雖腎其實。心火爲之也。陽明病下之。其外有熱。手足溫。不結胸。心中懊惱。飢不能食。但煩汗出者。主之。

下利後更煩。按之心下濡者。爲虛煩也。宜此湯。

下利後不煩。爲欲解。若更煩而心下堅者。爲穀煩。此煩是心下濡者。是邪熱乘裏客於胸中。爲煩也。與此湯吐之。則愈。

按此湯惟吐無形之虛煩。則可。若用之以去實。則非。豉子所能宣矣。宣實者。須瓜蒂散主之。凡服梔子湯。病人舊微溏者。不可與服之。

仲景用梔子湯治煩胸爲高之分也。故易老云：輕飄向象，肺色赤而象火，故能瀉肺之火也。本草不言吐，仲景用此爲吐者，梔子本非吐藥，爲邪氣在上拒而不納，故令人上吐。邪因得以出，經曰：高者因而越之，此之謂也。或用梔子利小便，實非利小便清肺也。肺氣清而化膀胱爲津液之府，小便得以出也。本經云：治大小腸熱，辛與庚合，又與丙合，又能泄戊。其先入中州故也。去皮泄心火，連皮泄肺火，入手太陰少陰經。

麻仁丸

大黃 枳實 厚朴 芍藥 麻仁 杏仁

跌音幸與跌

跌陽脉浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏

大便則難其脾為約麻仁丸主之

原文

成無已曰約者結約之約胃強脾弱約東津液不

得四布但輸膀胱故小便數而大便鞭故曰脾約

與此丸以下脾之結燥腸潤結化津液入胃大便

利小便少而愈矣愚切有疑焉既曰約脾弱不能

運也脾弱則土虧矣必脾氣之散脾血之耗也原

其所由必久病大汗大下之後陰血枯槁內火燔

灼熱傷元氣必傷於脾而成此症傷元氣者肺金

愛火氣無所攝。傷脾者。肺爲脾之子。肺耗則液竭。必竊母氣以自救。金耗則木寡於畏。土欲不傷。不可得也。脾失轉輸之令。肺失傳送之官。宜大便秘而難下。小便數而無藏蓄也。理宜滋陰血。使孤陽之火不熾。而金行清化。木邪有制。脾土清健而運行精液。乃能入胃。則腸潤而通矣。今以大黃爲君。枳實厚朴爲臣。雖有芍藥之養血。麻仁杏仁之溫潤爲之佐。使用之熱盛而氣實者。無有不安。若與熱雖盛而氣不實者。雖得暫通。保無有脾愈弱而腸愈燥者乎。後之用此方者。慎勿膠柱而調瑟。

茵陳蒿湯

茵陳 六兩 大黃 二兩 梔子 十四枚

陽明病發熱汗出此為熱越不能發黃也。但頭汗出身無汗。劑頭而還。小便不利。渴飲水漿者。此為瘀熱。仁裏身必發黃。茵陳蒿湯主之。原文下三條同
傷寒八九日。身黃如橘。子色。小便不利。腹微滿者。茵陳蒿湯主之。

梔子蘗皮湯

梔子 蘗皮

傷寒身黃發熱者。梔子蘗皮湯主之。

茵陳蒿湯。治熱濕也。梔子蘗皮湯。治燥熱也。如苗
澇則濕黃。旱則燥黃。濕則泄之。燥則潤之也。此三
藥治陽黃也。

麻黃連軀赤小豆湯

方見三卷

傷寒瘀熱在裏。身必發黃。麻黃連軀赤小豆湯主之。
連軀。用連翹根也。氣寒。味苦。主下熱氣。梓白皮。氣
寒。味苦。主熱毒。去三蟲。時氣瘀熱之劑。必以苦爲
主。又曰。大熱之氣。寒以取之。是也。
潦水。卽霖雨後。行潦之水。亦取其發縱之極。流而

不滯不助濕也。

右三湯。其茵陳湯是欲泄滌其熱也。梔子與麻黃二湯。是欲解散其實也。爲治不同。總之皆折火徹熱之劑耳。色如烟熏黃。乃濕病也。一身盡痛。色如橘。子黃。乃黃病也。一身不痛。間發黃。活人云。病人寒濕在裏不散。熱蓄於脾胃。腠理不開。瘀熱與宿穀相薄。鬱蒸不消化。故發黃。然發黃與瘀血外症及脉俱相似。但小便不利爲黃。小便自利爲瘀血。要之發黃之人。心脾蘊積。發熱引飲。脉必浮滑而紫數。苦瘀血症。卽如狂。大便必黑。此爲異。

或問白虎症亦身熱煩渴引飲小便不利何以不發黃。答曰。白虎與發黃症相近。徧身汗出。此爲熱越。白虎症也。頭面汗出。頸已下都無汗。發黃症也。又問太陽病。一身盡痛。發熱。身如薰黃者。何曰。太陽中濕也。仲景云。傷寒發汗已。身目爲黃。所以然者。以寒濕在裏不解故也。以爲不可下也。於寒濕中求之。

或謂傷寒發黃。惟陽明與太陰有之。俱言小便利者。不能發黃。何也。蓋黃者。土之正色。以太陰與陽明俱病。土故發黃也。其黃之理。外不能汗。裏不得