

三陰摠論 太陰病 腹滿 腹痛 黃 少陰病

但欲寐嗜卧 口燥咽乾 咽痛 吐 吐利 下利

厥陰病 氣上衝心 飢不欲食 吐虺 厥 少腹痛

囊縮 陰毒

準繩寒科

傷寒證治準繩帙之四

金壇王肯堂輯

瘦樵程永培校

三陰總論

黃三陰有傳經之邪有內感之邪傳經者自太陽傳入者是也內感者直中三陰非自陽經次第流傳而來由形寒飲冷而得損動胃氣之所致也其脈證略與傷寒外感之證相似細辨之特異耳然止係雜病非傷寒熱病受寒之證也夫邪之生也或生於陰或生於陽其生於陽者得之風雨寒暑其生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒仲景云發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒

者發於陰也此三陰內感之證首尾無熱縱有熱者亦
仲景所謂反發熱也又當考始得之三字則見矣內感
之證始終只在一經不復傳變不傳者何陽動而陰靜
故陽傳而陰不傳也若以傷寒之三陰三陽言之則所
傳者表裏經絡而已况風寒六氣之邪中人或中於陽
經或入於陰絡孰爲之先孰爲之後烏可專以太陽爲
受邪之始故各經皆能受邪然邪自太陽始者比各經
居多盖始雖自三陰中熱者亦傳歸陽明而後已也三
陰經自中寒決無復傳變三陰無合併病者以此

王嘗讀張仲景傷寒論於太陰有曰自利不渴者屬太

陰以其藏有寒故也當溫之宜服四逆輩於少陰有曰
少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯
湯主之少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯
主之少陰病下利白通湯主之少陰病下利脈微者與
白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加豬膽汁湯
主之少陰下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身
反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止
脈不出者通脈四逆湯主之少陰病脈沉者急溫之宜
四逆湯於厥陰有曰手足厥寒脈細欲絕者當歸四逆
湯主之大汗若大下利而厥冷者四逆湯主之觀仲景

此論則傷寒三陰必有寒證而宜用溫熱之劑也及讀
劉守真之書有曰傷寒邪熱在表府病爲陽邪熱在裏
藏病爲陰俗妄謂有寒熱陰陽異證誤人久矣寒病有
矣非汗病之謂也寒病止爲雜病終莫能爲汗病且造
化汁液之氣者乃陽熱之氣非陰寒之所能也雖仲景
有四逆湯證是治表熱裏和誤以寒藥下之太早表熱
入裏下利不止及或表熱裏寒自利急以四逆溫裏利
止裏和急解其表也故仲景四逆湯證復有承氣湯下
之者由是傷寒汗病經直言熱病而不言寒也經言三
陰證者邪熱在藏在裏以藏與裏爲陰當下熱者也素

問論傷寒熱病有二篇名曰熱竟無寒理兼素問併靈
樞諸篇運氣造化之理推之則爲熱病誠非寒也觀守
真此論則傷寒無間在表在裏與夫三陽三陰皆一於
爲熱而決無或寒者矣兩說不同其是非之判必有一
居此者由是彼此反覆究詰其義而久不能得雖至神
疲氣耗不舍置者自謂此是傷寒大綱領此義不明則
千言萬語皆未足以爲後學式况戕賊民生何有窮極
也哉意謂成無已之註必有所發明者遂因而求之然
亦止是隨文而略釋之竟不明言何由爲熱何由爲寒
之故此非其不欲言也蓋止知傷寒皆是傳經故疑於

六經所傳俱爲熱證而熱無變寒之理遂不敢別白耳
以寒爲本藏之寒歟安得當熱邪傳裏入深之時反獨
見寒而不見熱者且所用溫熱藥能不助傳經之熱邪
乎以寒爲外邪之寒歟則在三陽已成熱矣豈有傳至
三陰而反爲寒哉成氏能潛心乎此則必悟其所以然
矣自仲景作傷寒論已來靡或遺之而弗宗至於異同
之論興而漁者走淵木者走山矣宜乎後人不能決於
似是而非之際故或謂今世並無真傷寒病又或以爲
今人所得之病俱是內傷又昧者至謂傷寒論中諸溫
藥悉爲傳經熱邪而用者以三陰經屬陰故也又其大

謬者則曰凡論中有寒字皆當作熱字看嗚呼末流之
弊一至此乎於是澄心靜慮以涵泳之一旦劃然若有
所悟者然亦未敢必其當否也姑陳之以從有道之正
夫三陽之病其寒邪之在太陽也寒鬱其陽陽不暢而
成熱陽雖人身之正氣旣鬱則爲邪矣用麻黃發表以
逐其寒則腠理通而鬱熱泄故汗而愈苟或不汗不解
其熱不得外泄則必裏入故傳陽明傳少陽而或入府
也若夫三陰之病則或寒或熱者何哉蓋寒邪之傷人
也或有在太陽經鬱熱然後以次而傳至陰經者或有
太陽不傳陽明少陽而便傳三陰經者或有寒邪不從

陽經而始直傷陰經者或有雖從太陽而始不及鬱熱
卽入少陰而獨見少陰證者或有始自太陽卽入少陰
而太陽不能以無傷者或有直傷卽入而寒便變熱及
始寒而終熱者其鬱熱傳陰與寒便變熱則爲熱證其
直傷陰經及從太陽卽入少陰則爲寒證其太陽不能
無傷則少陰脉證而兼見太陽標病其始爲寒而終變
熱則先見寒證而後見熱證此三陰之病所以或寒或
熱也苟卽三陰經篇諸條展轉玩繹以求之理斯出矣
夫其或傳經或直傷或卽入或先寒後熱者何也邪氣
暴卒本無定情而傳變不常故耳故經曰邪之中人也

無有常或中于陽或中于陰夫守真者絕類離倫之士也豈好爲異說以駭人哉蓋由其以溫暑爲傷寒而仲景之方每不與溫暑對故略乎溫熱之劑而例用寒涼由其以傷寒一斷爲熱而無寒故謂仲景四逆湯爲寒藥誤下表熱裏和之證及爲表熱裏寒自利之證而立又謂溫裏止利急解其表又謂寒病止爲雜病嗟乎仲景傷寒論專爲中而卽病之傷寒作不兼爲不卽病之溫暑作故每有三陰之寒證而溫熱之劑之所以用也以病則寒以時則寒其用之也固宜後人不知此意是以愈求愈遠愈說愈鑿若知此意則猶庖丁解牛動中

肯繫矣且如寒藥誤下而成裏寒者固誠爲不無矣不
因寒藥誤下而自爲裏寒者其可謂之必無乎殊不知
陰經之每見寒證者本因寒邪不由陽經直傷於此與
夫雖由太陽而始不及鬱熱卽入於此而致也雖或有
因寒藥誤下而致者蓋亦甚少仲景所用諸溫熱之劑
何嘗每爲寒藥誤下而立况表熱裏寒之證亦何嘗每有
急解其表之文乎夫裏寒外熱之證乃是寒邪入客於
內迫陽於外或是虛陽之氣自作外熱之狀耳非真熱
邪所爲也觀仲景於裏寒外熱之證但以溫藥治裏寒
而不治外熱則知其所以爲治之意矣若果當急解其

表豈不於裏和之後明言之乎且三陰寒病既是雜病何故亦載於傷寒論以惑後人乎其厥陰病篇諸條之上又何故每以傷寒二字冠之乎夫內經所叙三陰病一於爲熱者言其常也仲景所叙三陰病兼乎寒熱者言其變也並行而不相悖耳後人謂傷寒本無寒證得非知常而不知變歟然世之恪守局方好用溫熱劑者乃反能每全於寒證無他其守彼雖偏治此則是學者能知三陰固有寒邪所爲之證則仲景創法之本意可以了然於心目之間而不爲他說所奪矣或曰傷寒之病必從陽經鬱熱而傳三陰今子謂直傷陰經卽入陰

經而爲寒證其何據乎予曰據夫仲景耳仲景曰病發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈夫謂之無熱惡寒則知其非陽經之鬱熱矣謂之發於陰則知其不從陽經傳至此矣謂之六日愈則知其不始太陽而止自陰經發病之日爲始數之矣仲景又曰傷寒一二日至四五日而厥者必發熱傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病爲進夫得傷寒未爲熱卽爲厥者豈亦由傳經入深之熱邪而致此乎今世人多有始得病時便見諸寒證而並無

或熱者此則直傷陰經卽入陰經者也苟不能究夫仲景之心但執凡傷於寒則爲病熱之語以爲治其不天

人天年者幾希矣
太陰病 腹滿 腹痛 黃

吐與利下三門並
附入少陰病蓋此

三門之病本屬太陰病因在少
陰者反多故從其多者附也

黃太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛者宜理中也陰經少有用桂枝湯者如此證若脉浮卽用桂枝湯微汗之若惡寒甚不已者非理中四逆不可也三陰俱有惡寒但喜厚衣卽惡寒也前證若下之必胸下結鞭又宜瀉心湯也雖然用瀉心者由誤下而致

非傳經熱邪也三陰雖皆有傳經熱邪故自有熱證與此陰證不同大宜詳究太陰經治法有汗下溫和解

汗 桂枝湯 桂枝加芍藥湯

下 桂枝加大黃湯

溫 四逆湯 理中湯

和解 梔子檗皮湯 茵陳五苓散

經云尺寸俱沉細者太陰受病也以其脉布胃中絡於噎故腹滿而噎乾今查太陰篇闕噎乾證 太陰之為

病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸

下結鞭成太陰為病陽邪傳裏也太陰之脉布胃中邪氣壅而為腹滿上不得降者嘔吐而食不下下

不得升者自利益甚時腹自痛陰寒在內而為腹痛者則為常痛此陽邪于裏雖痛而亦不常但或時腹自痛也若下之則陰邪留于胸下為結鞭
經曰病發於陰而反下之因作痞
自利不渴者屬

太陰 脈浮而緩手足自溫者繫在太陰 下後腹滿

時痛者屬太陰 太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯在

陽則脈浮無汗宜麻黃湯此脈浮當亦無汗而不言者謂陰不得有汗不必言也不用麻黃而用桂枝者以陰病不當更發其陽也須識無汗亦有用桂枝湯 本太陽病醫反下之因而腹

滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之太實痛者桂

枝加大黃湯主之邪氣入裏則為腹痛蓋氣傳裏而痛者其痛不常當以辛溫之劑和之陰

寒在內而痛者則痛無休止時欲作利也當以熱劑溫之有燥屎宿食為痛者則不大便腹滿而痛也則須下

之經曰諸痛為實痛隨利減

桂枝加芍藥湯方

桂枝

生薑

各參兩半

甘草

貳兩

芍藥

陸兩

大棗

拾貳枚

湯右五味以水七升煮取三升去滓分溫三服

桂枝加大黃湯方

桂枝

壹兩

芍藥

壹兩半

甘草

炙半兩

大黃

半兩大便實痛者加壹兩虛者照本方

大右咬咀大棗三枚生薑四片水煎溫服

張或謂太陰病用四逆輩固當然復用桂枝大黃夫

大黃至寒何為用之於陰經又兼桂枝大黃寒熱相