

蘭臺軌範卷六

吳江徐靈胎洄溪著

積聚癥瘕

靈素

靈百病始生篇。黃帝問於岐伯曰。夫百病之始生也。皆生於風雨寒暑清濕。喜怒不節。則傷臟風雨。則傷上。清濕則傷下。三部之氣。所傷異類。願聞其會。岐伯曰。三部之氣。各不同。或起於陰。或起於陽。讀其方。喜怒不節。則傷臟。臟傷。則病起於陰也。清濕襲虛。則病起於下。風雨襲虛。則病起於上。是為三部。至於其淫決。不可勝數。黃帝曰。積之始生。至其已成。奈何。岐伯曰。積之始生。得寒乃生。四字乃成。積之總訣。厥乃成。積也。黃帝曰。其成積奈何。岐伯曰。厥氣生。足惋。惋生脛寒。脛寒則血氣凝滯。血氣凝滯。則寒氣上入於腸胃。入於腸胃。則膜脹。膜脹。則腸外之汁沫。迫聚不得散。日以成積。卒然多飲食。則腸滿。起居不節。用力過度。則脈絡傷。陽絡傷。則血外溢。血外溢。則衄血。陰絡傷。則血內溢。血內溢。則後血。衄為陽經之血。宜涼。後為陰經之血。宜溫。腸胃之絡傷。則血溢於腸外。腸外有寒。汁與沫血相搏。則併合凝聚。不得散而積成矣。凡積未有不卒然。外中於寒。若內傷於憂怒。則氣上逆。氣上逆。則六輸不通。溫氣不行。凝血蘊裏而不散。津液滲著而不去。而積皆成矣。六元正紀大論。大積大聚不可犯也。衰其大半而止。過則死。骨空論。任脈為病。男子內結七。女子帶下。瘕聚。

息積。素論。帝曰。病脇下滿。氣逆。二三歲不已。是為何病。岐伯曰。病名曰息積。此不妨於食。不可灸。

刺積為導引服藥。藥不能獨活也。積聚宜外治。

伏梁。靈邪氣臟腑病形篇。心脈微緩。為伏梁在心下。上下行時唾血。素腹中論。帝曰。人有身體解脫。



蘭臺軌範卷六

吳江徐靈胎洄溪著

積聚癥瘕

靈素

靈百病始生篇。黃帝問於岐伯曰。夫百病之始生也。皆生於風雨寒暑清濕。喜怒不節。則傷臟風雨。則傷上。清濕則傷下。三部之氣。所傷異類。願聞其會。岐伯曰。三部之氣。各不同。或起於陰。或起於陽。讀其方。喜怒不節。則傷臟。臟傷。則病起於陰也。清濕襲虛。則病起於下。風雨襲虛。則病起於上。是為三部。至於其淫決。不可勝數。黃帝曰。積之始生。至其已成。奈何。岐伯曰。積之始生。得寒乃生。四字乃成。積之總訣。厥乃成。積也。黃帝曰。其成積奈何。岐伯曰。厥氣生。足惋。惋生脛寒。脛寒則血氣凝滯。血氣凝滯。則寒氣上入於腸胃。入於腸胃。則膜脹。膜脹。則腸外之汁沫。迫聚不得散。日以成積。卒然多飲食。則腸滿。起居不節。用力過度。則脈絡傷。陽絡傷。則血外溢。血外溢。則衄血。陰絡傷。則血內溢。血內溢。則後血。衄為陽經之血。宜涼。為陰經之血。宜溫。腸胃之絡傷。則血溢於腸外。腸外有寒。汁與沫血相搏。則併合凝聚。不得散而積成矣。凡積未有不卒然。因血而成者。卒然。外中於寒。若內傷於憂。怒則氣上逆。氣上逆。則六輸不通。溫氣不行。凝血蘊裏而不散。津液滲著而不去。而積皆成矣。六元正紀大論。大積大聚不可犯也。衰其大半而止。過則死。骨空論。任脈為病。男子內結七。女子帶下。瘕聚。

息積。素論。帝曰。病脇下滿。氣逆。二三歲不已。是為何病。岐伯曰。病名曰息積。此不妨於食。不可灸。

刺積為導引服藥。藥不能獨活也。積聚宜外治。

伏梁。靈邪氣臟腑病形篇。心脈微緩。為伏梁在心下。上下行時唾血。素腹中論。帝曰。人有身體解脫。



衝皆腫環臍而痛是為何病岐伯曰病名伏梁此風根也其氣溢於大腸而著於盲膏之原在臍下故環臍而痛也不可動之動之為水溺瀉之病

難經

病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五臟所生聚者六腑所成也積者陰氣也其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者陽氣也其始發無根本上下無所留止其痛無常處故以此別知積聚也五臟之積各有名乎以何月何日得之然肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下脾之積名曰痞氣在胃脘腹大如盤肺之積名曰息賁在右脇下覆大如杯腎之積名曰贋脉發於少腹上至心下若脉狀或上或下無時

金匱

師曰病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪此四部病皆從驚發得之師曰奔豚病從少腹起上衝咽喉發作欲死復還止皆從驚恐得之夫瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣必衝不衝心下則痞問曰病有積有聚有聚氣何謂也師曰積者臟病也終不移聚者腑病也發作有時展轉痛移為可治聚氣者脇下痛按之則愈復發為聚氣則無形而有形聚氣病者腹滿按之不痛為虛痛者為實可下之舌黃未下者下之黃自去腹滿時減復如故此為寒當與溫藥脈緊如轉索無常者有宿食也蕪不

病源

癥瘕皆由寒溫不調飲食不化與臟氣相搏結所生也其病不動者直名為癥若病雖有結癥而可推

移者。名為癥瘕。瘕者。假也。謂虛假可動也。

驚癥 謂腹內有癥結如驚之形狀。有食驚觸。令不消生癥者。有食諸雜物。得令不消。變化而作者。

蟲癥 人有多蟲而性好噉之。所噉既多。腑臟虛弱。不能消之。變化生癥。患者見蟲必噉之。不能禁正。時

從下部出。亦能斃人。

米癥 人有好啞米。轉久彌嗜。啞之若不得米。則胸中清水出。米不消化。遂生癥結。其人常思米。不能飲

食。久則斃。腹內有人穀。有人腹內忽有人穀。或學人語而相答。此乃不幸致生災變。非關經絡臟腑。令

熱虛壹所為也。服雷丸可愈

髮癥 有人因飲食內誤有頭髮。隨食成癥。胸喉間如有蟲上下來去者是也。

蛟龍病 三月八日。蛟龍子生在芥菜上。人食芥菜。入腹變成蛇龍。其病之狀。發則如癲。

魚癥 有人胃氣虛弱者。食生魚。因為冷氣所搏。不能消之。結成魚癥。揣之有形狀如魚也。

蛇癥 人有食蛇不消。因腹內生蛇癥也。亦有蛇之精液。誤入飲食內食之。其狀常若飢。而食則不下。喉

食至胸內即吐出。其病在腹。揣摸亦有蛇狀。謂蛇癥也。

酒癥 人有飲酒多而食穀少。積久漸瘦。遂常患酒。不得則吐。多睡不復能食。是胃中有蟲使之然。名為

酒癥也。

腹內有毛 人因飲食內誤有毛。隨食入腹。則漸漸羸瘦。但此病不說別有證狀。常自言食毛。因以知之。

積聚癥瘕方

奔豚湯

奔豚氣上衝胸腹痛。往來寒熱。此主之。

甘草

川芎

當歸 各二兩 半夏 四兩 黃芩 二兩 生薑 五兩 芍藥 二兩 生薑 四兩 甘草 根白皮 升



右九味以水二斗煮取五升温服一升日三夜一服

茯苓桂枝甘草大棗湯發汗後臍下悸者欲作奔豚此湯主之

桂枝四兩茯苓半斤甘草二兩大棗十五枚右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升納諸藥煮取

三升去滓温服一升日三服

桂枝加桂湯發汗後燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發奔豚小腹上至心尖其核上各一

壯與此湯此灸法不脩穴道亦甚易即桂枝加桂二兩

備急丸治寒氣冷食積留胃中心腹滿痛大便不通

大黃乾薑各二兩巴豆研如脂右先搗大黃乾薑為末納巴豆合搗千杵和蜜丸如豆大藏

密器中勿洩氣候用每服三四丸煖水或酒下又主中惡心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口噤如卒死

者捧頭起灌令下咽須臾當差不差更與三丸當腹中鳴即吐利便差苦口噤者須化從鼻孔用葶管

吹入自下於咽此温下之法口噤不能服藥者亦是一法

貧食食多不消心腹堅滿痛治之方千金

鹽一升水三升右二味煮令鹽消分三服當吐出食便差

蛟龍病方治春秋二時龍精帶入片米中入偶食之為病發時手背腹滿痛不可忍

硬糖升二三日兩度服之吐出如蜥蜴三五枚差

療犬肉傷金治食犬肉不消心下堅或腹脹口乾大渴心急發熱妄語如狂或洩下

杏仁一升合皮沸湯三升和汁分三服痢下肉片大驗

療食鱸傷金治鱸食之在心胸間不化吐復不出速下除之久成癥病



橘皮一兩大黃二兩朴硝二兩右三味以水一大升煮至小升頓服即消。

療鱸癥金治食鱸多不消結為癥病。

馬鞭草搗汁飲之或以薑葉汁飲之一升亦消。又可服藥吐之。

療蟲癥金由嚙蟲在腹生長為蟲癥。按此病發服水銀

故笮子一枚故梳子一枚右二味各破為兩分先取一分燒灰末之又取一分以漿五升煮取一

升頓服前未盡少時病出無所忌。

療十年瘰癧方千金

桃仁去皮尖雙仁煮熱豉乾泡去皮熬蜀椒去目閉口者乾薑搗篩右四味先搗桃仁如膏合搗藥杵如

乾可入少蜜和搗令可丸如酸棗大空腹酒服三九日三仍熨法。

椒熨方千金

取新盆一口受一斗者鑽底上作三十餘孔孔上布椒二合椒上布鹽鹽上安紙兩重上布冷灰一升冷灰上安熱灰一升熱灰上安熱炭火如雞子大常令盆熱底安薄檀其口以板蓋上以手捉勿令落仰卧安於腹上逐病上及痛處自捉遣移熨之冷氣及癥結皆從下部中作氣出七日一易椒鹽滿三七日百病差乃止。

破癰湯千金

白朮枳實炙柴胡各三兩右以水五升煮取二升分三服日三。

備急下癥方千金

吳茱萸三升以酒和煮熱布裏熨之。



廣濟療驚癰外

白馬尿一升溫服之令盡差

廣濟療米癰其疾常欲食米若不得米則胸中出清水

雞尿一升白米五合搗散用水一升頓服

療米癰羸瘦至死

葱白兩虎口烏梅枚三十右二味以水三升宿漬烏梅使得極濃清晨噉葱白隨飲烏梅汁盡頃之心

腹煩欲吐即令出之三晨療之當吐出米癰差無所忌

廣濟療髮癰人因食誤食髮即胸間如有蟲上下惟欲飲油油一斤以香澤煎之大銚鑄貯之安病

人頭邊以口鼻臨油上勿令得飲及傳之鼻面令有香氣當吐喚取飲不得與之必疲極眠睡其髮當

從口出飲油人專守視之并石灰一裹見癰出以灰粉手捉癰抽出須臾抽盡即是髮也奇法

積塊丸治癰瘕積聚癖塊蠱積

京三稜一錢莪朮醋炒辰砂辰砂沉香各八分冰片五分蘆薈天竺黃

雄豬胆汁丸如桐子大每服七八分諸蟲皆效治食索粉積方用紫蘇煎濃汁加杏仁泥服之即散

易簡紅丸破癰消瘕

蓬朮三稜橘皮青皮胡椒乾薑阿魏礬紅右水泛為丸每服

六十丸薑湯下又小兒脾胃之症極有神效

易簡紅丸破癰消瘕

易簡紅丸破癰消瘕



所有權版圖書

大七氣湯 治一切癥瘕

三稜

莪朮去壞 青皮

陳皮去白 木香

藿香

肉桂

益智仁

甘草五錢

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞食前服

半硫圓丸

除積冷溫脾胃一切瘕癖大便冷閉

硫黃

用明淨好者研令極細半夏湯洗七次

右等分以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入臼

內杵數百下丸如桐子大每服空心溫酒或生薑湯下十五丸至二十丸婦人醋湯下

髮癥飲油方

方奇

雄黃

半兩 右為末水調服之蟲自出

食癥成瘕方

猪脂二升酒三升

右以水煮三沸溫服日三

酒蟹氣蟹血蟹方

直指

治平時嗜酒血入於酒為酒蟹任氣血凝於氣為氣蟹虛勞錮冷敗血雜疾為

血蟹或附脇背或隱腸腹須急治之

生硫黃末

以老酒調下時時服之此味人多畏之不敢輕服其寔性甚和緩目

蛇癥方

金

白馬尾切細酒服初服五分一七次服三分一七更服二分一七不可頓服殺人

蛟龍病方

唐明皇雜錄云有黃門奉使交廣回太醫周顧曰此人腹中有蛟龍上驚問對曰臣馳馬大庾嶺熱困

且渴遂飲澗水竟腹中堅痞如石周遂以石硝雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲皆具

此病遂愈



蛇瘕施氏治面光發熱如火灸蒜汁一盞飲之吐出如蛇即愈

腹內蛇瘕方易簡

誤食菜中蛇精成蛇瘕或食蛇肉成瘕腹中常飢食物即吐以赤足蜈蚣一條炙研末酒服

血瘕方甄

驚甲

大黃

琥珀等分

右三味作散酒服二錢少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即

休服也

虱瘕

喜食血

用極舊木梳煨灰服

婦人狐瘕方外因月水來或悲或驚或逢疾風暴雨被濕致成狐瘕精神恍惚令人月水不通胸脇腰背

痛引陰中小便難嗜食欲吐如有孕狀其瘕手足成形者殺人未成者可治

用新鼠一枚以新絮裹之黃泥固住入地坑中桑薪燒其上日夜取出去絮入桂心末六銖為末酒

服方寸匕不過一二服當自下

瓜蒂散金

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

以上四方俱見傷寒

保和丸丹溪枳朮丸潔古皂礬平胃散

感應丸

上四方見通治

阿魏撞氣丸

方見蛇含石丸

丸即禹餘糧見臘服

蟲附狐惑

靈樞

上膈篇蟲為下膈

其詳備載膈症門

蟲瘕蛟虻

厥病篇腸中有蟲瘕及蛟虻皆不可取以小針心腸痛懷作痛腫聚往來上下行動有休止

腹熱喜渴涎出者是蛟虻也以手聚按而堅持之無令得移以大針刺之久持之蟲不動乃出針也



金匱

虻蟲之為病。令人吐涎心痛。發作有時。毒藥不止。虻厥者。當吐虻。令病者靜而復時煩。此為臟寒。虻上入膈。故煩。須臾復止。得食而嘔。又煩者。虻聞食臭出。其人當自吐。虻狐惑之為病。狀如傷寒。默默欲眠。目不得開。卧起不安。蝕於喉為惑。蝕於陰為狐。不欲飲食。惡聞食臭。其面目乍赤乍黑乍白。此皆傷寒餘毒所結。濕熱生蟲。

病源

九蟲者。一曰伏蟲。長四分。二曰蛇蟲。長一尺。三曰白蟲。長一寸。四曰肉蟲。狀如爛杏。五曰肺蟲。狀如蠶。六曰胃蟲。狀如蝦蟆。七曰弱蟲。狀如瓜瓣。八曰赤蟲。狀如生肉。九曰燒蟲。至細微。形如茅蟲。伏蟲。群蟲之生也。虻蟲貫心。則殺人。白蟲相生。子孫轉大。長至四五尺。亦能殺人。肉蟲令人煩滿。肺蟲令人咳嗽。胃蟲令人嘔逆。吐喜噦。弱蟲又名腸蟲。令人多唾。赤蟲令人腸鳴。燒蟲居腸。腸多則為痔。極則為癰。因人瘡處以生。諸癰疽癰痿病。亦齧蟲無所不為。人亦不必盡有。有亦不必盡多。或偏無者。此諸蟲依腸胃之間。若腑臟氣寔。則不為害。若虛則能侵蝕。隨其蟲之動而能變成諸患也。凡蟲毒有數種。皆是變感之氣。人有故造作之多。取蟲蛇之類。以器盛貯。任其自相噉擊。惟有一物獨在者。即為之蟲。便能變感。隨逐酒食。為人患禍。患禍於他。則蟲主吉利。所以不羈之徒。畜事之齒。是蟲食齒至斷。膿爛汁臭。如屯之收。故謂之齒患。

蟲方

甘草粉蜜湯。虻蟲之為病。令人吐涎心痛。發作有時。毒藥不止。此湯主之。

甘草二兩。粉一兩。蜜四兩。右以水三升。煮甘草取二升。去滓。納粉蜜攪令相煎。如薄粥。溫服一升。

瘥即止。

烏梅丸 治病者靜而時煩因臟寒虵上入其膈為虵厥當吐虵

烏梅^{三百個}黃連一斤黃柏六兩乾薑十兩附子^{六枚}蜀椒^{四兩}桂枝六兩細辛六兩人參^兩

當歸^{四兩}右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥

相得納白中與蜜杵二千下丸如梧桐子大先食飲服十丸日三服稍加至二十丸禁生冷滑物

療虵蟲攻心腹痛^針用石榴根搗取汁平旦服亦可水煎

療蟲蝕下部^針胡粉雄黃右二味各等分為末著穀道中亦治小兒

療傷寒患病^針取生雞子小頭空出白入漆一合熟和攪令極調當沫出更納著穀中仰吞之食頃

半日乃吐下蟲劇者再服蟲盡熱除病愈

追蟲丸^針治一切蟲積

黑牽牛^{取頭末}檳榔^{各八兩}雷丸^{醋炙}南木香^{各二兩}茵陳二兩大皂角苦楝皮^{各一兩}右煎濃汁

水為丸菜豆大大人每服四錢小兒二錢或二錢或一錢半量人虛實用砂糖水吞下待追去惡毒蟲

積二三次方以粥補之^{按濃煎汁水為丸原本如此必有誤字竟將水泛丸可也}

下蟲丸 追蟲取積

苦楝皮^{根皮為上樹面次之去面上粗皮}右為末麩糊丸彈子大如欲服藥宜戒午飯晡時預食油煎雞卵餅一

二個待上床時白滾湯化下一丸至五更取下異蟲為效

療寸白蟲

檳榔 蕪荑^{各等分}右為末每二錢溫酒調服先喫燒牛肉脯後服食水瀉永除

又方 榧子^{四十九粒去皮}以月上旬平旦空心服七枚日服盡蟲消成水永瘥又云食寔七枚七日滿蟲化為



水

療濕遷蟲千金

此症多是熱病後。或久下不止。或有客熱結在腹中。或遇暑濕涼氣者。多生此病。病亦

有燥遷不甚。洩痢而下部瘡瘍。不問燥濕。久則殺人。為病診齒無色。舌上盡白。甚者滿口有瘡。四肢沉

重喜眠。如此者。為蟲下食其肝。肝爛盡見五臟。即死矣。

黃連

生薑切 酪艾葉八兩苦參四兩

右四味。以水一升。煮取三升。為三服。日三。

療蛔蟲

病由勞熱傷心有蟲名蛔蟲。長一尺。貫心則死。

雷丸熬

橘皮

桃仁各五 狼牙六分 貫眾三枚 蕪荑

青箱子

乾漆各一分

殭蠶二十枚

右十味。搗篩蜜丸。以飲及酒空腹服二七丸。日再服。

療百蟲方外

石榴皮東引者一

檳榔七枚

右以水二升。煎減半。頓服。欲服時先嚼鹿脯咽汁。即進之。每月一二

三日。喫藥必瘥。以蟲頭向上。月三五以後不效。以蟲頭向下也。服藥前一日。莫食其蟲。喫藥之後。或痢

出。或內消皆瘥。忌食生膾白酒諸冷物一月餘。

鶴虱散外

療蛔蟲心痛

鶴虱二分末。溫酢一盞和服之。蟲當出。

胡粉丸外

療心痛不可忍。似蛔蟲者。

生胡麻一合

胡粉半合

右二味。先以猪肉脯一斤。空腹啖。咽汁勿咽肉。後取胡粉和胡麻。搜作丸。

以少清酒使成。頓服盡十歲以上。增減。忌生冷猪血魚雞蒜醋等七日。若是蛔蟲吐水者是也。

甘草瀉心湯金

治狐惑之為病。狀如傷寒。默默欲眠。目不閉。卧起不安。蝕於喉為惑。蝕於陰為狐。不欲

飲食。惡聞食臭。其面目乍赤。乍黑。乍白。蝕於上部。則聲啞。此湯主之。蝕於下部。則咽乾。苦參湯洗之。蝕



於肝者雄黃薰之

甘草四兩黃芩

人參

乾薑各三

黃連一兩

大棗十二

半夏半升

右七味水一

煮取

升去滓再煎溫服一升日三服

苦參湯

苦參一升水一斗煎取七升去滓薰洗日三

雄黃散

雄黃一味為末筒瓦二枚合之燒向肝薰之

赤小豆當歸散

病者脈數無熱微煩默默但欲卧汗出初得之三四日目赤如鳩眼七八日目四眦

黑若能食者膿已成也此湯主之

赤小豆

三升浸冷

當歸右二味杵為散漿水服方寸匕日三服

療心痛欲死

外濃搗地黃汁和麴作冷淘不用鹽服一頓蟲即出

蕪荑散

治蟲咬心痛欲驗之大痛不可忍或吐青黃綠水涎沫或吐蟲發有休止

蕪荑

雷丸

各半

乾漆碎研炒烟

右共為末每服三錢調和服

諸痛頭心胃

靈素

靈終始篇病痛者陰也痛而以手按之不得者陰也

素舉痛論視其五色黃赤為熱白為寒青黑為痛調經論寔者外堅充滿不可按之按之則痛虛者聶

辟氣不足按之則氣足以溫之故快然而不痛陰陽應象大論氣傷痛形氣腫故先痛而後腫者氣傷

形也先腫而後痛者形傷氣也痺論痛者寒氣多也有寒故痛也

頭痛



靈素

靈經脈篇。足太陽膀胱脈動。則病衝頭痛。目似脫。項如拔。脊痛腰似折。髀不可以曲。腦如結。頭如裂。脊脊為踝厥。督脈之別名曰長強。挾脊上項。散頭上下。當肩膊左右。別走太陽。入貫脊。寔則脊強。虛則頭重。足少陽膽脈。是主骨所生病者。頭痛領痛。厥病篇。真頭痛。頭痛甚。腦盡痛。手足寒至節。死不治。素奇病論。帝曰。人有病頭痛。以數歲不已。此安得之。名為何病。岐伯曰。當有所犯大寒。內至骨髓。髓者以腦為主。腦逆故令頭痛。齒亦痛。病名曰厥逆。

病源

萬痰風厥頭痛。風痰相結。上衝於頭。即令頭痛。數歲不已。即連腦痛。手足寒至節。即死。真頭痛。風亦

千金

卒頭痛。頭痛如破。非中冷。又非中風。是胸膈中痰。厥氣上衝。名為厥頭痛。吐之即差。

頭痛方

頭痛方。千金。薤子搗末。以湯淋取汁。洗頭良。又方。千金。吳茱萸三升。以水五升。煮取三升。以綿

拭髮根良。

厥頭痛吐方。外。治痰厥頭痛。

但單煮茗作飲。二三升許。須臾適吐。吐畢。又飲能如是。數過劇者。須吐膽汁。乃止。不損人。

石膏散。續。

川芎

石膏

白芷。各等分。

右為末。每服四錢。熱茶清調下。此治風火頭痛之方。

透頂散。本方。

治偏正頭風夾腦風。并一切頭風。不問遠年近日。



細辛三莖

公蒂七分丁香三粒糯米七粒腦子

麝香各一黑豆大

右將腦麝研細將前四味

細然後合研令勻封好患人在右左搖一大豆許良久出涎一升許即安

痛風餅子聖惠

五倍子

全蠍

土狗各八分

右為末醋丸作如錢大餅子發時再用醋潤透貼太陽穴上

熱貼之仍用帕子縛之服濃茶睡覺自愈

止痛太陽丹奇效

天南星

川芎等分

右為末同蓮鬚葱白搗爛作餅貼太陽痛處

氣攻頭痛方奇效

草麻子

乳香等分

右搗爛作餅貼太陽穴上如痛止急去頂上鮮開頭髮出氣即去藥

治頭痛方奇效

用大蒜一顆

去皮研取汁令病人仰臥以銅助點少許滴鼻中急令搖入腦眼中淚出差

玉液湯生

治眉稜骨痛

半夏六錢泡湯七次切片作一服加生薑十片水煎去渣納沉香木少許服

麝犀湯生

治暗頭風旋眼黑昏眩倦怠痰涎壅塞骨節疼痛

羚羊角屑

旋覆花

紫苑

石膏

甘草各一兩

細辛半兩前胡七錢犀角屑二錢

右藥每服三錢加生薑三片大棗一枚水煎服

秘方貼頭風熱病

大黃

朴硝等分

右為末用井底泥捏作餅貼兩太陽穴頭風皆屬寒此獨為熱不可不備



清震湯

治頭面疔瘡。憎寒拘急。發熱狀如傷寒。即雷

升麻

蒼朮各四錢 荷葉全者一個 水煎食後服。楊梅毒入頭亦有此病當用治毒之方治之

治頭內如蟲蛀響

此名天白蟻。用茶子末吹鼻中。此奇病不可不知

玉真圓

治腎氣不足。氣逆上行。頭痛不可忍。謂之腎厥。其脈舉之則弦。按之則石。堅。

硫黃

二兩 石膏煨通赤研半夏各一兩 硝石五錢

右為細末。研勻。生薑汁糊丸。如桐子大。性乾每服一

十丸。或薑湯。或米飲下。更灸關元穴百壯。

茶調散

治諸風上攻。頭目昏重。偏正頭痛。鼻塞身重。及婦人血風攻症。太陽穴疼。

白芷

甘草 羌活 獨活 荆芥 去梗 川芎各四錢 細辛去蘆防風半兩 薄荷葉不見火

每服二錢。食後茶清調下。常服清頭目。

頭風摩散

方見風門 頭風有偏正之殊。其病皆在少陽陽明之絡。以毫針刺痛處數穴立效。其外有瘡毒入頭名楊梅頭痛。此乃外科之症。另有治法。

心胃痛

靈樞

厥病篇。厥心痛。與背相控。善嘔。如從後觸其心。僂僂者。腎心痛也。厥心痛。痛如以錐鍼刺其心。心痛甚者。

脾心痛也。厥心痛。色蒼蒼如死狀。終日不得太息。肺心痛也。厥心痛。卧若徒居。心痛間動作痛。甚色不

變。肺心痛也。真心痛。手足清至節。心痛甚。旦發夕死。夕發旦死。

千金

胸痹令人心。中堅痞急痛。肌中苦痺絞痛。如刺不能俯仰。胸前皮皆痛。手不得犯。短氣咳唾引痛。咽塞痰

燥。時欲嘔吐煩悶。自汗出。或引背痛。不治數日死。

諸痛頭



外臺

九種心痛 一蟲 二注 三氣 四悸 五食 六飲 七冷 八熱 九去來痛

惡注心痛 中惡心痛 腹絞刺 奄奄欲絕 近人患心胃痛者甚多十人之中必有二三皆係痰飲

治法以滌飲降氣為主凡病竟有時代之不同如近三十年中咳嗽吐血者十人而五余少時此病絕少亦不可解也

心胃痛方

桔薑薤白白酒湯 胸痹之病 喘息咳唾 胃背痛 短氣 寸口脈沉而遲 關上小緊 數 此湯主之

桔薑 一枚 薤白 半斤 白酒 七升 右三味同煮取三升 分溫再服

桔薑薤半夏湯 胸痹不得卧 心痛徹背者 此湯主之 即前方加半夏半斤

枳實薤桂枝湯 胸痹心中痞 氣結在胸 胸滿脇下逆搶心 此湯主之 人參湯亦主之

枳實 四枚 厚朴 四兩 薤白 半斤 桂枝 一兩 桔薑 一枚 右五味以水五升 先煮枳實厚朴取二升去

渣納諸藥 煮數沸 分溫三服

人參湯 金匱中湯

茯苓杏仁甘草湯 胸痹胸中氣塞短氣 此湯主之 橘枳薑湯亦主之

茯苓 三兩 杏仁 五十枚 甘草 一兩 右三味以水一斗 煮取五升 溫服一升 日三 不差更服

橘皮枳實生薑湯

橘皮 一升 枳實 三兩 生薑 半斤 右三味以水五升 煮取二升 分溫再服

薤苳仁附子散 胸痹緩急者 此主之

薤苳仁 十五兩 大附子 十枚 右二味杵為散 服方寸匕 日三服



南京中醫藥大學圖書館藏