

傷寒證治準繩帙之五

金壇王肯堂輯

門人南昌張

緯校

合病併病汗下吐後等病

表裏合病必下利并太陽與陽明合病必自下利葛根湯主之不下利但嘔者葛根加半夏湯主之和太陽與少

陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑

湯主之陽明與少陽合病必下利脉滑而數者有宿

食也當下之宜大承氣湯

俱詳下利

併病二陽併病太陽出汗不徹因轉屬陽明自汗不惡

寒太陽證不罷面赤躁煩短氣者更發汗則愈二陽

併病太陽證罷潮熱譫語者下之則愈

論見
譫語

太陽與

少陽併病項強眩冒心下鞭如結曾者刺胃脘肝脘

強項

合併病

合病兩經俱病併則一經證罷而併歸于一經也太陽與陽明合病有三證其邪湊有淺深之殊故用藥有汗下和解之異治見各條三陽合病有二證其一證用白虎湯其一證無治法後人用小柴胡白虎之類蓋此二證俱有三陽之候故不可汗下二陽併病有二證表未解者汗之表已解有裏證者下之太陽與少陽併病有三證其一由誤下以致心下鞭成結胸其一項強如柔瘕狀心下鞭如結胸刺肺俞肝俞慎勿發汗汗則譫語不止宜刺期門其一心下鞭項強而眩者刺大椎肺俞

不宜下也

合病汗太陽與陽明合病胸滿而喘者不可下麻黃湯

太陽與陽明合病自下利葛根湯不下利但嘔者葛根

加半夏或曰由太陽表未罷而陽明裏又至兩陽合病熱甚于表乘虛漸攻于裏故下也其不下利而

嘔者邪氣雖攻裏未入于胃但氣逆而嘔故加半夏以止嘔逆羅氏曰外證必頭痛腰疼肌熱目疼鼻乾也

浮大太陽受病也長者陽明也頭暈太陽也肌曰鼻陽明也

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加

半夏湯或曰此表實裏虛熱入攻裏故自下利若兼痰飲則嘔也

陽明少陽合病必下利脉長者為順脉弦者為負負者

尅賊也脉滑而數者有宿食大承氣湯或曰陽明上少陽木其脉弦者

太乘土也不弦者不負也負者必死
若滑而數者有宿食非負也故宜下

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺尿

不可汗下若自汗者白虎湯 三陽合病脉浮大見關

上但欲眠目合則汗小柴胡白虎湯 或曰此二證俱有
三陽之證此不可

汗

併病 解肌 二陽併病太陽初得時汗之不徹轉屬陽明續自

微汗不惡寒大柴胡湯 若太陽證不罷不可下可小

發汗設面色緣緣正赤陽氣怫鬱在表汗之不徹其人

煩躁短氣不知痛處宜更發汗則愈葛根湯 二陽併

病太陽證罷潮熱手足汗大便難譫語者大承氣湯

太陽少陽併病反下之成結胃心下鞭下利不止水食
不下心煩生薑瀉心湯小陷胃湯 刺太陽與少陽併
強痛或眩冒時如結胸心下痞鞭刺大椎第一間肺俞
肝俞不可汗汗則譫語不止刺期門 太陽少陽併病
心下鞭項強而眩者刺大椎肺俞慎勿下

〔趙〕愚嘗疑合病併病之難明也久矣姑釋之蓋合病
者二陽經或三經同受病病之不傳者也併病者一
陽經先受病又過一經病之傳者也且如太陽陽明
併病一證若併而未盡是傳未過尚有表證仲景所
謂太陽證不罷面色赤陽氣怫鬱在表不得越煩躁

氣短是也猶當汗之以各半湯若併之已盡是謂傳
過仲景所謂太陽證罷潮熱手足汗出大便鞅而譫
語者是也法當下之以承氣湯是知傳則入府不傳
則不入府所以仲景論太陽陽明合病止出三證如
前太陽陽明併病則言其有傳變如此也又如陽經
互相合病皆自下利仲景於太陽陽明合病則主以
葛根湯太陽少陽合病主以黃芩湯少陽陽明合病
主以承氣湯至於太陽少陽併病其證頭項強痛眩
冒如結胸心下痞鞅當刺大椎肺俞肝俞不可汗下
太陽陽明併病已見上論但三陽合病仲景無背惡

寒語句雖別有口燥渴心煩背微惡寒者乃屬太陽證而非三陽合病也活人言三陽合病背惡寒者非也三陽若與三陰合病卽是兩感所以三陰無合病例也

張夫併者乃催併督併之義非吞併就之理然催併係去聲吞併之併乃上聲史記曰始皇初併天下卽此理也夫併之理乃前病未解後病已至有逼相併之義故曰併病也經曰太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒云云如果併作一家則仲景不具兩經之證而言也其非併字明矣

又曰或云三陽合病有太陽陽明有正陽陽明有少
陽陽明似乎重出予曰各有所指不過表裏之分耳
夫三陽合病在表三陽陽明病在裏事在兩途卽非
重出在表者宜解散以痊安在裏者非攻下則不可
然表裏證治迥各不同惟編目有似乎重出太陽病
發熱汗不解仍發熱心下悸振振欲墜真武湯
汗後身疼痛脉沉者桂枝加芍藥人參新加湯
太陽
發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢拘急難以屈伸
桂枝加附子湯
大汗出熱不去內拘急四肢疼下利

證而非三陽合病也活人言三陽合病背惡寒者非也三陽若與三陰合病卽是兩感所以三陰無合病例也

張氏併者乃僅併督併之義非吞併就之理然僅併
參乘稟蓋命國各不同卦融其下以爭重出天下即
重出五步宜繼端以奎定五稟清其文有恨不可
失三則合祿并未三則懸陽祿在稟籍亦兩致唱表
是則地以爭重出子曰各春類神不嚴乘稟交衣至
天曰范云三則各兩康六則則開育五則則開京必

發汗後不解

傷寒初感始以太陽故以發汗為首汗行如雨散雲收其病乃愈倘汗行不解者或表邪未盡或熱邪傳裏或邪氣乘虛內客故有汗後而不解者

發汗病不解反惡寒虛也芍藥甘草附子湯 太陽病

發熱汗不解仍發熱心下悸振振欲擗地真武湯 發

汗後身疼痛脉沉者桂枝加芍藥人參新加湯 太陽

發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢拘急難以屈伸

桂枝加附子湯 大汗出熱不去內拘急四肢疼下利

惡寒四逆湯 發汗過多冒心心下悸欲得按桂枝甘

傷寒汗後不愈
草湯

汗後腹脹滿厚朴生薑人參湯

太陽病發汗

後大汗出胃中乾燥不得眠欲飲水者少少與之則愈

若脉浮小便不利微熱消渴者五苓散 發汗已脉浮

數煩渴五苓散 服桂枝湯脉洪大與桂枝湯如前法

若形如瘡日再發汗出必解麻黃湯 發熱汗出不解

心中痞鞭嘔吐不和大柴胡湯 服桂枝湯大汗出大

煩渴不解脉洪大白虎加人參湯 發汗後臍下悸欲

作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯 發汗後不惡寒但惡

熱蒸蒸發熱者實也調胃承氣湯 發汗後不可更行

桂枝汗出而喘無大熱者麻黃杏仁甘草湯

下後不解

去傷寒之邪不過汗吐下之三法也三法得當病勢易衰則愈矣三法失宜病勢危惡傳變不已誠可慮也况發汗吐下後邪氣乘虛而未散或雍塞而未盡則當量其虛實以治之先賢謂知邪氣之虛實發汗吐下之不差溫補針艾之適當則萬全之功可得矣若過經者以六日傳六經七日為一候若不愈十三日乃再傳經盡所以謂之過經也

傷寒五六日大下後身熱不去心中結痛未欲解也梔子豉湯下後心煩腹滿卧起不安梔子厚朴湯 陽明

病下之心中懊憹而煩梔子豉湯若有燥屎者大承氣湯
太陽病下後脉促胸滿桂枝去芍藥湯微惡寒者
去芍藥方中加附子營以丸藥下之身熱不去微煩梔
子乾薑湯 太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促
者表未解喘而汗出者葛根黃連黃芩湯 服桂枝湯
或下之仍頭痛項強無汗衄翕發熱心下滿微痛小便
不利桂枝去桂加茯苓白朮湯 太陽病過經十餘日
二三下之嘔不止心中微煩大柴胡湯下之 六七日
犬下後寸脉沉而遲手足厥逆下利脉不至咽喉不利
吐膿血瀉利不止為難治麻黃升麻湯

汗吐下後不解

五六日已發汗復下胸脇滿微結小便不利渴而不嘔
但頭汗出往來寒熱心煩爲未解柴胡桂薑湯 太陽
汗吐下解後心下痞鞭噫氣不除者旋覆代赭石湯

太陽先發汗不解而復下之脈浮者則知病在外當須
解外桂枝湯 發汗若下之病仍不解煩躁不得眠茯

苓四逆湯 大汗若大利而厥者四逆湯 下後復發

汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沉
微身無大熱乾薑附子湯 下後復發汗必振寒脈微

細此內外俱虛也 傷寒本寒後復吐下之食入口卽

吐乾薑黃連黃芩人參湯 發汗吐下後虛煩不得眠
劇者反覆顛倒心中懊懣梔子豉湯 發汗若下之煩
熱胸中窒梔子豉湯 吐下後不大便五六日至十餘
日日晡發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀循衣摸床脉弦
者生濇者死但發熱譫語者大承氣湯 吐下後腹脹
滿邪熱入胃也調胃承氣湯 太陽吐下後微煩小便
數大便鞭小承氣湯 吐下後七八日不解結熱在裏
表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥煩欲飲水白虎加
人參湯 吐下後心下逆滿氣上衝胸頭眩脉沉緊發
汗則動經身為振搖茯苓桂枝白朮甘草湯