

黃帝內經

四

重廣補注黃帝內經素問卷第十

啓享次澐林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

瘧論

刺瘧篇

氣厥論

欬論

瘧論篇第三十五

新校正云按全元起本在第十五

黃帝問曰夫瘧瘧皆生於風其畜作有時者何也

瘧猶老也

亦瘦也新校正云按甲乙經云夫瘧疾皆生於風其以日作以時發何也與此文異太素同今文楊上善云瘧有云二日一發名瘧瘧此經但夏傷于暑至秋爲病或云瘧瘧或曰瘧不必以日發間日以定瘧也但應四時其形有異以爲瘧爾

歧伯對曰瘧之始發

也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓額標謂戰慄鼓謂振動要脊俱痛寒去則内外皆熱頭痛如破渴欲冷飲帝曰何氣

使然願聞其道歧伯曰陰陽上下交爭虛實更作陰

陽相移也

陽氣者下行極而上陰氣自上而下故曰陰陽上下交爭  
也陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒由此寒

去熱生川虛實更作  
陰陽之氣相移易也

陽并於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒

慄鼓頸也

陽並於陰言陽氣入於陰分也陽明胃脉也胃之脉自大承槩  
却分行循頭後下廉出大迎其支別者從大迎前大迎後故氣

不足則惡寒戰慄  
而頭顙振動也

巨陽虛則腰背頭項痛

巨陽者膀胱脉其脉從頭  
下項循肩骨內使背抵腰中

故氣不足則腰  
皆頭項痛也

三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛

寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱外

內皆熱則喘而渴故欲冷飲也

熱陽氣故內外  
皆熱則喘而渴

此皆得之

夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此榮氣

之所舍也

陽胃之外榮氣所主故云  
榮氣所舍也舍猶居也

此令人汗空踈

新校正云按全  
元起本作汗出

而上頭故  
病加果

刺手大指次指爪甲上去端如韭葉各一痛左

取右右取左如食頃已

謂商陽穴乎陽明之井也刺可入同身寸之  
一分留一呼若灸者可灸二壯新校正六

按甲乙經云商陽在乎大指  
大指內側去爪甲角如韭葉

邪客於臂掌之間不可得屈刺其  
新校正六按金元起太  
是人手之本節踝也

踝後

先以指按之痛乃刺之以月死  
生爲數月生一日一痛二日二痛十五日十五痛十六

日十四痛

隨日數也月半已前謂之生月  
半以後謂之死虧滿而異也

邪客於足陽蹻之脉

令人目痛從內此皆始

以其脉起於足上行至頭而循目內  
人目痛從內此皆始也何以明之八十一難經曰  
新校正六

陽蹻脉者起於跟中循外踝上行入風池  
竅屬目內貯合於太陽陽蹻而上行尋此則至於目內此皆也

刺外踝之下謂申脉之陽蹻之所生也在外踝下陷者中容爪甲刺  
可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯新校

半寸所各二痛

正云詳血脉痛注  
云外踝下五分

左刺右右刺左如行十里頃而已人有所

墮瘞惡血留內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上

傷厥陰之脉下傷少陰之絡刺足內踝之下然骨之

前血脉出血

此少陰之絡也新校正去詳血脉出血脉字疑是絡字

刺足跗上動脈

謂衛陽元胃之

原也刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可

灸三壯主腹大不嗜食之腹脹滿故爾取之

不已刺三毛上各一

痛見血立已左刺右右刺左

謂出大敦穴厥陰之井也

善悲驚不樂刺

如右方

善悲驚不樂亦如上法刺之

邪客於手陽明之絡令人耳聾時不

聞音

以其經支者從缺盆上頸貫頰又其絡支別者入耳會於宗脉故病令人耳聾時不聞聲

刺手大指次指爪

甲上去端如韭葉各一痛立聞

亦同前商陽穴

不已刺中指爪

甲上與肉交者立聞

謂中衝穴手心主之井也在手中指之端去不甲加韭葉者中刺可入同身寸之一分留三

呼若灸者可灸三壯古經脫簡無絡可尋之恐是刺小指甲上與肉交者也何以言之下文云手少陰絡會於耳中也若小指之端是謂少衝手少陰之井

至於風府腠理乃發發則邪氣入入則病作今衛氣  
日下一節其氣之發也不當風府其日作者柰何歧  
伯曰

新校正云按全元起本及甲乙經太素自此邪  
氣客於頭項至下則病作故八十八字並無

此邪氣客於頭

項循膂而下者也故虛實不同邪中異所則不得當

其風府也故邪中於頭項者氣至頭項而病中於背

者氣至背而病中於脊脊者氣至腰脊而病中於手

足者氣至手足而病

故下篇各以尾  
邪之所而刺之

衛氣之所在與邪氣

相合則病作故風無常府衛氣之所發必開其腠理

邪氣之所合則其府也

虛實不同邪中異所衛邪相合病則發焉不  
必悉當風府而發作也

新校正云按甲乙

經巢元方則其  
府也作其病作帝曰善夫風之與瘧也相似同類而風獨

常在瘡得有時而休者何也

風瘡皆有盛衰故不相似同類

歧伯曰

風氣留

其處故常在瘡氣隨經絡沈以內薄

新校正云據甲乙經作次以內傳

故

衛氣應乃作

留謂留止隨謂隨從

帝曰瘡先寒而後熱者何也

歧伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄

之水寒

新校正云據甲乙經太素水寒作小寒迫之暑為陽氣中風者陽氣受之故秋傷於風則病成矣

藏於腠理皮膚之中秋傷於風

則病成矣

夫寒者陰氣也風者陽氣

也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也病以時

作名曰寒瘡

或形力冒則風寒侵之故謂之溫

帝曰先熱而後寒者何也

歧伯曰此先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒也亦以時

作名曰溫瘡

或謂之溫

其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣

獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰癰瘡

摩熱也極熱爲之也

帝曰夫經言有餘者寫之不足者補之今熱爲有餘

寒爲不足夫瘡者之寒湯火不能溫也及其熱冰水

不能寒也此皆有餘不足之類當此之時良工不能

止必須其自衰乃刺之其故何也願聞其說

言何暇不早使其然極而

平止岐伯曰經言無刺熇熇之熱

新校生云按全元起本又太素熱作氣

無刺渾

渾之脉無刺灑灑之汗故爲其病逆未可治也

熇熇盛熱也渾

渾言汗杰出也夫瘡之始發也陽氣并於陰當是之時陽

虛而陰盛外無氣故先寒慄也陽氣并於陰當是之時陽

陽陽與陰復并於外則陰虛而陽實故先熱而渴

陰盛則渴

寒故先寒藏保陽益則  
胃熱故先熱欲飲也

夫瘡氣者并於陽則陽勝并於陰則

陰勝陰勝則寒陽勝則熱瘡者風寒之氣不常也病

極則復

復謂復舊也言其氣至

新校正云按甲乙經作瘡者風寒之異氣不

常病極則復至全元起本及太素作瘡風寒

氣也不常病極則復至至字連上有與王氏之意異

病之發也如火之熱空如風雨不可當

以其盛燃故不可當也

故經言曰方其盛時必毀

新校正云按大

事不易敢必毀

因其

衰也事必大昌此之謂也

方正也正盛寫之或傷真氣故必毀病氣衰已補其經氣則邪氣消退正氣安

平故必大昌也夫瘡之未發也陰未并陽陽未并陰因而調之

真氣得安邪氣乃亡

所寫必中所補必當故

又工不能治其

已發爲其氣逆也

真氣浸息邪氣大行

真不勝邪是爲逆也

帝曰善攻之柰何早

晏何如岐伯曰瘡之且發也陰陽之且移也必從四

未始也陽已傷陰從之故先其時堅束其處令邪氣不得入陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之此真往而未得开者也

言牢縛四支令氣各在其處則邪所居處必自見之既見之則

刺出其山爾往猶去也 新校正云 按甲乙經真往作其往太素作真往

帝曰瘡不發其應何如歧伯

曰瘡氣者必更盛更虛當氣之所在也病在陽則熱而脉躁在陰則寒而脉靜

陰靜陽躁故青脉亦隨之

極則陰陽俱衰衛

氣相離故病得休衛氣集則復病也

相薄至極物極則反 故極則陰陽俱衰

帝曰時有間二日或至數日發或渴或不渴其故何也歧

伯曰其間日者邪氣與衛氣客於六府而有時相失

不能相得故休數日乃作也

氣不相會故數日不能發也

瘡者陰陽更勝

或甚或不甚故或渴或不渴

陽勝陰甚則渴陽勝陰不甚則不渴也勝謂強盛於彼之氣也

白論言夏傷於暑秋必病瘡

新校正六按生氣通天論并陰陽應象大論二論俱云夏傷於

秋必今瘡不必應者何也

言不必皆然

歧伯曰此應四時者

其病異形者反四時也其以秋病者寒甚

秋氣清涼陽氣下降熱藏

因故以冬病者寒不甚

冬氣嚴冽陽氣伏藏不與寒爭故寒不甚

以春病者惡風

小溫和陽氣外泄也以夏病者多汗

夏氣暑熱津液充盈外泄故惡於風

帝曰夫病

瘡與寒瘡而皆安全匿於何藏

安何也全居正也藏謂五臟藏也

歧伯曰溫

至一有得之冬中於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣

之發邪氣不能自出因遇大暑脰骨燶肌肉消腠理

世或有所用力邪氣與汗皆出此病藏於腎其氣

先從內出之於外也

腎主於冬，冬主骨髓，腦為髓海上下相應，藏精氣，上熏心肺，下潤肝膽，氣外薄故肌肉減

削而病藏於腎也

如是者陰虛而陽盛，陽盛則熱矣

陰虛謂腎氣不足，陽盛謂膀胱

太陽氣盛

衰則氣復反入，入則陽虛，陽虛則寒矣。故先熱而

後寒，名曰溫瘡

瘡謂邪氣退，虛火反  
入謂入腎陰肺中

帝曰：瘡何如？歧伯曰：

瘡瘍者，肺素有熱，氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄，因有所用力，腠理開風，寒舍於皮膚之內，分肉之間，而發發則陽氣盛，陽氣盛而不衰，則病矣。其氣不及於陰。新校正云：抄全元起本及太素作不友之陰，宋元方作不及之陰。故但熱而不寒，氣內藏於心，而外舍於分肉之間，令人消爍，脫肉，故命曰

瘡瘍，帝曰：善。

刺瘡篇第三十六

新校正云按全元起本在第六卷

足太陽之瘡令人腰痛頭重寒從背起

足太陽脉從頸入絡腦還出別下項循肩臂內

腋脊抵腰中其支別者從髀內左右別下貫肺過脾膈故令腰痛頭重寒從背起

新校正云

按

三部九候論注

貫肺作貫

肺

甲乙

經作貫

肺

刺足少陽

俠谿主之伏谿在足小指次指攷骨間本節前陷者少陽之榮刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯

足陽

明之瘡令人先寒酒淅酒淅寒甚久乃熱熱去汗出

喜見日月光火氣乃快然

陽虛自外先寒陽虛極則復盛故寒甚久乃轉化熱去汗已全又內強則不勝

火氣乃快然也刺足陽明跗上

衛陽亦在足跗上同身寸之五寸骨間動脈上去陷名同身寸之三十陽明

之原刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯

足太陰之瘡令人不樂好大息

心氣流於肺

肺則喜今脾藏受病心母火之火氣下入於脾不行於肺又太陰脉支別者復從胃上鬲注心中故令人不樂好大息也

脾主化穀營助四旁令邪薄之諸藏元氣主寄曰季主則邪氣

寒熱汗出

交爭故不嗜食多寒熱而汗出新校正云按甲乙經云多寒

少病至則善嘔嘔已乃衰

足太陰脉入腹屬脾絡胃上鬲俠咽故病氣來至則嘔嘔已乃衰退也

即取

之待病衰去即而取之其言衰即取之井俞及公孫也公孫在足大指本節後之同身寸之二十太陰絡也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯足少陰之瘡令人嘔吐甚多寒熱熱多寒少渴入肺中循味

龍故嘔吐甚多寒熱也腎爲陰藏陰氣生寒令陰氣不足故熱多寒少

新校正云按甲乙經云嘔吐甚多寒少熱欲閉巨牖而處

其病難已

胃陽明脈病欲獨閉巨牖而處今謂胃土病證反見腎水之中

街中少陰絡也刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯也

新校正云按甲乙經云其病難已取太谿又按太鍾尤甲乙經作

踝後跟骨上動脉陷者中少陰俞也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可

灸三壯也

新校正云按甲乙經云其病難已取太谿又按太鍾尤甲乙經作

踝後跟骨上動脉陷者中少陰俞也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可

灸三壯也

新校正云按甲乙經云其病難已取太谿又按太鍾尤甲乙經作

街中諸症不同當

以甲乙經爲正

足厥陰之瘡令人腰痛少腹滿小便不利

如瘡狀非瘡也數便意恐懼氣不足腹中悒悒

足厥陰  
脉循股

陰入脛中環陰器抵少腹故病如是瘡謂不得小便也悒悒

不暢之貌

新校正云按甲乙經數便意三字作數噫三字刺足厥陰

在足大指本節後同身寸之二十指者中厥陰俞也刺可入同身寸之三分留

十呼若灸者可灸三壯也

新校正云按刺腰痛篇注云在本節後內闊動脉

應肺瘡者令人心寒寒甚熱熱間善驚驚如有所見者刺

手太陰陽明

列缺主之列缺在手腕後同身寸之一十半于人陰絡也刺可

入同身寸之三分留三呼若灸者可灸五壯陽明尤合谷主之

合谷在手大指次指歧骨間手陽明脉之所過也  
刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯

心

心瘡者令人煩心甚欲得清水反寒多不甚熱刺手少陰

神門

王之

神門在掌後

統骨之端陷者中手少

陰

俞

刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯

新校正云按太素云欲得清水反寒多寒不甚熱其也

蒼蒼然太息其狀若死者刺足厥陰見血山封土之中封  
在足內踝前同肝瘡者令人色

身寸之一寸半陷者中仰足而取之伸足乃得之足厥陰經也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯

商丘

土之

商丘

令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出刺足太陰商丘  
土之

商丘在足內踝下微前陷者中足太陰經也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯

腎

經

也

末

商丘

腰脊痛宛轉大便難目睭睭然手足寒刺足太陽少陰

太鍾主之取如前足少陰瘡中法下文兼刺太陰  
新校正云按太素且病作疽病

胃瘡者令人且病也善飢而不能食食而支滿腹大胃熱脾虛故善飢而不能食食而支滿腹大也是以刺足陽

# 明太陰橫脉出血

厲兌解谿三里主之厲兌在足太指次指之端去爪甲如韭葉陽明井也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸一壯解谿在衝陽後同身寸之三寸半腕上陷者中陽明經也刺可入

同身寸之五分留五呼若灸者可灸三壯三里在膝下同身寸之三寸骭骨外廉兩筋肉分間陽明合也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯然足陽明取此三穴足太陰刺其橫脉出血也橫脉謂足內踝前斜過大脉則大陰之經脉也新校正云詳解谿在衝陽後三寸半按甲乙經一寸半氣穴論注二寸半

# 瘡發身方熱刺跗上動

脉

陽明

脉也

陽明之脉多血多氣熱盛氣

出其血而立可寒也

瘡方

欲寒刺手陽明太陰足陽明太陰

亦謂開穴而出其血也

當隨井俞而刺之也

瘡脉滿大急刺皆俞用中鍼傍伍胠俞各一適肥瘦

出其血也

瘦者淺刺少出血肥者深刺多出

血皆俞謂大杼五胠俞謂謻譎

瘡脉小實急灸脰少

陰刺指井

灸脰少陰是謂復溜復溜在內踝上同身寸之二寸陷者中足少陰經也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸五壯州

指井謂刺至陰至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉足人陽井也刺可入同身寸之一分留五呼若灸者可灸三壯

瘡脉滿大急