



半椎肉瘤



南京中医药大学图书馆版权所有

串雅內編卷三

錢塘趙學敏恕軒纂

頂藥

巴霜頂丹溪喉閉丸

治纏喉風喉閉先胸膈氣緊驀然咽喉腫

痛手足厥冷氣不能通頃刻不治

雄黃

一錢

鬱金

五分

巴豆

七粒去殼皮

冰片

麝香

各少許

爲末

醋糊爲丸如麻子大清茶下五分口噤喉塞用竹管納藥入喉中須臾吐痰立解未吐再服

四寶頂

狗藥丸

丁丹崖祖師傳治噎膈翻胃

硫黃

水銀

各一錢同炒成金色

狗寶

三錢爲末

雞卵一枚去白留黃

和勻紙封



南京中医药大学图书馆版权所有

泥固塘火煨半日取出研細每服五分燒酒調下不過三

服效驗熟灰謂之糖煨

牛郎頂

牛郎丸

治氣築奔衝不可忍兼追蟲取積亦消水腫

黑牽牛

五錢炒

檳榔

一錢爲末

每服一錢紫蘇湯送下蟲積

及水腫用酒下

青綠項 治頑痰不化

石青

兩石綠

五錢並水飛爲末

麴糊丸

大溫湯下

十九丸去痰一二碗不損人

又方

風痰卒中用生綠

二兩

乳細水飛去石慢火熬乾取辰日

辰時辰位修合再研入麝香

一分糯米粉糊爲彈子大陰

乾每丸作二服卒中薄荷酒研下餘風硃砂酒化下吐出

青涎瀉下惡物大效小兒用銅錄研細醋麪糊丸交實大

每服薄荷酒化下一丸須臾吐痰如膠神效

流黃項 治腰痛如神

黑丑半生半炒取頭末水和丸梧桐子大硫黃爲衣空心

鹽酒送下五十丸

玉環來笑丹 治疝氣癩腫並諸氣腫痛

荔枝核

四十粒連白皮

陳皮

九錢硫黃

爲末鹽水打麪糊丸菜

豆大痛時空心酒服九丸良久再服不過三服神效

串雅內編

卷二

黑鹽丸

鹽

一升納入粗瓷瓶中實築泥頭初以塘火燒漸漸加炭
火勿令瓶破候赤徹鹽如水汁卽去火待凝破瓶取出

豉

一升熬煎

桃仁

一兩和炒熟

巴豆

二兩去心壓紙中令油出須生

熟得所熟

卽小力生又損人

人

四物

搗勻入蜜丸

桐子大

每服三丸

平旦時服

天行時氣

豉汁

及茶送下

心痛酒

送下人口便止

血痢米飲下

初變水痢後便止

鬼瘧茶飲下

骨蒸蜜湯下

凡服藥後吐利勿

怪吐利

若多服黃連汁止之

或遇殺藥人藥久不動者更

服一兩

丸服後忌口

三二日其藥臘月合之

瓷瓶蜜封勿

令泄氣

一劑可救百人

或在道途村落無藥可求但用此

藥卽敵大黃朴硝數兩曾用有效

小兒女子不可服被攬

作也

輕粉頂 治小兒涎喘

無雄雞子一箇取清人輕粉一分拌和銀器盛置湯瓶上
蒸熟三歲兒食盡當吐痰或泄而愈實者乃不用

羊莢頂 治骨蒸傳口

羊肉一拳大煮熟另用阜莢一箇炙以無灰酒二升銅鑄
內煮三五沸去渣入黑鉛一兩令病人先啜肉汁乃服一
合當吐蟲如馬尾爲效

截瘧頂 治三日大瘧

活大烏龜一箇連殼左右肩上各鑽一孔近尾處亦鑽一

孔以明雄黃九錢研細每孔繆入三錢外以瓷器黃泥包
固勿令泄氣炭火上煅存性研細每服準一錢空心陳酒
送下二三服卽止

又方

陳香櫟一枚去頂皮大者加明雄黃三錢中者二錢小者
一錢研細繆入香櫟內炭火中煅存性再研極細末每服
七分用腐衣分作六七包乾咽下此日不可飲湯水任其
嘔去頑痰卽愈

三奇項 治小兒天哮神效

經霜天燭子 蠟梅花各三錢 水蜒蝣一條俱預收 水煎服一劑

卽愈

金線頂 凡一切要吐痰涎之症用代瓜蒂最妙

金線重樓

俗名金線弔蝦蔓
采得去外黑皮

用石槌打碎勿犯鐵器晒乾

爲末小瓷瓶收貯用之治風痰結胸取一錢陰陽水和服

吐去痰卽愈傷食成瘧臨發時空心水和服一錢卽愈噤

口痢疾涼水和服一錢卽愈

砒霜頂 治哮須三年後可用

精豬肉

三十兩切作骰子塊信石一兩

研細末拌在肉上令

勻用紙筋黃泥包之候乾白炭火於無人處煅青烟出盡

爲度研細以湯浸蒸餅丸如菉豆大食前茶湯送下大人

二十九 小兒四五丸量虛實與之

又方 駒喘痰積凡天雨便發坐臥不得飲食不進乃胎藪久積冷痰遇陰氣觸動則發也用此一服卽愈服至七八次卽出惡痰數升藥性亦隨而出卽斷根矣

江西淡豆豉一兩蒸搗如泥入砒末一錢枯礬三錢丸茲

豆大淡用冷茶冷水送下七丸甚者九丸小兒五丸卽高

枕仰臥忌食熱物等

阜礬頂 稀涎散 凡人卒然中風昏昏如醉形體 不收或倒或

不倒或口角流涎俄頃不治便成大病此證風涎潮於上

胸脾氣不通用此吐之

昆角末一兩

生礬末

膩粉

各五錢

水調下一錢過咽卽吐

涎用礬者膈下涎也

碧霞丹

凡中風痰厥癲癇驚風痰涎上壅牙關緊閉上視

搐搦並宜主之

烏頭尖

附子尖

全蝎稍

各七十箇

石綠

研幾度過十兩

飛爲細末

麪糊丸芡實大每用一丸薄荷汁半盞化下更服溫酒半合須臾吐出痰涎爲妙小兒驚癇加白僵蠶等分

吐蟲人頭面上有光他人手近之如火熾者此中蠱也

蒜汁半兩和酒服之當吐出如蛇

瓜蒂散治痰涎頭目濕氣皮膚水痘濕熱諸症

瓜蒂 赤小豆 各二錢 炒黃爲末每用一錢以香豉一合

各二錢

炒黃爲末每用一錢以香豉一合

熱湯七合煮糜去渣和服少少加之快吐乃止

又方 風癇喉風咳嗽及遍身風疹急中涎潮等症不拘大

小此藥不大吐逆只出涎水

瓜蒂爲末壯年服一錢老少減半早晨井水下一食頃含沙糖一塊良久涎如水出年深者出黑涎有塊布水上也涎盡食粥一兩日如吐多人困甚取麝香泡湯一盞飲之卽止 凡宜吐之症必須看痰吐在壁上有亮光者放心吐之餘則皆忌光亮者如蠅牛之涎一樣光亮也但看見光亮者無論其痰上中下皆宜吐之此光亮之色必須俟其痰跡乾而分辨之不可據其濕痰時而卽以爲光亮也

倒頑痰法 治痰結胃中不能吐出狂言如見鬼狀時發時

止氣塞胸腔

牛肉五斤水二斗煎湯飲之至不可食而止以鷺翎探吐必吐至黃色頑痰而止前病頓失後以陳皮茯苓甘草白朮湯徐徐飲之平復如故

陰陽湯 治凡在上焦欲吐而不能吐者

滾水涼水各一碗均之加炒鹽一撮打百餘下起泡飲之立吐而愈

串藥

牛郎串丹 遇仙

治邪熱上攻痰涎壅滯翻胃吐食十膈五噎

呴哈酒積蟲積血積氣塊諸般痞積瘡熱腫痛或大小便不利婦人女子面色瘦黃鬼產癥瘕食吞銅鐵銀物患皆治之五更冷茶送下三錢天明可看去後之物此藥有疾去疾有蟲去蟲不傷元氣臟腑小兒減半孕婦忌服白牽牛頭末四兩五錢半生半炒白檳榔一兩茴陳蓬術醋煮三稜同牙阜去皮炙各五錢右共爲末醋糊爲丸如菜豆大依前數服行後隨以溫粥補之忌食他物

榔霜串必勝散

治遠年近日大麻風症癩瘡二服卽愈

大黃 白牽牛 檳榔各五錢 粉霜五分 各爲細末分作三服用生薑四兩 紹汁入沙糖半盞水調勻於晚臨睡腹中

稍空臥牀上服之至三更遍身手足俱麻木如針刺頭木齒縫俱痛此藥等病之功取下二便或青或白或黑或黃或紅蟲之類此乃病根也二十日內服三次漸痊眉毛鬚髮俱生肌膚如舊或齒縫出血漱齒藥列於後

漱齒藥

貫仲

黃連

各五錢

爲末用水一鍾煎四五沸入冰片少許

攪勻漱口每日一服煎漱忌動風油膩之物一月愈

黃甲串

偷刀散

治橫痃便毒未成者內消已成者膿從大便

下

生大黃

穿山甲

煅存性

白芷

各二錢

爲末每服三錢空心酒

送下

巴豆串 治痢疾

蒼术

取堅白者米泔水浸一宿去毛皮

厚朴

薑汁炒

陳皮

各二十兩蓬术

王穀

歸身

各六兩

枳殼

木通

各八兩

土黃連

一兩

木香

天竺

黃錢

各五兩

用陳米

一斗

入巴豆

四百九十粒

同炒黃色爲度去巴豆不用其前藥爲末和勻每服一錢或二錢三錢視病之輕重空心午後晚每日三服紅色甘草湯下白色薑湯下紅白相兼甘草薑湯下水瀉米湯下氣滯木香湯下噤口人參白朮湯下忌生冷油膩滑腸之物茶水並忌之無極丸 治男女諸病婦人經血不通赤白帶下崩漏不止

腸風下血五淋產後積血癥瘕腹痛男子五勞七傷小兒
骨蒸潮熱其效如神宜六癸日合

大黃一斤作四分一分用童便一碗入食鹽二錢浸一
切晒二分用醃酒一碗浸一日切晒再以巴豆仁三十五
粒同炒豆黃去豆不用一分用紅花四兩泡水一碗浸一
日切晒一分用當歸四兩入淡醋一碗浸一日去當歸切
晒共爲末煉蜜丸桐子大每服五十丸空心溫酒下取下
惡物爲驗未下再服

備急丸 治心腹諸疾卒暴百病

大黃 巴豆 乾薑各一兩 捣篩煉蜜搗和丸小豆大每服

三丸凡中客忤心腹脹滿痛如鑽刺氣急口噤卒死以暖水或酒服之或灌之未知更服三丸腹中鳴轉以吐下便愈若口已噤者灌下卽瘥

烏龍串

一粒金丹又名捉虎丹

專治風寒暑濕腳氣不問遠年近日

一切走注疼痛不可忍臨發時空心服一丸趕到足面上赤腫痛不散再服一丸趕至脚心出黑汗乃除根如病在上食後臨臥酒送下自然汗出定痛爲驗中風癱瘓麻痺不仁手足不能屈伸偏枯酒下一丸初中風不省人事牙關不開研一丸酒調灌下亦驗

草烏臍

去皮

地龍

去土淨

木鼈子

去油

五靈脂

白膠香

研各一兩

研各一錢

研各一錢