

新刻太醫院發刻醫家必究杏苑生春卷之六

太醫院史 紹庄 徐文元 發刻

醫正 活溪 芮 經 彙集

秣陵後學 文麓 紀夢德 次編

太醫院醫官雲林 龔廷賢 校正

金陵書坊 蔣氏 石渠閣 梓

○眩暈

眩暈。是卒然之間。眼目昏花。如屋旋轉。或眼黑耳聾。目閉身轉。如立舟船之上。起則欲倒。不可一途而取。執也得之風者。脉浮有汗。寒者脉緊。掣痛。暑者脉虛煩悶。濕者脉細重滯。此四氣乘虛而眩暈也。得之七情鬱而生痰。痰以動火。隨氣上厥。此七情

攻虛而眩暈也。淫慾過度。腎家不能納氣。歸元使諸氣逆奔而
上。此氣虛之眩暈也。吐衄崩漏。肝家不能收攝榮氣。使諸血失
道妄行。此血虛之眩暈也。又有勞役致使氣虛而眩暈者。有大
吐大下。金瘡去血。致血氣皆虛而眩暈者。有濕痰而眩暈者。有
痰因火動而眩暈者。此症雖有數種。皆不越乎痰挾虛而然。又
有氣鬱生涎。多令人眉稜角痛。眼不可開。寸脉多沉。治法須詳
致病之因。随机應敵。其間以升降鎮墜爲最。不可妄施汗下。有
眼掉。此非虛。乃風熱也。經曰。諸風掉眩。皆屬肝木。各當求其所
因。施治而審焉。

○脉症通明

左手脉數多熱。濇而芤有芤血。右手脉實有痰積。脉虛大必是
久病。左手人迎脉緩而浮大者。屬風。

夫眩暈之症。大抵有內外虛實不同。是治法亦有虛實之異。其
內因者。乃七情所傷。如前論氣虛血虛陰虛之類。乃有餘
之病。治法宜瀉。不宜補。欲知其詳。當辨其症。如氣虛其脉
當見濡弱弦微。其症或精神短少。無力以動。如血虛者。其
脉當見芤濇細少。其症或大便燥結。或不華色。但陰虛者
其脉當見浮數。其症或燥。燥喘。或形槁。敗如感風。則脉浮
有汗。項強不仁。如感寒。則脉緊而無汗。筋掣掣痛。如暑。則
脉虛煩悶。如濕。則脉緩沉重吐逆。

痰火眩暈者。以天麻二陳湯加黃芩主之。

方天麻二陳湯

防風

白朮

茯苓

川芎

各一錢

橘紅

半夏

各一錢五分

白芷

五分天麻

六分

甘草

三分

右吹咀。用生薑五片。水煎熟。食後溫服。

風熱眩暈者。以川芎茶調散主之。方見五卷內。

痰厥眩暈者。以半夏天麻湯主之。方見四卷內。

七情氣鬱眩暈者。以香橘飲主之。

方香橘飲

木香 白朮 各八分 半夏 橘紅 各一錢

茯苓 八分 縮砂仁 七枚 丁香 甘草 各四分

右咬咀。用生薑五片。水煎熟。食遠服。

感寒眩暈。以附子理中湯治之。方見四卷內。

風痰眩暈。以川芎甘菊散主之。方見五卷內。

治冒雨或中濕眩暈。嘔逆頭重。食以芎朮等之類。

方芎朮湯

川芎

半夏

茯苓

各一錢

白朮

二錢

甘草

炙五分

生薑

五片

右咬咀水煎熟食遠溫服。

〔方〕夫血過多眩暈不甦宜用六合湯。

〔方〕六合湯

羌活

秦艽

白芍藥

防風

各一錢

當歸

川芎

熟地黃

各一錢五分

右咬咀水煎熟食前服。

〔病〕風寒在腦或感邪濕頭眩重痛欲倒嘔逆不定以芎辛之類

治之。

〔方〕芎辛湯

川芎

一錢五分

細辛

白朮

各一錢

甘草

五分

茶芽

少許

生薑

五片

右咬咀水煎熟食後溫服。

痰涎壅盛頭眩惡心以天麻二陳湯主之

方見本卷前

治勞役所傷元氣太虛而眩暈者以補中益氣湯治之

方見三卷內

病房事恣情致精元氣耗眩暈欲倒以十全大補湯

方見三卷內

此腎虛頭暈以六味地黃丸每料加鹿茸五錢以固腎氣

也

方見五卷內

中暑眩暈煩渴欲嘔以十味香薷散主之

方見三卷內

痰熱客于上焦多能昏眩以前胡人參散

方見五卷內

眩暈得近火熱或熱手按之而定者此陽虛也以附子理中湯

治之

方見四卷內

風痰上厥眩暈以白附子丸主之

方見三卷內

眼掉。此風熱也。以川芎茶調散主之。

方見五卷內。

○眼目

諸脉者皆屬於目。目得血而能視。然五臟六腑精氣於上。主於目。而爲之精。精之窠爲眼。骨之精爲瞳子。筋之精爲黑眼。血之精爲絡。其窠氣之精爲白眼。肌肉之精則爲約束。裹頰筋骨血氣之精而與脉并爲系。上屬於腦。後出項中。故邪中於項。因逢其身之虛。其入深。卽隨眼系入於腦。則腦轉。腦轉則引目系急。目系急則目眩以轉矣。邪中其精。其精所中。不相比也。則精散。精散則視岐。故見兩物。目者五臟六腑之精。榮衛魂魄之所常營。神氣之所主也。故神勞則魂魄散。志意亂。是故瞳子黑眼法。於陰。白眼赤脉發於陽。陰陽合傳而爲精明。天精明者。所以視萬物。別白黑也。目者心之使。心者神之合。故神精亂而不轉。卒

然見非常之處。精神魂魄散不相得。故曰惑也。蓋十二經脉三百六十五絡。其血氣皆上走於面。而走空竅。陽氣上散於目。而爲精。其氣走於耳而爲聽。因心事煩冗。飲食失節。勞役過度。致脾虛弱。心火太盛。則百脉沸騰。血脉逆行。邪害空竅。則日月不明。然五臟六腑之精氣皆稟受於脾。上貫於目。脾者諸陰之首也。目者血脉之宗也。故脾虛則五臟之精氣皆失所司。不能歸明於目矣。心者君火也。主人之神。宜靜而安。相火化行其令。相火者經絡也。主百脉皆榮於目。既勞役運動。勢乃妄行。又因邪氣所并。而損脾脉。故目諸病生焉。凡醫者不理脾胃。反養血安神。乃治標不治本。是不明正理也。蓋眼目屬肝經。全藉血以爲宮。精以爲輔。若非靜心保養。精血何由而生。或爲怒動其火。或因血虛。或因精衰。有生紅睛。有生白翳。有迎風多淚。有惡目羞。

明者因血衰過傷酒毒。重衣火炕。熱畜所致。治法暴赤者。清志
洗肝。血虛者。滋陰養血。怒火者。鎮伏肝邪。翳障者。養肝去翳。多
淚者。瀉肝經之大熱。羞明者。補陰血以涼心。又有久病氣虛。或
飲食勞役而昏花者。宜當補助元氣。恣情縱慾。傷損精血。而昏
暗者。以滋益腎陰。使精血克滋。自然明矣。瞳子散大於黃精。視
物無的。以小爲大。以長爲短。卒然見非常之處。行步踏空。視物
不真。此血虛精衰也。患此症者。靜心息慮。戒酒遠色。韭蒜葱薤
并煎燒熱物。損胃藥餌。皆當禁忌。若用苦寒之藥。必須酒炒。又
有雀目眼。遇夜不見。此疾難醫。恨眼爲一身之要。豈可輕忽。

○眼目脉法

左寸脉洪數。心火炎也。關脉數而洪。肝火盛也。

右寸關俱弦洪。乃肝木挾相火之勢而來。侮所不勝之金。制已

杏苑生春 卷之六
五
所勝之土也

○眼目法則

目者肝之外候。乃臟腑之精華。爲宗脉之所聚。其白精屬肺金。肉輪屬脾土。赤脉屬心火。黑珠屬肝木。神光屬腎水。其病一出于火。如白珠變赤。火乘肺也。肉輪赤腫。火乘脾也。黑珠腫瘴。火乘肝也。赤脉貫睛。心火自盛。神光腫痛。火乘腎也。治療之法。在藥則宜鹹酸之劑。或吐之下之。在鍼則宜神庭。上星。額會。前項。百會。諸穴以刺之。雖然。尤當詳其各經氣血多少。施治。

○如目內眦並目之上綱俱屬太陽。其經血多氣少。

○如目銳眦屬少陽。其經氣多血少。

○如目之下綱並目兩旁交額之中。俱屬陽明。其經氣血俱多。

○如連目之系屬厥陰其經少氣多血是以凡血盛之經爲患者則大宜針刺

○如血少之經勿刺大宜苦寒之劑涼血瀉火爲主

○又河間謂在腑屬表當驅風散熱在臟屬裡宜養血安神

○如暴火眼昏澁眵膜淚班入眼皆風熱也乃肝氣盛而發在標宜表散以去之

○如暴赤障宜防風黃芩爲君以瀉火黃連當歸爲臣以養血稍加羌活柴胡升麻白芷甘草之類以爲佐使如白睛疼加白荳蔻少許

凡目病有四曰風熱曰神疲曰血少曰腎虛

○如因風熱者宜以辛涼之劑散之

○如血少宜以四物湯之類主之

○如神疲者宜以補中益氣湯之類主之

○如腎虛者宜以滋陰補腎之類主之

○如能遠視不能近視者乃火盛水虧法當補腎加味地黃丸

○如能近視不能遠視乃水火虧法當補心宜定志丸之類蓋

火虧者乃心血不足也水虧者乃腎水不足也

治肝經不足內受風熱上攻眼目視物不明常見黑花當風有淚隱澁難開或生翳障時行暴赤以明日流氣飲主之

方明目流氣飲

大黃蒸 牛蒡子 川芎 甘菊花 白蒺藜 防風

山梔仁 黃芩 荊芥 木賊 草決明各五分

細辛 玄參 蔓荊子 甘草炙各三分 蒼朮米泔浸五分

右咬咀水一鍾半酒半鍾煎熟臨臥熱服

治風毒上攻暴赤腫痛隱澁眵淚以洗肝散主之。

方洗肝散

薄荷

當歸

羌活

防風

川芎

各一錢

甘草

五分

大黃

煨五分

山梔仁

六分

右咬咀水煎熟食後服。

治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明以密蒙花之類。

方密蒙花散

密蒙花

疾梨

木賊

石決明

羌活

甘菊花

各等分

右依法製度爲末每服二錢茶清調服。

倒睫拳毛以防風飲子。

方防風飲子

防風

乾葛

各五分

蔓荊子

細辛

各三分

當歸身

七分五厘

甘草

炙

黃連

各一錢

人參

一錢

右咬咀水煎熟食遠溫服。

病肝經蘊熱上攻眼目赤腫羞明多淚以蟬蛻等之類。

方蟬蛻散

穀精草

甘菊花

蟬蛻

羌活

甘草

蒺藜

草決明

防風

山梔子

川芎

密蒙花

荊芥

黃芩

蔓荊子

木賊

右件各等分依法製度爲細末每服二錢茶調或荊芥湯食

後溫服。

病勞役飲食不節致心火不得休息而生內障以蔓荊子湯或

內障升麻湯治之

[方]蔓荊子湯

蔓荊子

白芍藥

各五分

黃芪

人參

各一錢半

甘草

六分

黃蘗

七分酒浸并炒四次

右咬咀水煎熟臨臥時食遠溫服

[方]內障升麻湯

乾生薑

三分

五味子

甘草

炙各四分

白茯苓

防風

柴胡

各五分

白芍藥

當歸身

人參

白朮

升麻

各一錢

羌活

葛根

各八分

黃芪

一錢

右咬咀先水三鍾煎二鍾再加黃連各少許食遠溫服

病眼發後上熱白睛紅多生眵淚無疼痛而隱澁難開昏花不

明以助陽和血之劑。

方助陽和血湯

防風 一錢

黃芪 一錢五分

蔓荊子

當歸身

甘草

炙各五分

白芷

四分

升麻

柴胡

各二分

右咬咀水煎熟臨臥時溫服。

治眼赤暴發作雲翳疼痛以龍胆四物湯

方龍胆四物湯

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

羌活

各一錢

防風

防己

各五分

黃連

酒浸一宿三分

龍胆草

酒浸

一宿五分

右咬咀水二鍾煎一鍾食遠溫服。

病眼久昏疼或視物不清惡日羞明以涼血明目之劑。

方涼血明目湯

熟地黃 一錢五分

羌活

防風 各六分

甘菊花

山梔子 炒

穀精草

柴胡 各五分

木賊 四分

甘草 三分

川芎

當歸 各一錢

白芍 八分

如有淚加川椒 炒十粒

紅熱者加黃連 酒浸五分

龍胆草 酒浸三分

右咬咀水煎熟食前溫服。

眼中白翳以當歸龍胆之類。

方當歸龍胆湯

防風

石膏

黃連

黃蘗

黃芩

甘草

柴胡

羌活

五味子

升麻

當歸身

黃芪

龍胆草

白芍藥