

金匱要略
刑

卷五



張仲景金匱要略論註卷十五

擣李徐 彬忠可甫著 門人吳元培元夫父較

黃疸病脉證并治第十五論二首 脉證十四條 方七首

寸口脉浮而緩。浮則爲風。緩則爲痺。痺非中風。四肢苦煩。脾色必黃。瘀熱以行。

註曰此總言黃疸。初時由風兼挾寒濕。後則變熱也。其先辨之寸口脉若浮而緩。浮緩亦專主風然。浮風也。自黃者言之。緩則挾濕。故曰。瘧濕熱相蒸。

脾色必黃
不獨四肢

故脾鬱則
頑先見四肢而黃隨之也

而肌痺也。內經曰風寒濕合而爲痺，則風不足以
槩病。故曰痺非中風，然熱爲病情。風爲病因，風熱
乃陽邪。陽邪入陽，四肢爲諸陽之本。邪入而苦煩
煩者，風熱也。四肢又屬脾，脾屬土，土色黃，故曰脾
色必黃。見疸病所因，雖不同，必內傷于脾也。然至
于黃，則熱反不堅結于內，故曰瘀熱以行。此言黃
疸之病，槩由熱鬱而外蒸也。

論曰：仲景首揭黃疸之脉，主之以風，而推及于痺。
是明言黃疸之病，風寒濕兼有之矣。故後言風寒



相搏。又曰黃家所得從濕得之。然觀其後所出。雖有穀疸。女勞疸。酒疸。正黃疸之別。未嘗專于治風。專于治寒。專于治濕。唯清熱開鬱而爲肺。爲胃爲脾。爲腎。分因用藥。絕不兼補。豈非治黃疸法以清熱開鬱爲主。雖亦有汗下之說。而破氣與溫補大汗及大下。皆非所宜乎。

趺陽脉緊而數。數則爲熱。熱則消穀。緊則爲寒。食卽爲滿。尺脉浮爲傷腎。趺陽脉緊爲傷脾。風寒相搏。食穀卽眩。穀氣不消。胃中苦濁。濁氣下流。小便不通。陰

被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸

註曰此段言穀疸病脉證相因之理也謂肌肉者

脾胃所主黃則由脾胃有傷趺陽者脾胃主脈也

故責之若緊而數數爲熱熱故消穀挾緊是本寒

而標熱矣本先受寒寒則爲滿言穀雖易消而時

滿也此雖胃病然腎爲胃關其使胃不能消穀則

腎必先傷故龍火不能上升腐熟五穀于是推原

于寸口之浮浮在尺則傷腎又趺陽脉見緊則傷

脾脾腎俱傷則風寒相搏脾不能輸精于肝肺而

病氣隨經。上注于目。故食卽眩。千金方連旋轉。言
脾既不能輸精而上干。其穀氣自然不消。于是胃
中清陽之氣不升。而苦濁小便者。氣化所從。因升
降廢。而濁氣下流。小便無氣以化。反有鬱熱相干。
漸乃不通。若是者何也。臟陰被寒之傷。而客熱流
入膀胱也。膀胱爲太陽。統一身肌表之陽。寒熱相
鬱。則一身盡黃矣。此雖病本風寒。傷兼脾胃。假使
穀氣消。則正足以勝邪。今不消。而胃濁。胃濁而致
黃。是穀非致黃之因而實主黃之媒也。故曰穀疸。



以別于病黃疸而與穀不相妨者耳。

額上黑微汗出手足中熱薄暮卽發膀胱急小便自利名曰女勞疸腹如水狀不治。

註曰此言黃雖必由于脾傷而致傷之原有因醫者其證必額上黑蓋額者心之部也腎邪重則水勝火黑爲水色而見于火部矣手勞宮屬心足湧泉屬腎腎虛而水火不相濟則然中者槩言手足也人之呼吸晝行陽二十五度夜行陰二十五度一日五十度周于身而日暮則交於酉酉主腎因



原有虛熱衛氣并之卽發于手足而熱矣膀胱之腑也。腎臟陰虛則外腑自急然雖急而水出原非熱流膀胱之比故小便不礙而自利後妄勞方下尚有日晡發熱反惡寒少腹滿身盡黃等證而皆不列要知發熱惡寒腹滿身黃他證可有此則腎病所獨異也故見此數證名女勞疸謂房事過當而致女勞也然腹如水狀則脾精不守先後天俱絕故不治

心中悶懨而熱不能食時欲吐名曰酒疸

註曰此言黃雖脾色有因于酒者酒多濕而性陽故傷在上焦心爲濕熱所困則熱而慟懥不安熱氣病冒邪不穀疸則不能食食不化而氣上逆則時欲吐後註穀疸條下亦有心胸不安句然此數證皆不因食穀後發故知爲酒疸

此言陽明病之夾寒者能無犯濕微有不
同其辨全在脉

陽明病脈遲者食難用飽飽則發煩頭眩小便必難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也註曰此言穀疸有偏于寒者謂穀疸本陽明府病假如人有病陽明而身熱汗出不惡寒或腹實不

大便脉不宜遲而遲。遲則胃虛寒。鬱胃病故稍
食而不堪飽。飽則不運。故火聚而發煩濕。執于
而頭眩濁氣下流而爲小便難。然此乃陰被其寒。
寒勝熱。熱未流于膀胱而有漸致之勢。故曰欲作
穀疸本非胃實。故下之腹滿如故。假令胃不虛寒。
水穀自化。疸何由成。故曰所以然者脉遲故也。
夫病酒黃疸必小便不利。其候心中熱足下熱。是其
靖高似證也。酒黃疸者或無熱。靖恐是清字言了了。腹滿欲吐。
鼻燥其脈浮者先吐之。沉弦者先下之。酒疸心中

靖高似證
有誤候參

熱欲吐者吐之愈。酒疸下之久久爲黑疸目青面
黑心中如瞰蒜虀狀大便正黑皮膚爪之不仁其脈
浮弱雖黑微黃故知之

註曰酒性熱屬陽上焦先受之故前註酒疸以懊
憊而熱不能食時欲吐爲的證然其相因爲病者
不止于上也水出高原豈有上焦濕熱旣甚而小
便反利者故曰必小便不利心中固熱而足下者
腎之部也濕熱下溜則腎受之亦足下熱故曰是
其證也但從心中熱來是不得等于穀疸小便



不通女勞疸之足下熱耳。然酒疸變證亦有熱
去于心而無熱且清言了了其邪竟注于陽明而
腹滿欲吐鼻燥者邪苟近上脉必浮宜吐之邪苟
近下脉必沉弦宜下之蓋治陽明唯有吐下兩法
也曰先者倘有未盡之病再消息也。然酒疸心
中熱方惡其結熱不行假使欲吐正熱邪欲出之
機故曰吐之愈。又酒疸有因誤下而變證襍出
如女勞疸者但心中與脉及黑色中之黃必微有
辨故曰酒疸下之久久爲黑疸謂酒本傷上脉未

及沉是下未熟也誤下而陽明病邪從支別入少陰則積漸而腎傷傷則爲黑疸乙癸同源故肝亦病而目青腎氣上乘而面黑然其心中仍如敝羸蘪狀則下雖病而酒熱未除也大便正黑腎邪乘土也皮膚不仁土傷則痺也但腎邪雖盛正氣實虛故脉浮弱若是則竟類女勞疸何以辨其爲酒疸謂雖脾傷而黃又誤下傷腎然實因酒而脉終浮則黑色中必不如真女勞而微黃曰雖黑微黃故知之示人以微細之辨也

師曰病黃疸發熱煩喘胸滿口燥者以病發時火劫其汗兩熱所得然黃家所得從濕得之一身盡發熱而黃肚熱熱在裏當下之

註曰此除穀疸女勞疸酒疸槩言黃疸有因誤火得之者又辨其從濕得之者爲黃疸之常熱在裏者爲熱黃之變以使人分別論治也謂黃疸病雖不必專在上焦乃有發熱而煩喘胸滿口燥熱燥俱在上焦者此以表病無汗火劫其汗寒變之熱火劫之熱兩相并則氣鬱故肌肉不堪而黃然燥

火不能遽使人黃也。凡黃必因濕鬱故。又槩言黃家所得從濕得之。謂火不與濕。并不能作黃耳。假令一身盡發熱而黃。又見肚熱。是發熱似表而肚熱則裏證多矣。故又言熱在裏。當下之謂不得先攻其上焦之火熱也。

脉沉渴欲飲水。小便不利者。皆發黃。腹滿舌痿。黃燥不得睡。屬黃家。舌癥。筋作身痿

註曰。此言黃疸病有先見一二標證而可以必其爲黃疸者。謂沉陰脉也。乃有脉得沉而反渴。便不

利非熱鬱而何。熱鬱焉得不發黃。腹滿裏證也。
乃有腹滿而加身瘦黃躁不得睡瘀熱外行此
黃之漸也。故曰屬黃家見當圖治于將成不得俟
既成而後藥之也。

黃疸之病當以十八日爲期治之十日以上瘥反劇
爲難治。

註曰此言黃疸若旣成則其病由淺而深當速治。
故謂黃疸之病過三候而氣一變五日爲一候十
五日爲一氣若十五日又加三日則爲十八日一



氣有餘未滿四候愈則竟愈故曰爲期否則根漸深而難拔故曰治之十日以上瘡言至十日外必宜瘥不瘥而劇則又不若初治之可取必矣故曰難治

疽而渴者其疽難治疽而不渴者其疽可治發于陰部其人必嘔陽部其人振寒而發熱也

註曰治黃疽內外陰陽之辨最爲艱繫故特指出渴嘔寒熱以別之謂疽色黃齶熱外蒸之象渴則內熱更甚內外交病故難治不渴則熱從外宣內