

徐靈胎醫書三十二種



古方集解

吳江徐大椿靈胎著

古吳潘蔚增輯

天王補心丹道藏 治心血不足神志不寧津液枯竭健忘怔忡大便不利口舌生瘡等證

人參 白茯苓 元參 桔梗 遠志錢各五 當歸 五味子 麥冬 天冬 丹參 酸棗仁 各

生地兩四 柏子仁兩一

右為末煉蜜丸如椒目大白湯下此養心一方有石菖蒲四錢無五味子一方有甘草川連

柯韻伯曰心者主火而所以主者神也神衰則火為患故補心者必清其火而神始安補心丹用生地

有仁猶心有神也清氣無如相子仁補血無如酸棗仁其神存耳參苓之甘以補心氣五味之酸以養心氣二冬之寒以清氣分之火心氣和而神自歸矣當歸之甘以生心血玄參之鹹以補心血丹參之寒以清血中之火心血足而神自藏矣更假桔梗為舟楫遠志為向导和諸藥入心而安神明以此養生則壽何有健忘怔忡津液乾涸舌上生瘡大便不利之虞哉

導赤散錢氏 治心熱口糜舌瘡小便黃赤莖中作痛熱淋不利

生地 木通 甘草梢各等分

右三味水煎服此瀉心火從小腸中出也

季楚重曰經云兩精相搏謂之神是神也者待心中之真液腎中之真氣以養者也故心液下交而火

也錢氏制此方意在制兩丁之火必先助乙癸之治生地黃涼本而能補真入下焦集清邪火是治標以固本實心火並降尤慮肝木妄行能生火助邪通心火之鬱是一治兩得者也瀉心湯用黃連即所以瀉心火之實邪毒木之有餘瀉子以清母也導赤用地黃所以治虛邪虛邪責水不足壯水以制火也此方涼而能補較之用苦寒伐胃傷其生氣者遠矣

王孟英曰本方去甘草加黃芩蜜丸名火府丹亦治心熱渴溢淋濁等證本方加生蘇黃連丹皮各升蘇清胃湯輕清涼血乃秦皇透化斑疹之良劑

當歸補血湯

鑑

治男婦血虛似白虎證肥熱面赤煩渴引飲脈來洪大而虛重按則微

當歸二錢

黃耆一兩

右二味水煎服

此補表血之方

吳鶴臯曰

血實則身熱血虛則身涼

黃耆則味甘補氣者也

當歸熟地各三錢

右四味水煎服

張路玉曰

行氣莫如坎離丸之證

生無形之氣所當急固也

長之功誠者是言也然余嘗謂此湯傷寒大和解毒後熱留於血分至夜微熱不得補氣或合柴胡或加桂枝

玉屏風散

防風黃耆白朮各等分或

左為細末酒調服

柯韻伯曰

學者自來和氣之所謂

惟急為和氣之所謂

川芎五分

白芍二錢

酒炒

白芍二錢

酒炒

酒炒

酒炒

酒炒

酒炒

酒炒

酒炒

酒炒

酒炒

酒炒

酒炒

酒炒

酒炒

酒炒



北京中医药大学图书馆藏

土。即以望風也。夫以防風之善。驅風得黃。黃以固表。則外有所衛。得白朮以固裏。則內有所據。風邪去而風復來。此欲散風邪者。當倚如屏。珍如玉也。其自汗不止者。亦以微邪在表。皮毛肌肉之不同耳。其無防方。懸殊矣。

道遙散方。治肝家血虛火旺。頭痛目眩。頰赤口苦。倦怠煩渴。抑鬱不樂。兩肋作痛。寒熱。小腹重墜。婦人經水不調。脈弦大而虛。

芍藥酒 當歸 白朮 炒 茯苓 甘草炙 柴胡各二錢

趙羽皇曰

本方加丹皮。梔子。即加味逍遙散。加煨薑三片。薄荷少許。煎服。此疎肝五臟苦欲補濕。云肝苦急。食以甘緩之。蓋肝惟急。善怒。其氣上行。則胸膈痛。而下行。則鬱。鬱則火動。而諸病生矣。故發於上。則頭眩耳鳴。而或為目赤。發於中。則胸膈痛。而或為肝鬱。肝鬱之氣。滯於下。則兩肋作痛。寒熱。小腹重墜。婦人經水不調。脈弦大而虛。此肝家血虛火旺之證。所以鬱者。其說有二。一為土虛不能於外。則寒熱。一為血少。則木無水潤。而遂以枯。枯則一以厥陰報使。一以升發。諸病生矣。此方以丹皮解熱於中。草梔清火於下。獨柴胡一味。以厥陰報使。一以升發。諸病生矣。此方以丹皮解熱於中。草梔清火於下。獨柴胡一味。以厥陰報使。一以升發。諸病生矣。

唐容川曰

此治肝經血虛火旺。鬱鬱不樂。方用白朮。茯苓。助土德。以升木。當歸。白芍。益榮血。以養肝。薄加丹皮。山梔。清肝熱。甘草。緩中。柴姜。升發。木鬱則達之。遂其曲直之性。故名之曰逍遙。如火甚。血不和者。之血。即是治肝之血。瀉心色之。火即為肝之火。以子母同氣。故也。

平胃散 治濕淫於內。脾胃不能剋制。有積飲痞膈中滿者。 蒼朮 五斤 米泔 陳皮 白朮 厚朴 各三斤 甘草 三十

右為末。每服二錢。薑湯下。日三服。或水煎。每服五錢。如小便赤澀。加茯苓澤瀉。米穀不化。飲食傷多。加枳殼。胃中氣不快。心下痞氣。加枳殼木香。心下痞悶。腹脹者。加厚朴。甘草減半。遇夏加炒黃芩。

遇雨水濕潤時。加茯苓澤瀉。如有痰涎。加半夏陳皮。咳嗽飲食減少。脈細。加當歸黃耆。脈洪大緩。加黃芩黃連。大便硬。加大黃三錢。芒硝三錢。先嚼麩炒桃仁爛。以藥送下。本方加皂莢。即皂莢平胃丸。



消食積
蟲病

柯韻伯曰

涼劑而使之內經以土運太過平胃散其病腹滿及卑監其病留滿張仲景製三承湯用土
之土宜白朮以溫非用溫後製平胃散其病腹滿及卑監其病留滿張仲景製三承湯用土
不若甘發汗濕以健脾之用以脾濕燥土不致卑其病腹滿及卑監其病留滿張仲景製三承湯用土
以其生於脾因濕氣不與夫氣行耳不以健運卑監其病留滿張仲景製三承湯用土
為之使氣故曰平胃助脾氣不與夫氣行耳不以健運卑監其病留滿張仲景製三承湯用土
為當久服不白思而實消痰氣不與夫氣行耳不以健運卑監其病留滿張仲景製三承湯用土

張景岳曰

五苓散

澤瀉一分
豬苓一分
白朮一分

右五味為末白飲服方寸匕日三服多飲水汗出愈

程郊倩曰

五苓散

趙羽皇曰

五苓散

五苓散

五苓散

五苓散

五苓散

而東垣平胃散有滯有濕有積者宜為耳此方主之以此作湯往近人效
治瘦人臍下有悸吐涎沫而癰眩此水也此方主之以此作湯往近人效

白朮分三桂皮分二

白朮分三桂皮分二

白朮分三桂皮分二

白朮分三桂皮分二

白朮分三桂皮分二

白朮分三桂皮分二

白朮分三桂皮分二

白朮分三桂皮分二

白朮分三桂皮分二

白朮分三桂皮分二



燭經曰：平以溫之是也。行水則土自燥，非半夏之辛燥也。或曰：有痰而渴，宜去半夏，代以貝母、吳鶴、犀、白、湯而喜飲者，易之不能飲水，雖渴宜半夏也。此濕為木熱為標，所謂濕極而兼勝已之化，非真象也。東南之妙劑，其於上下左右無所不宜，然止能治痰之標，不能治痰之本。痰本在脾，在脾在腎治者詳之。

枳實丸 治痞積消食強胃

心口堅大如盤

東垣曰

白木主甘溫，其苦味除胃中之濕熱，其甘溫補脾散之元氣。多於枳實，一變其法，成此。以煨飯和藥，與木協力，滋養穀氣而補脾胃。其利大矣。若用食藥下之，傳變諸症，不可勝數。以生白木，東垣此

附錄金匱枳實湯

治心下鞭大如盤，邊如旋杯，水飲所作。

枳實 白木

右二味以水五升煮取三升，分溫三服，腹中脹即如故。

以德曰

胃下消，胃上脹也。胃氣弱，則所飲之水不消，痞結而堅。必強其之劑，唯脾氣不清而滯，勝者宜之。若脾氣已虛，非所宜也。今以為補脾之藥，及小兒瘦

張景岳曰

弱製令常服，適足傷其氣助其疲耳。

藿香正氣

治外受四時不正之氣，內停飲食，頭痛寒熱，或霍亂吐泄，或作瘧疾。

厚朴 陳皮

桔梗 半夏

甘草

大腹皮

白芷

茯苓

蘇葉

藿香

右十味加薑棗水煎熱服，此方可



吳鶴草白

病在太陽與此益陳腹不之氣由鼻而入不在表而在裏故不用大汗以解表但用芬香利氣之品主之。蘇
平胃散加半夏藿香丸凡受山嵐瘴氣及出遠方不氣本虛土吐瀉下利者主之。蓋平胃散可以平濕土而
消胃名曰正氣謂能正不正之氣耳。

大順散方

治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分霍亂嘔吐臟腑不調。

甘草

對三十斤長

乾薑

杏仁

共去皮

肉桂

各四斤

右先將甘草用白砂糖炒及八分黃熟次入乾薑同炒令薑裂次入杏仁又同炒候不作聲為度篩

王安道曰

之症非治暑也又甘草多於諸藥八倍亦非法此等病百不得一偶用之早而製藥四十二斤又暑天
服二錢其意何居其方本不足取而後之庸醫竟以此治燥火之暑病殺人之無算故錄此以證其非
若以之治靜而得之之證吾恐不能解而反增內煩也世俗不明類曰夏月陰氣在內此等方為必用之
藥乎陰果為寒何

殊砂安神丸

方東垣

治心神昏亂驚悸怔忡寤寐不安

殊砂

研另

黃連

各半

生地黃

錢三

當歸

甘草

各二錢

左為細末酒泡蒸餅丸如麻子大殊砂為衣每服三十丸卧時津液下

葉仲堅曰

之體赤連通心經曰神氣含心精神必具又曰心者生之本神之舍也且心為君主之官主不明則精氣亂
熱配黃連之苦寒能鎮心火而更佐安黃之寒以瀉之陰火之浮遊以養上焦之元氣為安神第一品心苦
心熱解則肝得其所藏也

人參瀉肺湯

治肺經積熱上喘胸膈脹滿痰多大便澀



人參 黃芩 梔子 枳殼 薄荷 甘草 連翹 杏仁 桑皮 大黃 桔梗 右水煎服

主又原曰

肺經云邪之所湊其氣必虛又肺為嬌藏其不堪破耗也明矣自肺熱傷肺之說行曰保肺可補
然於肺氣之不行而不可耗也若肺氣少則用和之肺體清而古法天清肺滿司降令為一傷外感為熱急喘滿人參要入胸中
肺之能運而不息也若肺氣少則用和之肺體清而古法天清肺滿司降令為一傷外感為熱急喘滿人參要入胸中
參保肺移熱大行而不可耗也若肺氣少則用和之肺體清而古法天清肺滿司降令為一傷外感為熱急喘滿人參要入胸中
為枯硬利氣之或施子黃芩連翹和得諸藥以俱出而肺氣不隨諸藥以俱出也然則人參亦何常傷肺之邪
畏而用也

三黃湯

治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食

麻黃

獨活 細辛 黃耆 黃芩

右五味以水六升煮取二升分溫三服一服小汗二服大汗心熱加大黃二分腹滿加枳實一枚氣

逆加人參三分悸加牡蠣三分渴加栝蒌根三分先有寒加附子一枚

陳元犀曰

此治風中太少通陰陽驅邪之方也足太陰屬脾主四肢手足拘急惡寒經日不欲飲食

控涎丹

方三因 又用細辛獨活入腎穿筋骨以散腎邪此主治之大意也

甘遂

大戟 白芥子

右為末煮糊丸桐子大曬乾臥時淡薑湯或熱湯下五七丸至十九丸

王晉三曰

控引也涎讀作美酒涎也水流貌引三焦之水涵涎流出於水道也芥子色白入肺而達上

伏苓甘草湯

傷寒厥而心下悸者宜先治水當服此湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也

伏苓甘草湯 傷寒厥而心下悸者宜先治水當服此湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也



尤在涇曰

大黃廣九居以大黃從胃路中宣發潤燥佐以黃芩清肺衛杏仁潤心藥桃仁補肝生

氣之義却寬舒胃

桂枝麻黃各半湯

治傷寒向愈脈微緩惡寒身癢

桂枝一兩十六絀芍藥酒生薑切甘草炙麻黃各一兩

右七味

以水五升先煮麻黃一二沸去上沫納諸藥煮取一升八合去滓溫服六合令微汗則愈

柯韻伯曰

蓋八日來前太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒多汗桂二面有赤色者陽氣拂鬱在表不得汗出

柯韻伯曰

入麻黃一合不再作氣已當汗止此法未解身不可瘧狀發熱惡寒多汗桂二面有赤色者陽氣拂鬱在表不得汗出

葛根黃芩黃連湯

治太陽證誤下利遂不止喘而汗出者此主之

葛根半斤甘草炙黃芩各二兩黃連二兩

右四味

以水八升先煮葛根減二升入諸藥煮取二升去滓分溫再服

柯韻伯曰

反太陽病外症未解而反下之遂協熱而利心下痞滿者用桂枝下人參湯本桂枝利醫

柯韻伯曰

反太陽病外症未解而反下之遂協熱而利心下痞滿者用桂枝下人參湯本桂枝利醫

柯韻伯曰

反太陽病外症未解而反下之遂協熱而利心下痞滿者用桂枝下人參湯本桂枝利醫

柯韻伯曰

反太陽病外症未解而反下之遂協熱而利心下痞滿者用桂枝下人參湯本桂枝利醫

大黃 四兩

厚朴 半斤 去皮炙

枳實 五枚 炙

芒硝 三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓納大黃煮取二升去滓納芒硝更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿服

小承氣湯

治汗多微發熱不惡寒或小便數而大便鞭譏語者與此湯微和胃氣

大黃 四兩

厚朴 二兩 去皮炙

枳實 三枚 炙

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

柯韻伯曰

諸病皆因於氣穢物之不去由於氣之不順也故攻積之劑必用氣分之藥因以承氣名湯

喻嘉言曰

金匱治痼疾為病胸滿口噤者死腰折痼痼也蓋所云即不省痛即腰折之變大承氣湯乃死裏求生之法也靈樞

斷齒加以胸滿口噤者死腰折痼痼也蓋所云即不省痛即腰折之變大承氣湯乃死裏求生之法也靈樞
亡即所謂胸滿口噤者死腰折痼痼也蓋所云即不省痛即腰折之變大承氣湯乃死裏求生之法也靈樞
得生者多矣下之尚不足甚治臨症酌而用之初非定法也既有下之重傷其陰之大戒復有下之急救其
陰之法法學欲
為深造端在此矣

調胃承氣湯

治胃氣不和。不惡寒。但熱。腹微滿而煩。與此湯。

大黃 四兩 去皮

甘草 二兩 炙

芒硝 半斤

右三味以水三升先煮大黃甘草取一升去滓納芒硝更上火微煮令沸少少溫服外邪已盡

方可下此仲

柯韻伯曰

此治太陽陽明併病之和劑也因其人平素胃氣有餘故太陽病三日其經未盡即欲再作太陽



熱不惡寒。已外見此不得就太陽禁下之一說。坐視津液之枯燥也。少與此劑以調之。但得胃氣一和。必自汗而解。是與針足陽明同義。而用法則有在經在府之別矣。不用氣藥而亦名承氣者。調胃即所以承氣也。經曰。平人胃滿則腸虛。腸滿則胃虛。更虛更實。故氣得上下。今氣之不承。由胃家之實熱。必用硝黃以調胃。家之糟粕而氣得以下。同甘草以生胃家之津液。而氣得以上。今無燥屎。便云未堅硬者。可用不補。調胃之法。備矣。胃調則諸氣皆順。故亦得承氣。因氣名之前輩見條中無燥屎。便云未堅硬者。可用不煎服。有法度。粗工不審。故芒硝分兩多。於大承氣。因氣名之前輩見條中無燥屎。便云未堅硬者。可用不銑。而欲其味之留中。以濡潤胃府。而存津液也。所云太陽病未罷者。不可下。又與若欲下之。宜調胃承氣是於清大。中益氣調胃用甘草。是於攻實中處虛。

大陽胸丸 治病發於陽而反下之。熱入因作結胸。病發於陰而反下之。因作痞。所以成結胸者。以下之太早故也。

大黃 斤半 **葶藶子** 熬 **芒硝** 杏仁 去皮尖熬 黑各半升

右四味 搗篩二味。納杏仁芒硝。合研如脂。和散。取如彈丸一枚。別搗甘遂末一錢匕。白蜜二合。水二升。煮取一升。溫頓服之。一宿乃下。如不下更服。取下為效。


柯韻伯曰 胸中者宗氣之所出。故名氣海。氣為陽。故為一陽之部。氣為水。母。氣清則水精。四布。氣熱則水濁。而壅結矣。水結於胸。則津液不下。無以潤腸胃。故大部便必燥。不下輸。腸胃之熱。實先病在胸中。而亦用以為君者。熱淫於內。當治以苦寒。且以潤腸。其水道不通。大黃芒硝。善除腸胃之熱。實先病在胸中。而亦用以為君者。熱淫於內。當治以苦寒。且以潤腸。其水道不通。大黃

溫以開其法。補腸胃之熱。實先病在胸中。而亦用以為君者。熱淫於內。當治以苦寒。且以潤腸。其水道不通。大黃瀉子之法。補腸胃之熱。實先病在胸中。而亦用以為君者。熱淫於內。當治以苦寒。且以潤腸。其水道不通。大黃胸中。之結。帶而保胃。胃之無傷。是又戰成功。如平素虛弱者。病久而任攻伐者。當念虛虛之戒矣。初起者。甚捷。然必視其人壯實。可以一戰成功。如平素虛弱者。病久而任攻伐者。當念虛虛之戒矣。小陷胸湯 治病在心下。按之則痛。脈浮滑者。

黃連 兩一 **半夏** 半升 **枳實** 大者 一個

右三味 以水六升。先煮枳實。取三升。去滓。納諸藥。煮取二升。去滓。分溫三服。

程扶生曰 此熱結未深者。在心下。不若大結胸之高。在心下。按之痛。比手不可近。為輕。脈之浮滑。又緩於沈。緊但痰飲素盛。挾熱邪而內結。所以脈見浮滑也。以半夏之辛通之。黃連之苦瀉之。枳實之



苦潤滌之蓋所以除熱散結於胸中也
先煮括蕒分溫三服皆以緩治上之法

程郊情曰

胸者攻雖不淺深結胸分大小心腹硬痛或連小腹不可按者為大結胸此土燥水堅故脈亦應其

柯韻伯曰

上故脈亦應其象而沈緊止在心下不及胸腹按之知痛不其硬者為小結胸是水與熱結凝滯成痰留於膈

痼結

痼結寒溫並用溫熱之結自平瓜蠶實色赤形圓中含津液法象於心用方懸珠矣○大黃連之若且以滋

青龍攻

太陽之表有水火之分大小陷胸攻太陽之裏有痰飲之別不獨以輕重論也

豬膚湯

少陰病下痢咽痛胸滿心煩者此主之

豬膚

一斤

右一味

以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和令相得溫分六服

柯韻伯曰

少陰病多下利其支者出絡心注胸中凡腎精不足腎火不藏必循經上走於陽分也咽痛胸滿

心煩者

因陰併於下而陽併於上水不承於心火不交於腎此未濟之象猶為水畜而津液不行虛陽

其膏以治

上焦虛浮之利自止矣三味皆食

得歸其部

不治利而利自止矣三味皆食

王晉三曰

腎應蟲而肺主腎液下泄不能上蒸於肺致絡燥而為咽痛者又非甘草所能治矣當以猪

從肺出絡

心注胸中

而上下燥

邪解矣

白虎加蒼朮湯

治溼溫多汗

知母

兩五

甘草

兩二

石膏

斤一

蒼朮

兩各三

石為末

每服四錢水一盞半煎至七分去滓取汁溫服

葉香巖曰

知母氣味苦寒入足陽明甘草氣味甘平入手足太陰此治溼相搏而為溼溫病者以苦寒辛寒



百合知母湯金匱 百合病發汗後者主之

百合七枚 知母三兩

石先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎知母取一升去滓後合和煎取

陳元犀

百脈俱調於肺百脈俱病病形錯雜不能悉治只於肺治之肺主氣氣之為病非實而不順即合而所傷之陰轉則此邪從小便出矣若誤汗傷陰者汗為陰液陰液傷故以此湯維其陽維陽即所以救陰也

唐容川

滑石代赭湯

金匱

百合病下之後者主之

百合七枚

滑石三兩

代赭石如彈丸大一

枚碎棉裏

右先以水洗百合清一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎滑石代

赭取一升去滓後合和重煎取一升五合分溫服

陳元犀見陽救陰法也

參蘇飲易簡

治感冒風寒頭痛發熱憎寒效嗽涕唾稠黏胸膈滿悶脈弱無汗

人參

蘇葉

乾葛

前胡

陳皮

枳殼

茯苓

半夏

桔梗

木香

甘草各五分

生薑片五枚

大棗一枚

石十三味水煎熱服取汗

能傳變大段驅散太陽陽明之風寒足矣其有食者則兼用消食之品可也此等症四時皆有南方最多

誤下者其熱必陷熱陷必傷下焦之陰故以百合清補肺金引動水源以代赭石鎮離火而不使其上騰以滑石導熱氣而能通水府則所陷之邪從小便而出自無灼陰灼陰之患矣此即

陰法也

皆



葉仲堅曰

此少陽中風而寒溼內着之證也。仲景於表劑不用人參。惟少陽寒熱往來。雖有口苦咽乾目眩之目。亦用人參以固中氣。此亥夜。乾聲重。痰延調結。弟垂交流。五夜無主。寒登。稽留於胸脇。

[illegible]

括萼桂枝

湯遺金

太陽病其症備身體強八八然脈反沈遲此湯主之

括蔓根

雨二

桂枝

芍藥

亦各三

甘草

十二

生薑

雨二
上

大棗
十枚

2

右六味以水九升。煮取三升。分溫三服。取微汗。汗不出。食頃。啜熱粥法。

喻嘉言曰

傷寒方中治項背不可屈伸者以葛根湯發之其汗出惡風者其邪在表而此不解即陽證因熱不具

和交合不當從風寒之表法起見故不用葛根之發汗解肌改用栝蒌之味苦入陰擅生津撤熱之長為君合之桂枝和營衛養筋脈而治其痙乃變表法為和法也然既君以栝蒌根當增之桂枝為臣當

陳元犀曰

方中用姜桂合甘草為辛甘化陽芍藥合甘棗為苦甘化陰等法為風寒而解之律又資陽之穀氣以勝邪更深一層立法。但頁背凡陰陽和則得微汗而邪解矣。啖齋

未傷故加
已傷故加

葛根

以宣外。脈沈遲者。為風淫於外。而內

猪苓湯

脉

浮發

熱渴欲

飲水

小便不

不利矣

茯苓 阿膠 滑石 澤瀉
各一兩

右五

味以水四升。先煮四味取二升。去滓。内膠烱消。溫服七合。日三服。此蓄飲之症。

趙羽皇曰
仲景製豬苓一湯以行陽明少陰二經水熱。然其旨全在益陰。不專利水。蓋傷寒在表最忌亡陽。而裏虛又患亡陰。亡陰者。亡腎中之陰。與胃家之津液也。故陰虛之人。不但大便不可輕動。

即小水亦忌下通。倘陰虛過於滲利，津液不致耗竭。方中阿膠養陰生新去瘀，於腎中利水。即於腎中養陰，去熱而不留其瘀。亦

之潤真陰而不苦其格燥源清而流有不清者手顧太陽利水用五苓者以太陽職司寒水故急加桂以溫之是煖腎以行水也陽明少陰之用豬苓以二經兩關津液持用阿膠滑石以潤之是滋養無形以行有

形也利水雖同寒濕
別惟月者知之

五