

醫學秘奧六



山茨姑

二夕須擇嚴處土產色紫而價重者方是白者用之効薄

紅芽大戟

去木切薄片取頭末一夕五夕

千金子

去壳去淨末二夕

文蛤

三夕

硃砂

雄黃

各五夕

射香

二夕乾燥者抵三夕用

須擇當門子

右各為細末以糯米稀粥搗成錠子量人大小虛

實服一錢上下白滾湯磨化

凡患疔瘡便毒未愈有生瘡之兆預煎此油服之可

免面部生瘡

麻油

八夕

用自已頭髮三五錢煎化作二次服再

服亦可

凡患瘡頭面及不便處者先薰洗後點藥五日即愈
製生乳法

煨煉礬石

三

雲母石

二分

硝石

一升

六

朱砂液

九

粉紅者為上

朱

末

晉礬

二

朱

凡

八

食鹽

半

枯

凡

六

青鹽

五

分

右件共研不見星入羊錫罐內三方一頂火俟藥

化面上有霜頭起離火候冷用鐵盞蓋扎鹽泥固

濟待罐口泥乾入八卦爐內先用文火候盞底熱

透微擦水加炭平口用武火三香足離火先用

甘草牙皂各二錢煎濃汁收盞底白丹砂棉紙包



累浸汁內片時取出連紙埋土中三日夜取來晒
乾每兩加水麝各七厘辰砂九分共研極細外用
乳香錢二分滾水燉化和前末研勻爲丸每重
錢一分外以黃蠟封固卽名生乳漿方配合服
之刻日奏効每見公子王孫沾染此疾百藥無効
者皆因方之不當藥之不真也余願此方公之海
內而後世易爲采擇永無差誤然世之毒藥古方
往、用之各有製度耳如水銀一物得雲母礬石
同煉其毒卽解不比粉霜輕粉之酷烈也余用生
乳配風藥而治大麻瘋配癆藥而治傳屍癆配

虫藥而治諸虫疾配膈藥而治噎塞翻胃配瘡藥
而治頑毒頑癬久漏骨痛種，奇効不獨治瘡
毒氣之聖藥也大凡藥性與稟性有異人有殺藥
者毒藥服之竟不覺察奏功亦緩性有不殺藥者
服之便覺眩冒奏効亦速所以爲醫全在活潑經
曰大積大聚衰其大半而止不必盡劑須要體察
病情効未全者再宜進藥或間日再服或停兩
三日再服務宜消息增除毋使過劑以生藥病

製金鼎砒方法

淨白砒

二升五錢
研細爲末

出山鉛

一斤
開如大
豈許敲爲薄片



用小城礮一個以鉛片挑砒末重一疊在礮內用
文火鎔化俟青煙起白煙來霜飛礮口方離火冷
定鉛面清如水色如金者無渣質者爲妙若色青
黑非出山鉛也用之無効

結毒方法

夫結毒者癰瘡毒氣結於四肢百骸孔竅經絡不易
散解作痛作腫久則塊破潰爛不已治此症者不
外乎攻補攻則毒氣去補則正氣強經曰邪之所
湊其氣必虛者空也無也譬諸國內虛則人民
離散百禍易起人之虛者亦猶是已又曰不能治

其虛妄問其餘蓋言虛者為百病之本宜首舉以冠諸症也

毒結於肝膽二經者內作筋痛攻走脇肋上至於頭下至於足轉側艱難手不能舉足不能步或頸項發塊或破爛上下或傳他經致生別病當用乙字化毒丸兼用煎劑調理

乙字化毒丸

治已上諸症

牛黃

丁香

牙皂

各五分

琥珀

須擇體燥堅者

鬱金

生

乳

各一分

硃砂

雄黃



月、紅 白蘚皮 乳香 川山甲 各一分

製大黃 二姜 蚕 四

右製法搗一應同前甲字丸

空心早服十三丸人參送下炒米湯亦可

空腹晚服九丸

須戒大勞大怒

順時調理

煎藥方

當歸 二寸 芍藥 一寸

川芎 七分

人參

丹皮 各八分 膳草

柴胡

紅花 各五分

枸杞 二錢

石斛 五分

加蓮子 十粒

胃氣弱加奇良 一錢 薏苡 三錢

魂不寧加酸棗

仁 二錢 氣不順加烏藥香附青皮 各一錢

泄瀉加

白朮山藥 各一錢 五分

毒結於膀胱并腎經者內作骨痛流注上下抽掣時

痛發塊百會委中湧泉等穴或陽物腐爛不已或

陰囊腫脹作潰或生獨脚陽癰瘡或傳他經致生

別病當用癸字丸治之

癸字化毒丸



治已上諸症

牛黃五分

鹿角屑三分沉香

生乳各一

硃砂

雄黃

月紅

白蘚皮乳香

川山甲

各一分

神水

打薄片

用出山鉛十斤

銀箔取

尖底缸二

只一樣

的

上缸開

一孔底中絕

穿鉛片

懸上缸下

缸盛米醋

封固

以酒各十斤缸口架

文火下

燒俟酒醋

乾取出

盤中者

是製何首

人中白

二分

毒疫病者

取製入藥

有効製何首

右同甲字九搗丸

空心早上服十五丸人參湯送下枸杞湯亦可



晚間再服九丸

百日內勿使大勞

大怒順時調理

煎方

牛膝

枸杞

山茱萸

五加皮

當歸

各三

何首烏

補骨脂

淫羊藿

川石斛

山藥

各一分

澤瀉

七分

加川椒一撮

精氣不固加菖蒲人參

各一分

五味

四分

內熱加熟

地黃柏牡丹皮

各一分

盜汗加白芍酸棗仁麥門

冬

各一分



毒結於脾胃二經者外為小塊肌肉蛀爛蔓延或發
大塊破潰腿膝或手足生鵝掌風癰或傳他經致
生別病當用已字丸治之

已字化毒丸

治已上諸症

牛黃

牙皂

各五分

木香

二分

生

乳

一分

乳香

沒藥

各七分

川山甲

白蘇皮

硃砂

雄黃

月

紅

各一分

熟大黃

殭蚕

各二分

血竭

七分

右同甲字丸搗丸

空心晨服十三丸

晚服九九人參湯送下砂糖湯亦可

禁忌同前

宜自調理

煎方

茯苓

山藥

石斛

陳皮各一

薏苡三

當歸二

白芍

丹皮各八

木香

甘草各五

肉桂三

加砂仁六分

飲食少進胸中脹悶加厚朴荳仁各一有痰加半

夏枳實白木各一泄瀉加肉果訶子各七減當歸

毒結於大腸肺經者為喉癰多作痰唾久則成天白



蟻漸蝕鼻梁低陷或肌膚生癬硬靨如錢色紅紫
褪過卽成白點或不生癬竟成赤白癰風或傳他

辛字化毒丸

治已上諸症

白花蛇

真蘄州產者佳

牛黃

五分

鍾乳粉

月紅

乳香

槐花

二錢

神水

七分

右同甲字丸搗丸

羚羊角

白蘚皮

各二錢

生乳

各一錢

川山甲

硃砂

雄黃

各五分

川貝母

二錢

蜂房

炙淨一錢

晨十三丸

晚服九九人參湯送下熟蜜湯亦可

百日勿使大勞大怒

順時調理

煎方

人參

茯苓

天冬

貝母

當歸

沙參

玄參

白芍

麥冬

黃芩

五味

加枇杷葉三片

痰多加白朮天麻橘紅各一

喘急加桑皮甘草紫蘇子 各一

毒結於心小腸經者毒注瞳仁似乎內障或見或
見或毒聚舌本作腫或十指慘痛無時或瘡生遍
體內有不易結痂而腐爛不已者或傳他經致生

別病當服丁字丸

丁字化毒丸

治已上諸症

牛黃

珍珠

蜈蚣

去頭足炙
燥各四分

犀角

生乳

牙皂

各一

月紅

白蘚皮

硃砂

各一分

雄黃

乳香

川山甲 各一多五分

琥珀 分五

貝母 分二

血竭

鬱金 各一多

製軍 分二

右同甲字九搗丸

每早空心服十五丸每

腹服十丸人參湯送下圓眼湯亦可

百日內勿使大勞大怒順時

調理

煎方

人參

茯神

柏子仁

當歸

生地 各一多二分

遠志

麥冬

