

千金翼方



千金翼方卷十八

雜病上

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

明翰林院檢討國史纂修官王肯堂重校

宋王內閣撰文中書舍人加四級金匱華希閔校刻

霍亂第一

噦附

痰癰第二

黃疸第三

吐血第四

衄血下血附

胸中熱第五

壓熱第六

虛煩心悶附



北京中醫藥大學圖書館版權所有

霍亂第一

方二十
七首

理中丸主霍亂臨時方

人參

白朮

乾薑

甘草

各壹分

右四味搗篩爲末鍊密和丸如彈丸取湯和一丸服之
服吐多痢少者取枳實三枚炙四破水三升煮取一升和一
丸服之吐少痢多者加乾薑一累吐痢乾嘔者取半夏半兩
洗去滑水二升煮取一升和一丸服之若體疼痛不可堪者
水三升煮棗三枚取一升和一丸服之若吐痢大極轉筋者
以韭汁洗腹腎從胸至足踝勿逆即止若體冷微汗腹中寒
取附子一枚炮去皮四破以水二升煮一升和一丸服吐痢
悉止脉不出體猶冷者可服諸湯補之



厚朴湯主霍亂面煩方

厚朴炙

高良薑

桂心各炙

右三味咬咀以水一斗煮取二升分三服

四順湯主霍亂吐下腹痛手足逆冷方

大附子

一枚去破八片

乾薑

人參

甘草

各炙

右四味咬咀以水五升煮取一升半分三服

治霍亂吐痢嘔逆龍骨湯方

龍骨

黃連

乾薑

赤石脂

當歸

各炙

一升附子

皮破

人參

桂心

甘草

各炙

枳實

五枚

半夏

右一十一味咬咀以水九升煮取三升分三服

治霍亂困篤不識人方

雞蘇

各炙



南京中医药大学图书馆版权所有

右一味以水一斗煮取三升分再服

治霍亂轉筋兩臂及脚胸脇諸轉筋並主之方

鹽一升五合煮作湯漬洗轉筋上按灸良

又方 大麻子一升以水三升煮取一升盡服之

又方 香薷一把水煮令極濃服二三升即差青木香亦佳

治霍亂止吐方

丁香四十枚以酒五合煮取二合頓服之用水煮之亦佳

治霍亂吐痢心煩不止方

猪糞如鷄子大一枚爲末以沸湯一升和之頓服良不差更作

又方 梁米粉五合水一升半和之如粥頓服須臾即止



治霍亂轉筋入腹方 鷄屎白末以水六合煮取湯服方寸

治大便秘噦數口譫語方 厚朴式兩 大黃肆兩 枳實

右三味咬咀以水四升煮取一升二合分再服當通不

服之

竹茹湯主噦方

竹茹升 橘皮半夏 生薑洗各 紫蘇兩 甘草一兩

右六味咬咀以水六升煮取二升半分三服

治中風客熱噦方 竹茹兩 生米五合

右二味以水六升煮米熟服之

治嘔噦方 蘆根五兩



右一味切以水五升煮取三升分三服兼服小兒尿二合食

又方 飲大豆汁一升止 又方 常服白羊乳一升

治氣厥嘔噦不得息又主霍亂大鼓湯方

香豉升一半夏

洗

生薑

各式兩切

前胡

桂心

人參

甘草

炙各一兩

右七味咬咀以水五升煮取二升分三服勿使冷

傷寒噦而滿者宜視其前後知在何部不利利之愈噦而不利

此湯主之方

橘皮升一

甘草尺一

右二味咬咀以水五升煮取一升頓服之

噦橘皮湯主之方

橘皮

通草

乾薑

桂心

甘草

炙各式兩

人參一兩

右六味咬咀以水六升煮取二升分三服



小半夏湯主心下痞堅不能飲食胸中喘而嘔噦微寒熱

生薑

捌兩切以水叁升煮取一升

半夏

五合洗以水五升煮取一升

右二味合煎取一升半稍稍服之即止

又方

橘皮

四兩

生薑

捌兩

右二味切以水七升煮取二升五合分三服下喉即差未差

更合

又方

糯羊角

屑

前胡

人參

橘皮

甘草

炙各一兩

右五味咬咀以水六升煮取二升分三服

卒噦爪眉頭亦可針此主實噦實噦者醉飽得之虛噦者吐下得之又失血虛後亦得之方



南京中医药大学图书馆版权所有

炭末蜜和細細咽少許即差

又方 男噦女人丁壯氣盛者噓其肺俞女子男子噓之

痰癰第二

方二首口穰法十二首
鍼灸法七首

蜀漆丸主痰癰連年不差服三七日定差方

蜀漆

知母

白薇

地骨皮

麥門冬

去心

升麻

各五分

恒山

兩半

石膏

式兩研

香豉

一合

萎蕤

代

烏梅肉

代

鼈甲

各一兩

炙

甘草

炙叁分

右一十三味擣篩爲末鍊蜜和丸如桐子空腹飲服十九日

再加至二三十九

陵鯉湯主瘧疾江南瘴瘧方



南京中医药大学图书馆版权所有

陵鯉甲

十四枚炙

鼈甲

一枚炙

烏賊魚骨

附子

炮各一兩去皮

恒山

三兩

右五味㕮咀以酒三升漬一宿未發前稍稍啜之勿絕

並塗五心一日斷食過時久乃食

肝瘧令人色蒼蒼然太息其狀若死刺足厥陰見血心瘧令人

心煩甚欲得清水寒多不甚熱刺足少陰是謂神門

脾瘧令人病寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出刺足太陰

肺瘧令人心寒甚熱間善驚如有見者刺手太陰陽明

腎瘧令人悽悽腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺足太

陽少陰

胃瘧令人旦病寒善饑而不能食支滿腹大刺足陽明太陰橫



南京中醫藥大學圖書館版權所有

脉出血

黃帝問岐伯曰瘡多方少愈者何岐伯對曰瘡有十二種
曰瘡鬼字何可得聞乎岐伯對曰但得瘡字便愈不得其
萬不愈黃帝曰瘡鬼者十二時願聞之岐伯對曰寅時發者獄
死鬼所爲治之以瘡人著窰上灰火一周令人滅即差卯時發
者鞭死鬼所爲治之用五白衣燒作灰三指撮著酒中無酒清
水服之辰時發者墮木死鬼所爲治之令瘡人上木高危處以
棘塞木竒間即差巳時發者燒死鬼所爲治之令瘡人坐師以
周匝然火即差午時發者餓死鬼所爲治之令瘡人持脂火於
田中無人處以火燒脂令香假拾薪去即差未時發者溺死鬼



所爲治之令瘡人臨發時三度東流水卽差申時發者自刺
鬼所爲治之令瘡人欲發時以刀刺塚上便得姓字咒曰
我與汝拔却卽差酉時發者奴婢死鬼所爲治之令瘡人
上捧上卧莫令人道姓字卽差戌時發者自絞死鬼所爲治之
左索繩繫其手脚腰頭卽差亥時發者盜死鬼所爲治之以刀
子一口箭一隻灰一周刀安瘡人腹上其箭橫著底下卽差子
時發者寡婦死鬼所爲治之令瘡人脫衣東廂牀上卧左手持
刀右手持杖打令聲不絕瓦盆盛水著路邊卽差丑時發者斬
死鬼所爲治之令瘡人當戶前卧頭東向流頭下卽差
瘡病醫不能救者方



北京中医药大学图书馆版权所有

以繩量病人脚圍繞足跟及五指一匝訖截斷繩取所量得
繩置項上著反向背上當繩頭處中脊骨上炙三十壯即
候看復惡寒急炙三十壯即定北至過發一炊久候之
勿與食盡日此法神驗男左女右

黃疸第三

論三首

鍼灸二十法

方二十八首

論曰凡遇時行熱病多必內著黃但用瓜丁散內鼻中令黃
汁出乃愈即於後不復病黃矣常須用心警候病人四肢身面
微似有黃氣須用瓜丁散不得令散漫失候必大危矣特忌酒
麵犯者死

黃疸目黃不除瓜丁散方



瓜丁細末如一大豆許內鼻中令病人不及取入鼻中黃水
出差

凡人無故忽然振寒便發黃皮膚黃麴塵出小便赤少大便
閉氣力無異食飲不妨已服諸湯餘熱不除久黃者苦參散王
之方

苦參 黃連 黃蘗 黃芩 大黃 瓜丁 葶藶熬各
一兩

右七味搗篩爲散飲服方寸匕當大吐吐者日一服不吐者
日再亦得下服藥五日知可消息不知可更服之

黃疸小便色不異欲自利腹痛而喘不可除熱熱除必噦噦者

小半夏湯主之方 半夏一升洗
去滑 生薑解

右二味切以水一斗煮取二升分再服一法以水七升煮取一升半

黃疸身目皆黃皮肉麴塵出方

茵陳

一把切

梔子仁

式拾四枚

石膏

升一

右三味以水五升煮二味取二升半去滓以猛火燒石膏

赤投湯中沸定服一升覆取汗周身以粉粉之不汗更服

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此爲表和裏實當下之宜大

黃湯方

大黃

黃蘗

消石

各一兩

梔子

十五枚擘

石四味咬咀以水六升煮取二升去滓內消石煮取一升先

食頓服之

茵陳湯主時行黃疸結熱面目四肢通黃乾嘔大便不通小便

赤黃似藥汁腹痛心煩方

茵陳

半夏

洗各二兩

生薑

切四兩

大黃

半兩

芍藥

半兩

白朮

各二兩

梔子

擘

前胡

各二兩

枳實

炙

厚朴

炙

黃芩

半兩

甘草

炙二兩

右一十二味咬咀以水四斗煮取九升七合分十服

又方

黃蒸汁三升頓服即差

又方

蔓菁子五升末服方寸七日三數日驗

又方

黃蒸

麥麴

猪矢

各一升三

右三味以水五升漬一宿旦絞去滓服一升覆取汁出

大茵陳湯主內實熱盛發黃黃如金色脉浮大滑實緊數者夫



南京中医药大学图书馆版权所有

發黃者多是酒客勞熱食少胃中熱食或濕毒內熱者故黃如金色

茵陳兩半

大黃

茯苓

前胡

白朮各三兩

黃

梔子仁二十枚

黃芩

桔梗

枳實炙

甘草諸兩

右一十一味㕮咀以水九升煮取三升分服一升得快下三四日愈

治黃疸病五年以上不差但是湯藥服之即差差已還發者方

茵陳

式勛淨土惡草切之

右一味以水二斗煮取五升空腹一服二

升日三夜一隔日更服之取差止神驗

黃疸變成黑疸醫所不能治方

上瓜根

青取汁一升



北京中医药大学图书馆版权所有