

濟生氏摘錄



泄瀉 眩暈 暑症 咳嗽 疝氣 濕症 小便 不



泄瀉症

胃泄飲食

不化毛黃

承氣湯

脾泄腹脹滿

含即嘔吐

建中湯

理中湯

大腸泄食

食已窘迫大便

皂白腸鳴切痛

干姜附子湯

小腸泄波而便

膿血少腹痛

承氣湯

大瘕泄理急

以重散至圍

而不解便蓋中

痛承氣湯

難經有五泄之分曰胃泄脾泄大腸泄小腸泄大瘕泄

其實不必泥也然不難於泄以虛實久暫為辨

若寒難也脈小者為溫易已泄而脫血難治泄而脈大難

治沈細者為虛浮大者為

內經曰暴泄於危夏生飧泄邪氣為連乃為洞泄毒傷

於凡者肝受邪也木旺則賊土夏令助其濕氣則生飧

泄飧泄者下利清穀也邪氣久而不去脾土大虛水未侮



若胸滿痞悶噎腐吞酸下集穢腐之食積加麦芽

山楂大珠之後加葛乾二錢

若夏日水瀉口渴不便不利加滑石三錢

若瀉而腹痛不止為土侮木戒加芍藥三錢防風二錢

若大小便頻面色光為之漸虛玄厚朴加人參于姜

若五更天以休泄瀉或臍下痛者為之腎虛玄

陳皮厚朴加補骨脂三錢吳茱萸五味子熟附子各

二錢五更瀉者有以四神丸治之者四神破故紙吳茱萸



南京中醫藥大學圖書館版權所有

肉寇五味子四般須大末百枚薑八兩五更附浮火裏
方用酒浸破放紙四兩燒水炒美萊更一兩麩素煨肉
寇三兩炒五味子三兩冬生薑同煎燉去核其液
五更河由於腎火衰不能生脾土故五更將交陽分陽
虛不眠健閉而世傳不可專責脾胃也蓋腎旺於子
為旺不旺則氣失取此腎之大害也故用破故紙平
溫補腎
溫腎經能補相火以通君火火盛生土肉豆蔻煖胃固
腸美萊蓬燥脾去濕五味子補腎瀉精生薑溫中



大棗補土

五更瀉久有以四神丸去肉並冠加人參白朮於干姜附子
粟壳麥湯丸服臥以姜湯送下四錢

久瀉久而久瀉腹痛作泄不效者此鑑冷在陽明

必先淨去然後調治宜平胃散去蒼朮加干姜附子

各錢半大黃八分或用溫脾湯或用溫脾餅後先附子

干姜朴桂甘為錢分量逐次畢冷存腸胃浮腫瘕

又有脾虛腸冷久瀉久已方用紅朮或朮去核炒糯米或物

這姜五錢紅糖二錢煎煉每夕一服十日可愈凡服古方

宜四君湯或補中益氣湯



陳師曰忽死大渴不止大汗大喘手足厥冷兼吐者須防
脾胃之氣暴脫夏月伏陰在內多是以病急用附子理
中湯大劑投之若用參湯飲養氣正氣散必死
內傷之病暴注皆屬於脾暴注者腸胃有積停化
失常火性疾速故卒暴注泄也然必有積症發時可
渴不可以涼藥試宜參蓮丸一二散
內經云清氣在下則生飧泄瀉用升法法宜用補中益
氣湯去蒼白加木香乾薑



内經云善後於危夏生飧泄又云久凡生飧泄宜神木湯
取后附子丸

飧泄者不利法也濡泄洞泄不利法也

宜泄者之症内經云濡泄勝則濡泄宜以胃苓湯為主

寒甚不利法也加干姜附子茯苓蓮

換甚下浮腸垢去桂枝加黃連黃芩乾薑

食積加藜蘆炒查山

寒甚加人參白朮



南京中醫藥大學圖書館版權

第五更添以神丸去肉豈冠加人參白朮茯苓干薑

嬰粟壳枣丸臨臥以姜湯送下四五成

久得宜神術湯聖濟附子丸又金匱翼乳豈丸

滑泄不止後藥不效者用生肉豈冠為末以浸通以乳豈

兩藥研成膏丸以梧子大空心米飲送下五十丸

經家
生匿真言曰長夏善泄而因泄寒中陰陽虛象大論

曰清氣在下則生飧泄又曰泄勝則濡泄又曰春傷於風夏

生飧泄又曰水泄之寒泄或則害人之腑臟氣者時福



曰脾病者實則腹滿腸鳴飧泄食不化經脈篇曰脾
生病心下急痛泄下疲泄肝生病胸滿嘔逆飧泄
亦厥福曰少陰厥逆虛滿嘔逆下泄清冷陽別
一陽發病少氣善欬善泄邪氣藏府病形篇曰肺
肺小甚為泄腎肺小甚為洞泄肺要精微福曰胃肺
實則肺虛則泄又曰肺動一代者病在陽之肺象也淺
及便膿血玉機真藏福曰泄而肺大脫血而肺空難治
師傳篇曰肺虛皮換腸中契則出黃多糜暗以下皮寒

胃中寒則腹脹腸中寒則腸鳴飧泄胃中寒腸

換則脹且泄

泄瀉病每因濕勝來有苓瀉法出於裁四神固腎特傳外苦

附子丸

甘敦首推

從丸服法藥不致者是瞬腎寒寒宜加以平胃散加猪苓

澤瀉再加補骨脂炒為豆衣木火二成美第使八分干姜

乙戌以溫之為消脫不止再加何子肉肉苁蓉罌粟壳

戌半以瀉之



茶

水

炒米

再
加

杜仲

文苑

后采

如回

清华大学图书馆



此方玄林祖成公傳

溫補脾腎元氣方

٧

人考

策五

花卷

肉豆

卷

名山

補

膏
脂

3

五分

五味子

三

小腹

痛加

肉桂

永

便不利

四

律

咸

此方中

山林公

傳



胃潤而治大渴將晚久渴不止

熟地四錢白朮三錢炒干姜二錢炙甘草二錢

炒扁豆山萸肉或吳茱萸五分

又有秋燥之氣皮毛洒淅惡寒已甚熱漸生咳嗽久則

寒熱往來泄瀉身疫服溫補更甚或完谷不化有似霍

寒而不知肺中之換靈宣洩急奔大腸食入不待消化而

直出食不入則腸中之垢不隨氣奔而出是以得利不休

也宜以桑皮地骨皮黃芩甘草杏仁所膠潤肺而桑



潤其腸則源流俱清寒痰泄瀉咳嗽一皆止矣

又有久得亡陰過服炙燥之藥發熱口渴微喘汗出煩躁

此乃陰氣盡陽氣不能久為宜急之養液以所勝地黃

門冬等類熬膏三四斤日服十飯次半月之藥盡遂效

另製補脾藥黃後此喻嘉言先生之驗案也

平胃散

平胃散朴典陳皮蒼朮甘草各一兩宜除濕寬胸驅瘴

屬調和胃氣此方奇



柯韻伯曰內經以土太過曰敦厚其病腹滿不及曰卑監其病
 為滿監寒仲聖制不三承氣湯調胃土敦厚東垣製
 平胃散調胃土之卑監也方用蒼朮苦溫運脾
 黃汗迅於除濕故以為君厚朴苦溫能助少火以生
 氣故以為臣溫風氣滯故以氣之行陳皮為佐脾得補
 而健運故以補脾之甘料為使名曰平胃寧則調胃也

五苓散

不解而煩渴且渴

澤之之之之桂木之
 苓之之之之苓未



積多為垢，積與行。方用五苓表理，奪

此方本治傷寒，重在內煩，故用桂枝以散汗。不是助四苓以利水也。用四苓是行其積，多為垢，不是

通水道也。

溫脾湯

溫脾湯，收四苓，附子干姜，朴桂，甘草，或加芒硝，還須淨冷，存腸胃，瀉痼疾。喻嘉言曰：許叔微製此方，頗合仲聖以溫藥下之之法。方中大黃，不用溫藥，必不能下，而久為之邪，必攻不去，多因誤溫藥，不限制。

而此法創裁巧用之其法矣

千金脾溫湯

治積久脾虛赤白

大黃 人参 甘草

各二

歌附子

泡干姜

水煎溫服

治痢去其利加桂心之倍於人參干姜附減大黃子

治心下痞鞭干噎食臭脅下有水氣腹中雷鳴下

生薑湯心湯利在

生薑 半夏

干薑 黃連

各五

炙甘草 人參

各五

生薑湯心姜夏或干姜黃連各五分 減半黃若

參附后汗服痞利此方珍

