

西 12

3

虞山
湯寅三
曹仁伯
先生醫案



冀山曹仁伯先生醫案

痢疾門

痢疾古稱滯下。滯下者，是邪食積，些塵於腸胃，從下而洩也。噤下者，便不痛，則下而不暢也。然分痢門中，首推芍藥湯，良有以也。

袁軍吳黃桂川連吳黃桂下沒吳黃桂冬吳黃桂赤芍吳黃桂木香吳黃桂檳榔吳黃桂薑黃吳黃桂川朴吳黃桂

後診進藥湯，腹痛痢有向和之兆，然須通為第一。

前方加三奇散，黃防虎。

又下痢紅白，而能夾糞，以行其邪，患之積已少矣。然程急沒重，痺痛時作，腸胃氣滯，名難暢通。因室用五所必需，但汗多妨食，肌肉暗削，元氣虛也。

木魚吳黃桂川連吳黃桂下沒吳黃桂冬吳黃桂赤芍吳黃桂木香吳黃桂檳榔吳黃桂薑黃吳黃桂川朴吳黃桂淡豉吳黃桂茯苓吳黃桂黑龍吳黃桂松實吳黃桂薤白吳黃桂艾叶吳黃桂



防凡不亦黃芪黃

另久痢未有不傷腎而色黃者此些被熱傷肝經為甚蚘蟲自下而行勢不為
亥肝屬木吸取腎水三虧火旺豈能免厚液不劫厚竭之受厥脫難免先補益氣
人參生地黃芪炙甘草廣皮桑木升麻黃芩白芍河膠川連黃芪
丹皮黃芪

加烏梅丸不用煎

此痢有赤白之分赤自小腸白自大腸來赤多白少小腸之邪甚於大腸也自秋
徂冬久必肝氣不升邪從下注陰囊隱痛流於直腸作痛不緩小便黃濁且見口
中乾苦肺息沉弦而數理宜下其舉之以冀弋獲而已

補中益氣丸

黃連阿膠丸

蔞連丸

杭州和尚人身之氣常以升降為也氣壯則感之邪者升出於外氣弱則分所

感之邪者歸於內而入營中安為血痢乎而設赤白小腸亦今雖已去氣之降也尚未
升也所以後湯升之候腹中先鳴而更瀉淺舌脈滿白脈息沉弦好納言氣多治宜補
補中益氣丸 四神丸 金匱腎氣丸
沈平理下痢紅痰已三月矣而大便難泄肚內苦痛氣促不減臥必欬逆胸痞此係中
宮虛極不能管攝上下兩焦所脫

理中丸 生肌散

錢祥符下痢久而未痊舌苔濁膩脈小弱是陽虛也是濕盛也惟其濕盛必陽
分被平埋沒而更虛之故逆邪容易滿布自為癰閉之急症也

五苓散 外治法 葱大一把射入中填入臍中

張砂皮巷久痢未有不傷腎之傷於所受之邪更難化去不且久延
痢疾門



連理參朮姜 駐車 河子肉 大熟地 烏梅炭

吐瀉腹痛霍亂之病也。縱在寒熱，加以下痢，今寒熱雖下，痢未止，可見之也。

黃赤白，皆不消，腹痛後重，苦白帶黃，乾不多飲，右脈細弦者，滑數大，是凡積滯。

互移為患，年為月，山反通利，膀胱之氣已化，未移不美，無如呃逆，必作，教者不切也。

大蓋最為痢，所以忌洗平素，溢血遠轉肝腸，恒腎氣弱，下焦陰火上升，更為不宜。

左生丸不 茯苓不 炙甘草不 白芍不 何文不 黃連不 參日不 枳殼不 茂不 防己不 桂不 木不

後診，寒分補，寒分通，寒熱已退，青積已除，舌苔已落，募原之邪，有化之機，然

右尺脈形漸小，寸關弦滑，下痢仍帶紅白，腹痛後重不消，是中虛氣滯，積滯隨之前

法下，此舉之而呃逆未止，且教低，屬虛通腸，故逆以使下降，七氣法可師，然升舉外利

於痢，不利於呃，降逆利於呃，不利於痢，二者之間，權衡而運，以使升降之常。



南京中醫藥大學圖書館版權所有

治中湯 治中湯
青陳草 參朮姜

乃以其所未知能弋獲焉也

治中 青陳草 參朮姜

桂車 丁年 五只 柿蒂 四斤

陳 許 胸 腸 癖 久 而 不 愈 腹 痛 必 重 血 積 未 清 肺 氣 必 鬱

越 桃 羔 挽 良 姜

清 六 滑 石 甘 州 紅 曲

三 奇 茂 防 壳

又 通 再 通 用 其 痛 處 平 友 乃 通 而 不 暢 病 勢 仍 然 脈 黃 而 小 舌 色 而 紅 血 虛 氣

滯 不 獨 停 邪 內 阻 也

九 以 虫 當 歸 白 芍 沒 參 阿 膠 炙 林 木 杏 桃 仁

朱 寶 山 腸 癖 日 久 濕 熱 之 邪 結 于 下 部 變 為 瘰 癧 也

瘰 癧 丸 為 米 飲 酒 送 下

又 濕 熱 之 毒 結 於 腸 胃 肚 門 熱 痛 瘰 癧 平 亦 恐 不 殊 其 任

痢 疾 門



黃連解毒去相火尾刺蝟皮銀花甘州草薺青鹽

浸疹進解毒法痛勢稍平腸間濕熱尚未有也

前方加解生地枳殼

又湯者蕩也蕩滌濕熱未能速去所以痛勢漫作

黃連解毒刺蝟皮尾尾青鹽銀花枳仁草薺甘州

霞天曲另菴連丸

程血痢伏熱所為輕而後重新積使然然左脈有力右脈太弦腹中
及痛中虛木旺之徵夾襍之症藥必斟酌

清火黃芩湯薔花葉

楊上痢有赤白之分赤自小腸白自大腸二腑之病氣血有傷之分



腹痛沒盡漫步愈期。脉小妨食。言冰氣短也。

補中益氣丸 駐車丸

考與脉形細濇下痢紅積腹中時痛輕而又重。受內直腸紅痢反多。靜而

強動。加刺所設下為殫世久而腸澼。補中益氣丸 駐車丸 所交

又日間之痛稍和。積色之紫已沒。為藥似屬相宜。

前方加 茯苓 木耳 著花菜

花松江紅白久痢。氣血兩傷。少凡遇外感。勢加刺。近來紅多於白。右脉細

小而尖。左太弦急。而數。肝肝腎三陰大虧。餘邪未清。漫步愈期也。

補中益氣丸 白芍 木香 肉果 訶子肉 煎送駐車丸

又取下之藥。痢步增減。因思痢出痛甚。為實不痛為虛。此病本不

痢疾門



痛發達之久。愈分更進一層。前方中加牆固法。

歸肝 赤石脂 牡蠣 河子 赤豆 黃連 桂枝丸

戴太倉 休息痢。仍及裡急後重之苦。右脇下脹。納少無力。舌苔黃白。乳弦。此元氣空陷。濕熱移未清也。

補中益氣 三奇 木香 炒查 黃連 桂枝丸

又淡黃漸浮。為形腹痛裡急。苔白納少。脈弦而乳。仍宜溫化。

補中益氣 越桃 杏更 木香 肉果 黃連 桂枝丸

又腹痛裡急。本屬滯下之常。但所下之滯。不能暢快而出。內阻氣機。失平流利之運。舊積如故。新積亦生。自難銷去之理。若得暢汗。乃安。

理陰煎 菟絲餅 麋茸 茵陳 木香 黃連 桂枝丸

程子沒腸汁反有降意腸中久無之邪隨之下不惟液糞且乃紅積粘沫納少神疲溺黃脈細步逆血分主方

桂枝丸 白芍 茯苓

又紅積下而不多迴腸出於一問為有積而石所以為下必癰

前方加木焦 青皮

又迴腸出於一問紅積未了尚允旋去之時也

桂枝 甘麥大棗 茯苓 白芍 木焦 牡蠣

胡因病而來下痢因痢而來腰痛久而不已肝腎氣滯於中濕蒸熱鬱也

白朮仁肉果 茯苓 木焦 益黃散 木焦

又五更之痛已將下痢之痰未止土受木乘夾於腎病之為患

痢疾門



薏仁 茯苓 肉果 白芍 河子 木瓜 青皮 木香 牡蠣 甘州

延紅白下痢受火便血當時黑血尚鮮以本又受火黑紫帶血久而不愈

了結此是濕滯入營中無以化清而不升也
桂車 赤連 黨參 炙州 白芍 伏龍乾 著乾

又痢症漸愈氣還降而不升

補中益氣去陳加桂車 白芍 伏龍肝

楊腸癖下血夾糞而下腹中不痛脈象乾芤此肝氣大虛不能統
血滲入腸間漫無愈期也

補中益氣 炮姜 白芍 地榆 另服歸脾丸

又前方似乎於宜如肝氣不衰且能統領營血去瘀生新血痢必止



米理中 補中益氣 地榆 白芍 另服歸脾丸

張痢之白者屬氣赤者屬血之痢結而為白所患之痢已在氣分者特存之
又久痢必降而不升一法去為方等症而設也

補中益氣 炮姜 肉果 黃連 駐存丸

王下痢紅白晝夜不止腹痛裡急後重苔白加枳實納脾不是姜官澤蓮
蓋腸胃元氣已耗客象是鬱久極重也速回府

芍藥 肉桂 芫花 蓮肉

李腹痛而加下痢是濕積滯阻氣使然設使不以消化勢必痛痢結加

藿香 心氣 溫六 干姜 六一散

痢疾門 吳痛痢後作色白而黃之為熱白為寒之帶之熱尚留於大腸去少腹重墜



之所以不降也。脈有歇心。症屬棘子。

逍遙

小箇水二升持
歸芍用肉桂三升

黃鶴

川連
赤附

理中

另用烏梅丸

劉下痢腹痛為日。雖久尚有蟬脰之形。改逆不已。其積未去也。

清心

紅血六一散

赤連

防凡

半夏

荊芥

橘紅

蔡久痢白中帶紅。腹不痛。考氣虛下陷。必易以胃經濕熱之邪。無不投藥。然此而走也。亦恒法主之。

升陽益胃

白芍

王下痢已及一載。腹中不痛。但見後重。裡急。脾氣下陷也。

補中益氣丸

三奇

朱痢久未有不傷腎。虛分肝氣更虛。所患之痢邪留於腸。變為膿血。其



駐車丸治痢
姜州連膠
三奇散心佳
張亮防凡取

附理中丸連理朴

翁腸辟便血腹中時痛淡重不浮少濕邪肉急肝腸虛也

駐車連膠姜州三奇六連

程下痢不多腹熱不痛氣息已見短促脈形芤祿飲食不思面色不潤舌
苔甚黃此邪急元氣不充支絳而形脫也

理中貞元熱地歸州連膠

引肺與大腸相表裡肺虛之氣下滯腸相此所以不止也

越桃散

全久痢腹已不痛柔脆而墜苔白脈弦氣虛下陷紅積不止也

補中益氣三奇薏花菜

痢疾門



王紅積受而為白。此濕熱之邪由氣分而出。是為正理。但大腹脹滿。枳實堅破。脈息小。此肝元大虛。理之棘手。

治中 連理 附桂

若血痢而蓋膿毒。三載不痊。濕熱傷營。理之周折。

白頭翁湯去柏 芩薢湯 赤砂 二陳 另服騰連丸

痢下痢紅。積腸痛。後重。日重一日。無汗。脈弦。去其邪。濕熱陷下。焦石。能送藥分而泄也。

薑參敗毒散 黃連五連丸

薛肝藥下陷。利未有不宜乎。升之則下痢稍減。惟腹中猛痛。迴腸尤甚。之。利未。氣。足。濕。熱。也。法。宜。通。理。



○補中益氣 黃運高連丸

脫休息痢而尚腹痛迴腸尤必之問必有積滯未清為已久變獨用攻法
涕与木茯苓神曲查一芽防凡荆芥

王下痢將友一月而尚七八十白共為主紅黃次之舌苔中黃邊白脈數根
是風邪下陷未逆表散進以逆挽法

○人參敗毒散 倉庫湯 沒考

周久利不痊沒重舌白脈細少神志昏也需氣陷之共舉之

補中益氣 狂存

葉下痢白久脈形細苔白膩四肢浮腫飲食少肝經之凡濕不能去從外傳

痢疾門 積入皮肉也

四逆 平胃 防己 茯苓 薤白

穀紅白積痢本有兼血之分積之在氣者先將白利白心而平赤自止腸
本者尚不易消且紅痢色赤小波色黃可以者方損益之責重營中為治

清心 三奇 茯苓 炮姜 歸身

室下痢腹痛之隨利減區熱傷于氣者先宜治痢未便厚緊候痺

白芍 木香 川連 煨榔 防己 香薷 茯苓 炙甘草

便血門

者心生血也所生之血統於肝藏于肝心間之血未始不生于心而肝母思慮
而傷又復勞倦七傷之必少升多降失其統領之常血始燥者或單一下或
者後夾襍而行之於下不能藏之於內肝自暗傷夫肝者將軍之官謀慮

